Anleitung für die forstliche Standortserkundung

im nordostdeutschen Tiefland

(Standortserkundungsanleitung)

SEA 95

Teil C.

Forstliche Auswertung

5. Auflage der SEA 74

01.11.2013

G. SCHULZE, Schwerin

unter Mitarbeit von D. KOPP †, Eberswalde

und M. Wirner, Friedrichsmoor

Inhalt

C.	Forstliche Auswertung	5
1.	Forstökologische Gruppierung der Standortsformen und Standortsmosaik	5
1.1.	Standortsformengruppen	5
1.1.1.	Stamm-Standortsformengruppen	6
1.1.1.1.	Nährkraftstufen	7
1.1.1.2.	Abweichungen der Nährkraft von der „Normalstufe“	10
1.1.1.3.	Feuchtestufen	11
1.1.1.4.	Kombination von Nährkraft- und Feuchtestufen	12
1.1.1.5.	Klimastufen	14
1.1.1.6.	Substratuntergruppen der Mineralböden	14
1.1.2.	Zustands-Standortsformengruppen	16
1.1.2.1.	Zustands-Standortsformengruppen mit harmonischen Nährkraftstufen	17
1.1.2.2.	Zustands-Standortsformengruppen mit disharmonischen Nährkraftstufen	18
1.1.3.	Stufen der Zustandsabweichung	19
1.1.3.1.	Stufen mit harmonischer Zustandsabweichung	19
1.1.3.2.	Stufen mit disharmonischer Zustandsabweichung	21
1.1.4.	Immissionsstufen	22
1.1.5.	Großgruppen des Standortsmosaiks	23
1.2.	Gruppenzuordnung der Standortsformen	25
1.2.1.	Zuordnung der Standortsformen zu den Stamm-Standortsformengruppen	25
1.2.1.1.	Zuordnung zur Nährkraftstufe	25
1.2.1.1.1.	Herleitung der Nährkraftstufe aus der KMgCaP-Serie	27
1.2.1.1.1.1	Herleitung der halbhydromorphen Sandböden	37
1.2.1.1.2.	Herleitung der Nährkraftstufe aus der NB-Stufe	39
1.2.1.1.3.	Herleitung der Nährkraftstufe bei stärker entwässerten Sandböden	40
1.2.1.1.3.1	Sandböden der Halbgleygruppe	40
1.2.1.1.3.2	Kombinationsbodenformen – entwässerte und podsoliierte vollhydromorphe Sandböden	40
1.2.1.1.3.3	Vollhydromorphe Sandböden ohne Podsolierung	41
1.2.1.1.4.	Veränderungen der Normalstufe der Nährkraft	41
	Berücksichtigung von Windverhagerung	42
	Berücksichtigung von Unterlagerungen	43
	Berücksichtigung zweistöckiger Böden	45
	Berücksichtigung zweischichtiger Böden	46

1.2.1.2.	Berücksichtigung karbonatreicher Schichten	55
1.2.1.2.1.	Zuordnung zur Karbonatstufe	55
1.2.1.2.2.	Berücksichtigung von Karbonat im Untergrund	56
1.2.1.3.	Zuordnung zur Feuchtestufe	57
	Hauptbodenform	57
	Reliefbedingte Abweichungen vom Großklima	57
	Grund- und Stauwasserform	58
	Mehrstöckige Böden	58
	Weitere Besonderheiten	58
1.2.1.4.	Zuordnung zur Klimastufe	63
1.2.1.5.	Zuordnung zu den Großgruppen des Standortsmosaiks	63
1.2.2.	Zuordnung zu den Zustands-Standortsformengruppen	64
1.2.2.1.	Zustands-Standortsformengruppen mit eingliedriger Nährkraftstufe	64
1.2.2.2.	Zustands-Standortsformengruppen mit zwei- und mehrgliedriger Nährkraftstufe	65
1.2.2.3.	Gleich- oder Nachlauf der Vegetationsentwicklung	66
	Literatur	67
1.3.	Zuordnungskatalog	68
2.	Kennzeichnung der Standorte nach der Fruchtbarkeit	142
2.1.	Allgemeines zur Waldstandortsfruchtbarkeit	142
2.2.	Kennzeichnung der Waldstandortsfruchtbarkeit nach der Masse in dt/ha	143
2.2.1.	Fruchtbarkeitsziffer der forstlich nutzbaren Phytomasse = Holzmasse	143
2.2.2.	Fruchtbarkeitsziffer der gesamten oberirdischen Phytomasse	144
2.3.	Kennzeichnung der Waldstandortsfruchtbarkeit nach dem Volumen in fm/ha	145
	Literatur	146
	Verzeichnis der Darstellungen	170
	Register	173

C. Forstliche Auswertung

1. Forstökologische Gruppierung der Standortformen und Standortmosaike

Maßgebend für die forstökologische Gruppierung von Standortformen und Standortmosaik ist die Kenntnis über den Zusammenhang zwischen Standort und Waldvegetation hinsichtlich ihrer Verwandtschaft und ihrer Produktivität. Letztere bezieht sich sowohl auf ihren forstlich nutzbaren Anteil, der Holzmasse, als auch auf ihre Gesamtheit, der oberirdischen Phytomasse. Standortsbasis für die Vegetation bilden die ökologische Nährkraft- und Feuchtestufe. Die Standortformengruppen sind demnach Ausdruck der vegetationswirksamen Naturraumeigenschaften. (Ausführliche Darstellung bei D. KOPP & W. SCHWAN-ECKE 1994.)

1.1. Standortformengruppen

Die Standortformen werden für die forstliche Auswertung nach zwei Gesichtspunkten gruppiert:

- nach der Verwandtschaft in den schwer beeinflussbaren Eigenschaften (den Stammeigenschaften) zu **Stamm-Standortformengruppen**
- nach der Verwandtschaft in den leicht beeinflussbaren Eigenschaften (den Zustandseigenschaften) zu **Zustands-Standortformengruppen**.

Aus dem Verhältnis der Zustands- zur Stamm-Standortformengruppe ergibt sich die „**Stufe der Zustandsabweichung**“, die als Degradation, als Aggradation oder Gleichgewichtszustand vorkommen kann.

Stamm- und Zustands-Standortformengruppen sind kombiniert und getrennt anwendbar.

- Die **kombinierte Anwendung** mit Schwergewicht auf der Stamm-Standortformengruppe herrscht vor. Sie ist erforderlich, wenn neben den schwer beeinflussbaren Standortseigenschaften auch die Zustandseigenschaften wichtig sind, wie bei der Planung standortgerechter Melioration, standortgerechter Walderneuerung oder wenn die Gesamtf Fruchtbarkeit bzw. die aktuelle Wuchsleistung interpretiert werden soll.
- Die **Stamm-Standortformengruppe allein** ist für Auswertungen geeignet, bei denen man die Zustandsunterschiede vernachlässigen kann, wie z.B. bei der langfristigen Planung der Bestockungsziele.

- Die **Zustands-Standortformengruppe allein** ist nur in besonderen Fällen Auswertungsgrundlage.

1.1.1. Stamm-Standortformengruppen

Wie die Stamm-Standortformengruppen aus den Stamm-Standortsformen hergeleitet werden, zeigt als Übersicht die nachstehende Darstellung.

Darst. C 1 - 1: Herleitung der Stamm-Standortformengruppe aus der Stamm-Standortsform

Die Stamm-Standortformengruppen setzen sich nach Darstellungen C 1 - 2 und 3 aus Stamm-Nährkraftstufe, Stamm-Feuchtestufe und Klimastufe zusammen. Als Ergänzung kommen hinzu: Substratuntergruppen, Zusatzbezeichnungen bei Abweichungen der Nährkraft von der „Normalstufe“ und Großgruppen des Standortmosaiks (in der SEA 74 als Mosaikgruppe bezeichnet).

Die Stamm-Standortsformengruppen werden durch die in den Darstellungen enthaltenen Kurzzeichen und Namen bezeichnet; die Kurzzeichen sind leichter handhabbar. Bei den Namen gilt die Reihenfolge Nährkraftstufe, Feuchtestufe, Substratuntergruppe, Klimastufe und Großgruppe des Standortmosaiks.

Die Darstellungen C 1 - 2 und C 1 - 3 sind prinzipiell gleich. Die 1. Darstellung enthält die Einteilung der Stamm-Standortsformengruppen der SEA 74. Mit Rücksicht auf die zurzeit geltenden Betriebsregelungsanweisungen der Forsteinrichtung und dem damit verbundenen Aufbau des Datenspeichers Waldfonds ist sie auch weiterhin gültig. Sie sollte jedoch bei einer Neufassung der Betriebsregelungsanweisungen durch die in Darst. C 1 - 3 enthaltene feinere Gruppierung abgelöst werden. Für die Standortserkundung ist sie schon jetzt verbindlich, und auch der Zuordnungskatalog ist auf die neue Gruppierung abgestimmt.

1.1.1.1. Nährkraftstufen

Sie drücken die Gesamtheit aller vegetationswirksamen Nährstoffe im natürlichen Gleichgewicht aus. Da hier auch die tieferen Bodenlagen am Nährstoffkreislauf teilnehmen, ist der Nährstoffgehalt der gesamten durchwurzelbaren Bodentiefe für die Zuordnung zur Nährkraftstufe maßgebend. Wie die Darstellungen zeigen, werden fünf Nährkraftstufen ausgeschieden, in der neuen Fassung jeweils zusätzlich noch eine Karbonatstufe für Standorte mit hochanstehenden karbonatreichen Schichten:

SEA 74	SEA 95
R = reich	R = reich
K = kräftig	RC = reich und carbonatisch
M = mäßig nährstoffhaltig	K = kräftig
Z = ziemlich arm	KC = kräftig und carbonatisch
A = arm	M = mittel
	MC = mittel und carbonatisch
	Z = ziemlich arm
	ZC = ziemlich arm und carbonatisch
	A = arm
	AC = arm und carbonatisch.

Darst. C 1 - 2: Stamm-Standortsformengruppen (Fassung der SEA 74)

Stamm-Feuchtestufe		Stamm-Nährkraftstufe							
		reich	kräftig	mäßig nährstoffhaltig		ziemlich arm		arm	
Bezeichnung	Kurzzeichen	R	K	M ⁺ ¹⁾ Mv ²⁾	M	Z ⁺ ¹⁾ Zv ²⁾	Z	A ⁺ ¹⁾ Av ²⁾	A
(T...) Unvernäßte Standorte									
trockener	(T)...3	R3	K3	M3v	M3	Z3v	Z3	A3v	A3
mittelfrisch	(T)...2	R2	K2	M2⁺ M2v	M2	Z2⁺ Z2v	Z2	A2⁺ A2v	A2
frischer	(T)...1	R1	K1		M1		Z1		A1
W... Standorte mit Wechselfeuchte									
wechselfrisch	W...2	WR2	WK2		WM2		WZ2		
Ü... Überflutungsstandorte									
überflutungsfrisch	Ü...2	ÜR2	ÜK2						
überflutungsfeucht	Ü...1	ÜR1	ÜK1						
N... Mineralische Naßstandorte mit Dauerfeuchte									
(dauer-)feucht	N...2	NR2	NK2		NM2		NZ2³⁾		NA2³⁾
(dauer-)naß	N...1	NR1	NK1		NM1		NZ1		NA1
O... Organische Naßstandorte									
Trockenbrücher	O...4	OR4	OK4		OM4		OZ4		OA4
Brücher	O...3	OR3	OK3		OM3		OZ3		OA3
Sümpfe	O...2	OK2			OM2		OZ2		OA2
nasse Sümpfe	O...1	OK1		OM1					OA1

Erläuterungen:

Das Kurzzeichen (T) (von terrestrisch) der unvernäßten Standorte kann entfallen

1) ... + = mit reichem Untergrund

untergliedert in die Klimastufen

2) ... v = durch Verhagerung nur ...

... f = in feuchtem Klima

3) ... ° = Besonders humusarme ...

... m = in mäßig trockenem Klima

... t = in trockenem Klima

(ausgenommenv)

untergliedert in die Großgruppen des Standortmosaiks

I = im reichen Mosaik (≥ 2/3 R + K)

II = im mittelreichen Mosaik

III = im armen Mosaik (≥ 2/3 Z2 + Z3 + A1 + A2 + A3)

Darst. C 1 -3a: Stamm-Standortsformengruppen (Fassung der SEA 95) Stand 2002

Stamm-Feuchtestufe		Stamm-Nährkraftstufe					
		reich	kräftig	mittel	ziemlich arm	arm	car-bona-tisch
Bezeichnung	Kurzzzeichen	car-bona-tisch	car-bona-tisch	car-bona-tisch	car-bona-tisch	car-bona-tisch	car-bona-tisch
		R	K	M	Z	A	
trocken	(T)...3	RC	KC	MC	Z	A	
mittelfrisch	(T)...2	RC3	K3	M3	Z3	A3	
frisch (trockenere Unterstufe)	(T)...2g	RC2	K2	M2	Z2	A2	
wechselfrisch	(T)...1w	RC2g	K2g	M2g	Z2g	A2g	
(dauer-) frisch	(T)...1	RC1w	K1w	M1w	Z1w	A1w	
(dauer-) frisch (entwässert)	N...3	RC1	K1	M1	Z1	A1	
überflutungsfeucht	Ü...2	NR3	NK3	NM3	NZ3	NA3	
wechselfeucht	N...2w	ÜR2	ÜK2	NM2w	NZ2w	NA2w	
(dauer-)feucht	N...2	NR2w	NK2w	NM2w	NZ2w	NA2w	
überflutungsnaß	Ü...1	NR2	NK2	NM2	NZ2	NA2	
wechselnaß	N...1w	ÜR1	ÜK1	NM1w	NZ1w	NA1w	
(dauer-)naß	N...1	NR1w	NK1w	NM1w	NZ1w	NA1w	
überflutungssumpfig	Ü...0	NR1	NK1	NM1	NZ1	NA1	
sumpfig	N...0	ÜR0	ÜK0	NM0	NZ0	NA0	
wechselfeuchte	O...4w	NR0	NK0	NM0	NZ0	NA0	
überflutungsfeuchte	O...4ü	OR4w	OK4w	OM4w	OZ4w	OA4w	
(dauer-)feuchte	O...4	OR4ü	OK4ü	OM4ü	OZ4ü	OA4ü	
überflutungsnaße Brücher	O...3ü	OR4	OK4	OM4	OZ4	OA4	
(dauer-)naße Brücher	O...3	OR3ü	OK3ü	OM3ü	OZ3ü	OA3ü	
(Wald-)Sümpfe	O...2	OR3	OK3	OM3	OZ3	OA3	
Offensümpfe	O...1	OR2	OK2	OM2	OZ2	OA2	
		OR1	OK1	OM1	OZ1	OA1	

Erläuterungen zur Darst. C 1 – 3a:

Das eingeklammerte (T) der trockenen, mittelfrischen und frischen Mineralstandorte ist von terrestrisch abgeleitet und kann im üblichen Gebrauch der Kurzzeichen entfallen.

1) Alternatives Kurzzeichen für die Stamm-Feuchtestufe, das die ökologische Wirksamkeit des Wasserhaushaltes sinnvoller zum Ausdruck bringt und evtl. zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen ist. (Vgl. dazu Anmerkung auf Seite 12 Mitte.)

2) ...+ = ... mit reichem Untergrund

3) ... v = durch Verhagerung nur ...

untergliedert in die Großgruppen des Standortmosaiks

I = im reichen Mosaik ($\geq 2/3 R + K$)

II = im mittelreichen Mosaik

III = im armen Mosaik ($\geq 2/3 Z2 + Z3 + A1 + A2 + A3$)

(Diese Gliederung bleibt vorläufig bestehen, bis die vorgesehene Neuregelung eine stärkere Mosaikbindung der Stamm-Standortsformengruppen ermöglicht.)

Außerdem ist eine Untergliederung in Klimastufen vorzunehmen (ausgenommen bei Extremstandorten und bei... v):

Tt = trockenes Tieflandsklima

Tm = mäßig trockenes Tieflandsklima

Tf = feuchtes Tieflandsklima

TIm = mäßig küstenfeuchtes Tieflandsklima

TIf = küstenfeuchtes Tieflandsklima.

(Innerhalb des Tieflandes kann das Kurzzeichen T (von Tiefland)... entfallen.)

1.1.1.2. Abweichungen der Nährkraft von der „Normalstufe“

In einigen Fällen ist es erforderlich, die aus der Feinbodenform abgeleitete „Normalstufe“ der Nährkraft zu verändern oder durch Zusatzzeichen besonders zu kennzeichnen.

- Die Nährkraftstufe wird durch ein hochgestelltes Plus erweitert, wenn die Nährkraft des Untergrundes durch Einlagerung von lehmigen Bändern, durch Lehmunterlagerung u.ä. erhöht wird, z.B.

M⁺2 = Mittelfrische mittlere Standorte mit reichem Untergrund.

- Die Nährkraft wird durch Verhagerung herabgesetzt, gekennzeichnet durch ein angefügtes kleines < v > (von verhagert), z.B.

M2v = Mittelfrische, durch Verhagerung nur mittlere Standorte.

1.1.1.3. Feuchtestufen

Die Feuchtestufen sind Ausdruck der vegetationswirksamen Feuchteunterschiede bezogen auf den Großklimabereich. Wie aus den Darstellungen 2 und besonders 3 hervorgeht, erfolgt die Abstufung von trocken über mittelfrisch, frisch, feucht zu naß und sumpfig.

Zur Gruppe der **mineralischen Standorte** gehören:

- (T) = Anhydromorphe Mineralböden sowie sehr stark entwässerte halb- und vollhydromorphe Mineralböden (T von terrestrisch, aus Gründen der Vereinfachung wird das T zur Gruppenkennzeichnung nicht mitgeschrieben)
- Ü = Standorte mit periodischer und episodischer Überflutung und Überwässerung
- N = Mineralische Naßstandorte mit geringem Kontrast zwischen Frühjahrs- und Herbstfeuchte sowie stärker entwässerte halb- und vollhydromorphe Mineralböden.

Den Feuchtestufen der mineralischen Standorte können Indizes zugeordnet werden. Folgende Kombinationen sind möglich:

- ...g Standorte mit Böden der Wasserstufe 6 und 67. Das „**g**“ kennzeichnet eine bessere Grundwasserversorgung gegenüber Böden der Grundwasserstufe 7. Die Ertragsleistung von Beständen auf diesen Standorten wird begünstigt.
- ...w Standorte mit stark **w**echselnden Wasserständen. Der Unterschied zwischen frühjähriger Tiefenstufe und herbstlicher Absinkstufe muss mindestens 3 Feuchtestufen betragen (z.B. Feuchtestufe 25 = Stamm-Feuchtestufe N ... 1w). Mineralische Standorte der Tiefenstufe 1 (Wasser im Frühjahr oberhalb Flur) fallen nicht darunter. Sie werden der Feuchtestufe „Ü“ zugeordnet.

Zur Gruppe der **organischen Standorte** gehören

- O = Sümpfe und Brücher mit Gley Moor und Moor (O von organisch).

Den Feuchtestufen der organischen Standorte können Indizes zugeordnet werden. Folgende Kombinationen sind möglich:

- ...w ganzjährig nicht überflutete Moore mit stark **w**echselnden Wasserständen. Der Unterschied zwischen frühjähriger Tiefenstufe und herbstlicher Absinkstufe muss mindestens 4 Feuchtestufen betragen (Feuchtestufe 26 = Stamm-Feuchtestufe O ... 4w)
- ...ü zeitweilig **ü**berflutete Moore mit stark wechselnden Wasserständen. Der Unterschied zwischen frühjähriger Tiefenstufe und herbstlicher Absinkstufe muss mindestens 3 Feuchtestufen betragen (Feuchtestufe 14 = Stamm-Feuchtestufe O ... 2).

In der Bezeichnung der Feuchtestufen bestehen Unterschiede zwischen mineralischen und organischen Böden. Es entsprechen sich

Mineralböden	Moorböden
feucht	Trockenbruch
naß	Bruch
sumpfig	Sumpf.

Als Kurzzeichen werden zur Kennzeichnung der Feuchtestufen die seit langem in der Praxis eingebürgerten arabischen Ziffern verwendet wie z.B. K .. 2, N .. 1, O .. 4. Sie sind so fest in der Praxis verwurzelt, daß eine Änderung nicht ratsam erscheint, obwohl einfachere und auch sinnvollere Kurzzeichen bereits in der SEA 74 angeführt werden. Weil sie viel besser die vegetationswirksame Gesamtabstufung erkennen lassen, sind sie als Alternative in der Darstellung C 1 – 3a enthalten. Allerdings würde ihre Einführung eine weitere Verfeinerung der Feuchtestufen in der Gruppenebene mit sich bringen, die in der Darst. C 1 – 3a noch nicht eingearbeitet worden ist. Die Kurzzeichen bedeuten:

Feuchteabstufung	Index
T = trocken	..W = wechsel.....
M = mäßig frisch	..Ü = überflutungs...
I' = frisch (trockenere Unterstufe)	..D = dauer.....
I = frisch (feuchtere Unterstufe)	..O = organisch
F = feucht	..E = entwässert
N = naß	
S = sumpfig.	

In der Kombination beider ergeben sich also z.B.

I _W	= wechselfrisch (feuchtere Unterstufe)
F _D	= (dauer-)feucht
S _Ü	= überflutungssumpfig
N _{OD}	= (dauer-)nasse Brücher
I _E	= frische Entwässerungsstandorte.

1.1.1.4. Kombination von Nährkraft- und Feuchtestufen

Durch die Kombination von Nährkraft- und Feuchtestufe werden die Komponenten der Formenebene, die Stamm-Bodenform, die Grund- und Stauwasserform sowie die mesoklimatischen relief- und bodenbedingten Abweichungen vom Großklima gruppiert. Aus der Kombination ergeben sich die in den Darstellungen C 1 – 2 und C 1 – 3a angeführten Stamm-Standortsformengruppen. Mit der Überarbeitung der Feuchtestufen 2002 werden einige Änderungen gegenüber der SEA 95 wirksam. Die Kombination **N...3** steht für entwässerte Sand-Böden der Voll-, Grau- und Entwässerungsgleye sowie für Gleypodsole der Wasserstufen 46 und 55. Die Feuchtestufe **W...2** wurde durch den Index **...w** in Kombination mit den entsprechenden Feuchtestufen ersetzt.

Beispiele für Kombinationen sind:

R3	= Reiche trockene Mineralstandorte
NM2	= Mittlere (dauer-)feuchte Mineralstandorte
OA4	= Arme Trockenbrücher.

Manche Felder müssen in den Darstellungen frei bleiben, weil entsprechende Kombinationen in der Natur nicht vorkommen oder forstökologisch bedeutungslos sind.

Ein Vergleich der Darstellungen 2 und 3 läßt folgende Unterschiede erkennen:

- Die **Nährkraftstufen** bleiben durchweg unverändert, bei einigen Stamm-Standortsformengruppen wird die Karbonatstufe hinzugefügt.
- Hinsichtlich der **Feuchtestufen** ist die für die SEA 95-1 (Stand 2002) gültige Fassung feiner untergliedert.

Weil, wie oben angeführt, die Fassung der SEA 74 in der Forsteinrichtung noch weiterhin verwendet wird, werden die bestehenden Unterschiede in der folgenden Gegenüberstellung aufgezeigt. Mit der Überarbeitung der SEA 95 im Jahr 2002 ergeben sich gegenüber SEA 74 und SEA 95 weitere Veränderungen, die in der Darstellung C 1-3a aufgeschlüsselt und in nachfolgender Aufstellung dokumentiert sind:

SEA 74	SEA 95	SEA 95-1 (Stand 2002)	
unberücksichtigt	...C (T)... 2 (T)... 2 (T)... 2 W...2 W...2 W...2 (T)...1 (T)...1	...C (T)...2 (T)...2g (T)...1w - (T)...1w N... 2w (T)...1 N...3	über die Zuordnung der SEA 95 - Feuchtestufen vgl. die Darst. C 1–25 und 26;
Ü...1 Ü...1 N 2 N...2 N...1 O...4 O...4 O...4 O...3 O...3 O...3 O...2 O...2 O...2	Ü...1 Ü...0 N...2 N...2 N...2w N...1 O...4 O...4w O...4ü O...3 O...3ü O...3ü O...2 N...0ü N...0	Ü...1 Ü...0 N...2 N...1w N...2w N...1 O...4 O...4w O...4ü O...3 O...2 O...3ü O...2 - Ü...0 N...0	Die Änderungen zu 2002 vergl. die Darst. C 1–25a und 26a Grundwasstufe 14 Grundwasstufe 15

1.1.1.5. Klimastufen

Die Klimastufen sind eine Gruppierung der Großklimabereiche. Ihre Kurzzeichen und Bezeichnungen sind:

- If = ... in küstenfeuchtem Klima
- Im = ... in mäßig küstenfeuchtem Klima
- f = ... in feuchtem Klima
- m = ... in mäßig trockenem Klima
- t = ... in trockenem Klima.

Eine Untergliederung nach Klimastufen erfolgt für alle Stamm-Standortsformen-gruppen, sowohl der mineralischen als auch der organischen Standorte. Bei letzteren und den mineralischen Naßstandorten sind sie erforderlich, um die Reaktionsbereitschaft für Entwässerungen festhalten und dokumentieren zu können. Weglassen kann man die Klimastufen dort, wo das Klima nicht differenzierend auf die Standorte wirkt. Das ist bei den **Extremstandorten** der Fall, also bei extrem trocken, extrem naß und bei Verhagerung, z.B. M3v.

Zur Kennzeichnung der Stamm-Standortsformengruppen wird die Klimastufe hinter die Feuchtestufe gestellt, z.B.

- R3 f = Reiche trockene Mineralstandorte in feuchtem Klima
- NM2 m = Mittlere (dauer-)feuchte Mineralstandorte in mäßig trockenem Klima
- NK1 t = Kräftige (dauer-)nasse Mineralstandorte in trockenem Klima
- OK4 If = Kräftige (dauer-)feuchte Trockenbrücher in küstenfeuchtem Klima;
aber
- M2 v = Durch Verhagerung nur mittlere mittelfrische Mineralstandorte
- OA1 = Arme Offensümpfe.

1.1.1.6. Substratuntergruppen der Mineralböden

Um den hohen Informationsgehalt der Feinbodenformen auch in der Gruppenebene zum großen Teil zu erhalten, können die Stamm-Standortsformengruppen der **Mineralböden** um Substratuntergruppen erweitert werden. In welchem Umfang die Erweiterung vorgenommen wird, hängt vor allem von der Gestaltung der Standortskarte ab. Das Hinzufügen der Substratuntergruppe wird umso dringlicher, je weniger von den Teileinheiten der Standortform in der Standortskarte dargestellt werden soll. Sie ist unerlässlich, wenn auf die Darstellung der Feinbodenformen ganz verzichtet wird. Ohne Angabe der Substratuntergruppe würden dann die Möglichkeiten der forstökologischen Auswertungen stark eingeschränkt werden. Insbesondere würden für die Baumartenwahl und für die Festlegung von Bestockungszieltypen wichtige Informationen fehlen.

Die folgenden Substratuntergruppen werden aus den Substrattypengruppen und Körnungsartengruppen abgeleitet (vgl. Teil A, 1. Substratprofil):

S	= Sandstandorte
bS	= Bändersandstandorte
IS	= Lehmsandstandorte
G	= Grandstandorte
bG	= Bändergrandstandorte
F	= Staubsandstandorte
bF	= Bänderstaubsandstandorte
R	= Skelettstandorte
K	= Kalkstandorte
dK	= Deckkalke
tK	= Tiefkalke
L	= Lehmstandorte
dL	= Decklehme
tL	= Tieflehme
T	= Tonstandorte
dT	= Decktone
tT	= Tieftone.

Bei den Substrattypen Sand, Grand, Skelett u.a. sind außerdem Unterlagerungen anzugeben (vgl. Teil A. Substratprofil, Seite 26 ff, und Feinbodenformen, Seite 76):

.../C	= kohleunterlagert	.../c	= tief kohleunterlagert
.../E	= lettunterlagert	.../e	= tief lettunterlagert
.../K	= kalkunterlagert	.../k	= tief kalkunterlagert
.../KL	= kalklehmunterlagert	.../kl	= tief kalklehmunterlagert
.../KO	= kalkklockunterlagert	.../ko	= tief kalkklockunterlagert
.../KS	= kalksandunterlagert		
.../L	= lehmunterlagert	.../l	= tief lehmunterlagert
.../O	= klockunterlagert	.../o	= tief klockunterlagert
.../IS	= lehmsandunterlagert	.../ls	= tief lehmsandunterlagert
.../S	= sandunterlagert		
.../T	= tonunterlagert	.../t	= tief tonunterlagert.

Die Substratuntergruppen werden in der Bezeichnung der Stamm-Standortsformengruppen zwischen Feuchtstufe und Klimastufe eingefügt, die Kurzzeichen dabei in Klammern gesetzt. Z.B.

R3 (L) f	= Reiche trockene Lehmstandorte in feuchtem Klima
K2 (bS/L) t	= Kräftige mittelfrische lehmunterlagerte Bändersandstandorte in trockenem Klima
NM2(S) m	= Mittlere (dauer-)feuchte Sandstandorte in mäßig trockenem Klima, aber
OA4 lf	= Arme (dauer-)feuchte Trockenbrücher in küstenfeuchtem Klima.

Als weitere Ergänzung ist in bestimmten Fällen (siehe Abschnitt 1.2.1.2.2.) das Vorkommen von Kalzium- und Magnesiumkarbonat im Untergrund anzugeben und als hochgestelltes < ca > dem Kurzzeichen der Substratuntergruppe anzufügen, z.B. (bS^{ca}).

Für Moorböden ist die Angabe von Substratuntergruppen nicht vorgesehen.

1.1.2. Zustands-Standortsformengruppen

Die Zustands-Standortsformengruppe wird aus der Zustands-Standortsform abgeleitet. Demzufolge gibt es Zustands-Standortsformengruppen mit **harmonischer** und mit **disharmonischer Nährkraft** (vgl. Darstellungen C 1 - 5 bzw. 6).

Darst. C 1 - 4: Herleitung der Zustands-Standortsformengruppe aus der Zustands-Standortsform

Die Zustands-Standortsformengruppe besteht also aus Zustands-Nährkraft- und Zustands-Feuchtestufe. Nach beiden Stufen wird sie auch bezeichnet, wobei wie bei den Stamm-Standortsformengruppen die Nährkraft an erster Stelle steht und Feuchtestufe an zweiter. Auch hier sind die Kurzzeichen den Namen vorzuziehen. Z.B.

Formen-Ebene	Gruppen-Ebene
i Mo = <u>frischer</u> Moder	m i = mittel - <u>frisch</u> .

Die Kombination mit der Stamm-Standortsformengruppe wird wie ein Bruch geschrieben: Über dem Bruchstrich (oder vor dem Schrägstrich) steht das Kurzzeichen der Zustands-Standortsformengruppe, darunter bzw. dahinter das der Stamm-Stand-ortsformengruppe, z.B.

am/K2 = arm - mäßig frische / kräftige mittelfrische Mineralstandorte.

Die **Nährkraftstufen** sind bei den Zustands-Standortsformengruppen in gleicher Weise abgestuft und benannt wie bei den Stamm-Standortsformengruppen, abgesehen von den nur bei der Zustands-Nährkraft vorkommenden Stufen d = sehr arm und e = extrem arm. Sie unterscheiden sich nur durch die Schreibweise:

Stamm-Standortsformengruppen = Großbuchstaben
 Zustands-Standortsformengruppen = Kleinbuchstaben.

Bei den **Feuchtestufen** konnten nur die Namen abgestimmt werden: von trocken bis naß. Bei den Stamm-Standortsformengruppen kommen noch feinere Unterteilungen hinzu, z.B. bei feucht in wechselfeucht und (dauer-)feucht. Die Kurzzeichen ließen sich wegen der in der Praxis fest eingebürgerten Kennzeichnung der Stamm-Feuchtestufen durch arabische Ziffern (z.B. N...2) nicht angleichen.

1.1.2.1. Zustands-Standortsformengruppen mit harmonischen Nährkraftstufen

Die Beziehungen der Zustands-Standortsformengruppen zur Standortsformenebene sind einfach. Jeder Zustands-Standortsformengruppe entspricht eine Humusform, wie ein Blick auf die Darst. C 1 - 5 erkennen läßt. In dieser Darstellung liegt den Nährkraftstufen ein **harmonisches Verhältnis von Stickstoff- und Säure-Basenstufe** zugrunde. Der untere Teil der Darstellung enthält die gegenwärtig zu kartierenden Hagerhumusformen mit den dazugehörigen Zustands-Standortsformengruppen, letztere sind am nachgestellten <.. v > zu erkennen.

Darst. C 1 - 5: Zustands-Standortsformengruppen bei harmonischer Nährkraftstufe

Zustands-Nährkraftstufe		Zustands-Feuchtestufe				
		mit der Humusform als An- sprachemerkmal	naß	feucht	frisch	mäßig frisch
reich	Mull	rn	rf	ri	rm	rt
kräftig	mullartiger Moder	kn	kf	ki	km	kt
mittel	Moder	mn	mf	mi	mm	mt
ziemlich arm	rohhumusartiger Moder	zn	zf	zi	zm	zt
arm	Rohhumus	an	af	ai	am	at
sehr arm ¹⁾	Magerrohhumus			di	dm	dt
extrem arm	Hungerrohhumus				em	et

Zustands-Nährkraftstufe		Zustands-Feuchtestufe				
		naß	feucht	frisch	mäßig frisch	trocken
reich						
kräftig						
mittel	Hagermoder			miv	mmv	mtv
ziemlich arm	rohhumusart. Hagermoder			ziv	zmv	ztv
arm	Hagerrohhumus			aiv	amv	atv
sehr arm ¹⁾						
extrem arm						

¹⁾ Abkürzung d von dystroph.

1.1.2.2. Zustands-Standortsformengruppen mit disharmonischen Nährkraftstufen

Durch technogene Überprägung des Standortzustandes ist jedoch das Verhältnis zwischen Stickstoffstufe und Säure-Basenstufe oft gestört. Es entstehen **disharmonische** Humusformen. Dann müssen Stickstoff- und Säure-Basenstufe auch in der Gruppenebene als unabhängige Merkmale zur Gliederung der Nährkraftstufen verwendet werden (Darst. C 1 - 6). Bei der Säure-Basenstufe fallen die Stufen ziemlich arm bis sehr arm zusammen. Denn bei geringerer Sättigung wird die Zustands-Nährkraft nur durch die Stickstoffstufe gegliedert.

Darst. C 1 - 6: Zweigliedrige Zustands-Nährkraftstufen mit Disharmonie zwischen Stickstoff- und Säure-Basenstufe sowie ihre Ableitung aus der Humusform

Stickstoffstufe (als 1. Merkmal)		Basensättigungsstufe (als 2. Merkmal)				
		c karbonat- haltig	r basen- reich	k basen- kräftig	m mäßig basenhaltig	z ... d ziemlich bis sehr basenarm
		mit der Sättigungsstufe der Humusform als Ableitmerkmal				
		sehr hoch	hoch	ziemlich hoch	mäßig	gering und sehr gering
stickstoff-reich	Mull	rc	r	rk	rm	
stickstoff-kräftig	mullartiger Moder	kc	kr	k	km	kz
mäßig stickstoffhaltig	Moder	mc	mr	mk	m	mz
ziemlich stickstoffarm	rohhumusartiger Moder	zc	zr	zk	zm	z
stickstoffarm	(Normal-) Rohhumus	ac	ar	ak	am	a
sehr stickstoffarm	Mager-rohhumus	dc	dr	dk	dm	d

eingliedrige Stufen

In der Bezeichnung disharmonischer Zustands-Standortsformengruppen steht die Stickstoff-Stufe stets an erster Stelle, dann folgen Säure-Basenstufe, die Stufe weiterer Elemente und am Ende die Feuchtestufe. Damit die **Feuchtestufe** sich von den übrigen abhebt, wird sie im Gegensatz zu den eingliedrigen Nährkraftstufen bei den zwei- und mehrgliedrigen **durch einen Punkt abgetrennt**. Beispiele für die Bezeichnung sind:

mc.m = mäßig stickstoffhaltig - karbonathaltig, mäßig frisch
 zr.t = ziemlich stickstoffarm - basenreich, trocken
 kz.i = stickstoffkräftig - ziemlich basenarm, frisch.

Beteiligen sich weitere Elemente an der Veränderung des Standortzustandes, sind sinngemäß die folgenden Kurzzeichen zu verwenden:

für die	Schwefelstufe	= s
	Kaliumstufe	= k
	Phosphorstufe	= p.

Die Kennzeichnung der Abstufung dieser drei Elemente steht für die Gruppenebene noch aus.

1.1.3. Stufen der Zustandsabweichung

Bei kombinierter Anwendung von Stamm- und Zustands-Standortsformengruppen ergeben sich aus der Gegenüberstellung Stufen der Zustandsabweichung. Sie betreffen sowohl die Nährkraftstufen als auch die Feuchtestufen. Sind die Stufen der Nährkraft harmonisch, so sind es auch die Abweichstufen; sie können ebenso wie die der Feuchtestufe durch eine Stufenziffer ausgedrückt werden. Bei disharmonischer Nährkraft ist auch die Abweichstufe disharmonisch, und sie muß durch Doppelziffer erscheinen.

1.1.3.1. Stufen mit harmonischer Zustandsabweichung

Es sind die in Darst. C 1 - 7 aufgeführten Stufen der Zustandsabweichung. Sie werden durch arabische Ziffern bezeichnet. Die erste Ziffer bezeichnet die Abweichstufe für die Zustands- Nährkraftstufe und die zweite die Abweichstufe für die Zustands-Feuchtestufe. Beide Ziffern werden nebeneinander geschrieben. Sind beide Ziffern negativ oder positiv, wird nur einmal ein Minus- bzw. Pluszeichen gesetzt, sind beide unterschiedlich, das entsprechende Zeichen vor jede Ziffer.

Es bedeuten:

- 00 = Zustands-Nährkraft und Zustands-Feuchte befinden sich im **Gleichgewicht** mit der Stamm-Nährkraft und -Feuchte.
- .. = **Degradationsstufen**. Bei den Nährkraftstufen kommen bis zu 5 Stufen vor, bei den Feuchtestufen bis zu 2.
- + .. = **Aggradationsstufen**. Bei den Nährkraftstufen reicht die Aggradation nur bis zu einer Stufe, bei den Feuchtestufen fehlen Aggradationen.

Darst. C 1 - 7: Stufen der Zustandsabweichung bei Harmonie zwischen Stickstoff- und Säure-Basenstufe

Stamm- Standorts- formengruppe	Zustands-Standortsformengruppe																								
	rf	ri	rm	rt	kf	ki	km	kt	mf	mi	mm	mt	zf	zi	zm	zt	af	ai	am	at	di	dm	dt	em	et
NR2, ÜR1	00	-01			-10	-11																			
R1, ÜR2, WR2		00	-01			-10	-11																		
R2			00				-10																		
R3				00			-10																		
NK2, ÜK1	+10				00	-01		-10	-11				-20	-21	-22										
K1, ÜK2, WK2		+10				00			-10	-10				-20	-21										
K2			+10				00				-10			-20	-20										
K3				+10			00				-10														
NM					+10			00	-01				-10	-11	-12										
M1, WM2						+10			00					-10	-11										
M2, M2+							+10			00					-10										
M3							+10				00														
NZ2								+10					00	-01	-02										
Z1, WZ2						+10								00	-01										
Z2, Z2+							+10								00										
Z3								+10																	
NA2													+10	+1-1	+1-2										
A1														+10	+1-1										
A2, A2+															+10	+1-1									
A3																+10									

erste Ziffer = Stufe der Nährkraftabweichung
 zweite Ziffer = Stufe der Feuchteabweichung
 0 = Natürliche Gleichgewichtsstufe
 - ... = Degradationsstufen
 + ... = Aggradationsstufen
 die Vorzeichen werden nur einmal gesetzt, wenn beide Stufen positiv oder negativ sind

Bei der Stamm-Standortsformengruppe **K2** ergeben sich z.B. folgende Stufen der Zustandsabweichung:

- + 10 Zustands-Standortsformengruppe **rm** mit mäßig frischem Mull und Lungenkraut-Formengruppe
- 00 Zustands-Standortsformengruppe **km** mit mäßig frischem mullartigem Moder und Riesenschwingel-Formengruppe
- 10 Zustands-Standortsformengruppe **mm** mit mäßig frischem Moder und Sauerklee-Formengruppe
- 20 Zustands-Standortsformengruppe **zm** mit mäßig frischem rohhumusartigem Moder und Sauerklee-Blaubeer-Formengruppe
- 30 Zustands-Standortsformengruppe **am** mit mäßig frischem (Normal-) Rohhumus und Blaubeer-Formengruppe
- 40 Zustands-Standortsformengruppe **dm** mit mäßig frischem Magerrohhumus und Zypressenmoos-Formengruppe
- 50 Zustands-Standortsformengruppe **em** mit mäßig frischem Hungerrohhumus und Flechten-Formengruppe.

1.1.3.2. Stufen mit disharmonischer Zustandsabweichung

Bei disharmonischer Zustandsabweichung liegen die Verhältnisse im Grunde genommen ähnlich. Die Abweichstufen der Feuchte können auch hier mit einer arabischen Ziffer bezeichnet werden, die Abweichstufen der Nährkraft müssen jedoch eine Doppelziffer erhalten, denn Stickstoff- und Säure-Basenstufe müssen gesondert ausgewiesen werden. Analog der Schreibweise bei den Zustands-Standortsformen-gruppen mit disharmonischen Nährkraftstufen steht auch hier an erster Stelle die Abweichstufe der Stickstoffstufe, an zweiter die der Basen-Sättigungsstufe und am Ende, ebenfalls durch einen Punkt getrennt, die der Feuchtestufe. Z.B. bedeutet bei der Stamm-Standortsformengruppe K2

- +1-1.0 = Zustands-Standortsformengruppe **rm.m**
= stickstoffreich – mäßig basenhaltig – mäßig frisch.

Die nachfolgende Darstellung ist zum Ermitteln der Stufen der Zustandsabweichung bei Disharmonie zwischen Stickstoff- und Säure-Basenstufe gedacht. Wegen der vielen Kombinationsmöglichkeiten ist sie unterteilt allein für die Stickstoffstufe und allein für die Säure-Basenstufe. Als Orientierungshilfe sind zusätzlich im Tabellenkopf Humusform und Zustands-Nährkraftstufe angegeben.

Darst. C 1 - 8: Stufen der Zustandsabweichung bei Disharmonie zwischen Stickstoff- und Säure-Basenstufe

für die Stickstoffstufe allein

Nährkraft- stufe der Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform als Ansprachemerkmale							
		Mu	MM	Mo	RM	Ro	Ma	Hu
	Stickstoffstufe							
	sehr stickstoff-reich	stickstoff-reich	stickstoff-künftig	mäßig stickstoff-haltig	ziemlich stickstoff-arm	stickstoff-arm	sehr stickstoff-arm	extrem stickstoff-arm
	n ₈	n ₇	n ₆	n ₅	n ₄	n ₃	n ₂	n ₁
Zustands-Nährkraftstufe								
	r	k	m	z	a	d	e	
C	0	-1						
R		0	-1					
K		+1	0	-1	-2	-3		
M		+2	+1	0	-1	-2		
Z			+2	+1	0	-1	-2	
A				+2	+1	0	-1	-2

für die Säure-Basenstufe allein

Nährkraft- stufe der Stamm- Standorts- formen- gruppe	Säure-Basenstufe							
	carbonat-haltig	basen-reich	basen-künftig	mäßig basen-haltig	ziemlich basenarm	basenarm	sehr basenarm	
	b ₈	b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	
	Zustands-Nährkraftstufe							
	c	r	k	m	z	a	d	
C	0	-1						
R	+1	0	-1					
K	+2	+1	0	-1				
M	+3	+2	+1	0	-1			
Z	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	
A	+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

Die Stufen in den schraffierten Kästchen zeigen den Gleichgewichtszustand zwischen Stamm- und Zustands-Nährkraftstufe.

1.1.4. Immissionsstufen

Zur Zustands-Standortsformengruppe gehören auch die in der Immissionsform erfaßten Fremdstoffüberprägungen der Lufthülle. Soweit sie in den Standortskarten erfaßt werden können, ist die Gliederung in der Gruppenebene hierfür die gleiche wie in der Formenebene, das Ypsilon wird jedoch als Zustandseigenschaft klein geschrieben.

Im Tiefland wurden bisher folgende Stoffarten und Stoffartenkombinationen erfaßt:

yn	= Stickstoff mit Vorherrschaft von NH ₄
ys	= Schwefeldioxyd (SO ₂)
ysb	= Schwefeldioxyd mit basischer Flugasche
ynsb	= Stickstoff und Schwefeldioxyd mit basischer Flugasche
yk	= Kalkstaub aus Zement- und Kalkwerken (zuvor y _z)
ykn	= Kalkstaub und Stickstoff (zuvor y _{zn})
yw	= Waschmittelstaub
ywn	= Waschmittelstaub und Stickstoff
ycl	= Kaliumchlorid.

Die Mengenstufen der Immission werden durch Zahlenindizes gekennzeichnet. Bisher sind verwendet worden:

für Stickstoffimmission

yn ₁	= gering
yn ₂	= mäßig
yn ₃	= stark
yn ₄	= sehr stark;

für basisch wirkende Fremdstoffe

y _{b1}	= gering
y _{b2}	= mäßig
y _{b3}	= stark;

für SO₂-Immission

ys ₁	= mäßige Immission
ys ₂	= ziemlich starke Immission
ys ₃	= starke Immission.

1.1.5. Großgruppen des Standortmosaiks

Wie die meisten waldbaulichen Anwendungen der Standortserkundung zeigen, ist es nicht gleichgültig, ob das Areal einer Stamm-Standortsformengruppe, z.B. M2, von reicheren, mittleren oder ärmeren Standorten umgeben ist. Das gilt vor allem für die Standorte der ökologischen Mitte: die Stamm-Standortsformengruppen K2, M1, M⁺2, M2, Z1, Z⁺2 und Z2. Verursacht ist dieser Nachbarschaftseinfluß zu großen Teilen durch das Waldinnenklima. Aber auch lateraler Stoffaustausch über Blätter und Nadeln scheint eine Rolle zu spielen. Offensichtlich ist der wachstumsfördernde Einfluß stufig aufgebauter Mischbestände auf benachbarten Standortsarealen, und offensichtlich ist der ungünstige Einfluß benachbarter Kiefernreinbestände, der besonders das Laubverblasen fördert.

Die Einbindung der Areale der Stamm-Standortsformengruppen in die Nachbarschaft wird aus dem Standortmosaik abgeleitet. Voraussetzung dafür ist eine erfolgte Naturraumerkundung in der chorischen Dimension, d.h. ein Ausgrenzen von Mosaikarealen im Maßstab 1 : 25 000 bis 1 : 100 000 sowie die Ermittlung ihrer Flächengröße und ihrer inhaltlichen Kennzeichnung nach Komponenten. Bisher wurde die Einbindung nur als Stammei-

enschaft erfaßt und auch nur für die Stamm-Standorts-formengruppen der ökologischen Mitte.

Zur Ableitung der Einbindung aus dem Standortmosaik werden die Einzelmosaike zu drei Großgruppen zusammengefaßt:

- I = im reichen Mosaik ($\geq 2/3 R + K$)
- II = im mittelreichen Mosaik
- III = im armen Mosaik ($\geq 2/3 Z2 + Z3 + A1 + A2 + A3$).

1.2. Gruppenzuordnung der Standortsformen

Wie im Abschnitt C.1.1. „Standortsformengruppen“ ausgeführt, werden auch in der Gruppenebene stabile und labile, das heißt vom Menschen schwer bzw. leicht beeinflussbare Standortseigenschaften berücksichtigt. Deshalb wird auch die Zuordnung der Standortsformen getrennt nach Stamm-Standortsformengruppen und Zustands-Standortsformengruppen vorgenommen.

1.2.1. Zuordnung der Standortsformen zu den Stamm-Standortsformengruppen

In den Stamm-Standortsformengruppen sind Stamm-Standortsformen vereinigt, die auf das Wachstum der Vegetation, also auch auf das Waldwachstum eine annähernd gleiche ökologische Wirksamkeit ausüben. Die Zuordnung der Standortsformen zur Stamm-Standortsformengruppe erfolgt in Stufen nach den für die Vegetation wirksamsten Standortseigenschaften

- Nährkraft = Stamm-Nährkraftstufe
- Wasserhaushalt = Stamm-Feuchtestufe
- Klima = Klimastufe.

Die Stamm-Standortsformengruppen ergeben sich somit aus der Kombination von Stamm-Feuchtestufe und Stamm-Nährkraftstufe, erweitert durch Substratuntergruppe, Klimastufe und Großgruppe des Standortsmosaiks.

1.2.1.1. Zuordnung zur Nährkraftstufe

Die Stamm-Nährkraftstufe wird für jede Feinbodenform aus den für die Nährkraft wesentlichen Eigenschaften (siehe Teil A, Abschnitt 5: Feinbodenformen) und aus der Stamm-Vegetationsform hergeleitet. Die Stamm-Nährkraftstufe ist aus den Merkmalstabellen des Bodenformen-Katalogs, dem alphabetischen Feinboden-Verzeichnis, den Zuordnungstabellen dieser Richtlinie oder den Erläuterungsbänden zur Standortskarte ersichtlich. Ihre Herleitung wird in den folgenden Abschnitten erläutert.

Nach den Ausführungen im Teil A, Abschnitte 1.5. und 2.4., wird die Nährkraftstufe bei einem Teil der Feinbodenformen aus der KMgCaP-Serie abgeleitet, bei einem anderen Teil aus der NB-Stufe:

	KMgCaP- Serie	NB-Stufe
Anhydromorphe Mineralböden		
Sand, Bändersand, Staubsand ohne Klock Skelett..., ...skelett, Skelett ohne Klock Decklehme, Decktone ohne Klock Tieflehm, Tiefton Lehm, Ton ohne Klock
Sand, Bändersand, Staubsand mit Klock Skelett..., ...skelett, Skelett mit Klock Decklehme, Decktone mit Klock Lehm, Ton mit Klock
Halbhydromorphe Mineralböden		
Sand, Bändersand, Staubsand ohne Klock Decklehm, Deckton ohne Klock Tieflehm, Tiefton Lehm, Ton ohne Klock
Sand, Bändersand, Staubsand mit Klock Decklehm, Deckton mit Klock Lehm, Ton mit Klock
Vollhydromorphe Mineralböden der Graugleygruppe		
Tieflehm, Tiefton ohne Tiefkallehm Lehm, Schluff, Ton ohne Klock
alle anderen Feinbodenformen
Vollhydromorphe Mineralböden der Humus-, Anmoor- und Moorgleygruppe		
alle Feinbodenformen
Moorböden		
alle Feinbodenformen

Eine gewisse Sonderstellung nehmen Böden mit dem **Horizontfolgetyp Rendzina** ein:

- Anhydromorphe **Sandböden**
aus der KMgCaP-Serie abgeleitet wie Böden mit dem Horizontfolgetyp Braunerde, Kalziumkarbonat ab Eta-Zone und im Übrigen gleicher Merkmalskombination.
- Halbhydromorphe **Sandböden**
aus der KMgCaP-Serie abgeleitet wie Böden mit dem Horizontfolgetyp Braunerde, Kalziumkarbonat ab Eta-Zone und im Übrigen gleicher Merkmalskombination. Bei Grundwassertiefenstufe 4 und V-Wert im G-Horizont > 40 % erfolgt eine Nährkrafthöherhöhung um zwei Stufen.
- Anhydromorphe **Skelettböden**
aus der KMgCaP-Serie abgeleitet wie anhydromorphe Grandböden.
- Anhydromorphe Böden mit **Deckhalbkalk, Halbkalk**
stets Nährkraftstufe R.
- Anhydromorphe Böden mit **Kalklehm, Kalkschluff**
stets Nährkraftstufe R.

1.2.1.1.1. Herleitung der Nährkraftstufe aus der KMgCaP-Serie

Bei den nach KMgCaP-Serien definierten Bodenformen wird die Stamm-Nährkraftstufe in **Fünftel-Nährkraftstufen** unterteilt und die Teilstufe im Kurzzeichen durch hochgestellte Ziffern gekennzeichnet, z. B.

$$R^1 \quad R^2 \quad R^3 \quad R^4 \quad R^5$$

In der vorherigen Fassung der SEA wurden Apostrophe zur Darstellung verwendet, z. B.:

$$R' \quad R'' \quad R''' \quad R'''' \quad R'''''$$

Zur leichteren Berechnung, besonders wenn verschiedene Fünftelstufen zu addieren oder subtrahieren sind, können auch Ziffernwerte verwendet werden:

Fünftelstufen	R	K	M	Z	A
1	25	20	15	10	5
2	24	19	14	9	4
3	23	18	13	8	3
4	22	17	12	7	2
5	21	16	11	6	1

Die Ableitung der Fünftel-Nährkraftstufen erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

1. Bei den nach KMgCaP-Serien definierten Feinbodenformen liegt der Normalstufe der Nährkraft die KMgCaP-Stufe zugrunde. Im Gegensatz zur KMgCaP-Serie wird in der Stufe der verändernde Einfluß der Körnungsart wirksam. Die folgenden Ausführungen zeigen den Weg dorthin.

Den Ausgangspunkt bildet die Normalstufe der Nährkraft für eine karbonatfreie mittelkörnige Sand-Braunerde mit reinem Sand in der periglaziären Deckzone (in Darst. C 1 - 10 stärker umrandet). Diese Normalstufe liegt aufgrund der durchgeführten Regressionsanalysen für jede KMgCaP-Serie fest und wird als **Grundwert** bezeichnet. Ausgehend von den Grundwerten werden die unten angeführten Zu- oder Abschläge vorgenommen sowie Substratunterschiede, Karbonattiefe, V-Wert u.a. berücksichtigt. Bei zweischichtigem Substrat mit verschiedener Serie sowie bei allen Feinbodenformen mit Tieflett, Lettkerf, Tieflett-Lehm und vielen weiteren Formen muß die KMgCaP-Stufe aus den Serien beider Schichten „gemittelt“ werden.

Die Grundwerte sind für KMgCaP-Serie

I	=	M ⁵	=	Ziffernwert	11
II, IV, VI	=	Z ³	=	Ziffernwert	8
III, V	=	Z ³	=	Ziffernwert	8
VII	=	M ⁵	=	Ziffernwert	11
VIII ⁺	=	Z ⁴	=	Ziffernwert	7
VIII ⁰	=	A ¹	=	Ziffernwert	5
VIII ⁻	=	A ³	=	Ziffernwert	3.

2. Für Zu- und Abschläge gelten folgende allgemeingültige Regeln (Zuschlag [= +] und Abschlag [= -] im Sinne von Erhöhung bzw. Verringerung der Nährkraft in Fünftel-Nährkraftstufen):

- Den körnungsbedingten Zuschlägen liegt der Abschnitt 1.5.1.1. KMgCaP-Serie im Teil A zugrunde. Zu beachten ist hierbei, daß der Einfluß der Körnung von Serie zu Serie unterschiedlich ist, und deshalb sind auch die körnungsbedingten Zuschläge in den Serien unterschiedlich groß. Z.B. beträgt der Anstieg vom mittelkörnigen Sand zum grobkörnigen Bändersand mit Braunerde in der Serie I = 5/5, II = 4/5, III = 3/5, VII = 1/5 und VIII⁺ = 1/5 Nährkraftstufen.

- Bei Kappung des oberen Profilverteils werden Zu- und Abschläge vorgenommen:

Abschläge für P-Verlust :	bei Rumpfrosterden	- 2
	bei Ranker.	- 3

- Zuschläge für **Höherrücken** des mittleren **Bänder- und Staubsandbeginns**:

bei Serie I - VI:	bei Bändersand-Rumpfrosterde	+ 2
	bei Bändersand-Ranker	+ 3
	bei Staubsand -Rumpfrosterde	+ 3
	bei Staubsand -Ranker	+ 4;

bei Serie VII und VIII:	bei Bändersand-Rumpfrosterde	+ 1
	bei Bändersand-Ranker	+ 2
	bei Staubsand -Rumpfrosterde	+ 2
	bei Staubsand -Ranker	+ 3.

bei Ranker mit CaCO ₃ ab Eta-Zone	+ 2
bei Ranker mit CaCO ₃ „dazwischen“	+ 1.

3. Ein **Pluszeichen** wird bei der „**Normalstufe**“ gesetzt, wenn die Nährkraft des Untergrundes diejenige des oberen Profiltails nach Erhöhung durch Bänder usw. um mehr als 5/5 übersteigt. Bei Abweichung von der Normalstufe durch Unterlagerungen usw. gelten die in Darst. C 1 - 18 angeführten Regeln.

Nach den Darstellungen C 1 - 9 bis 15 sind bisher folgende Kombinationen aufgetreten, bei denen ein Pluszeichen zu setzen ist (schraffierte Kästchen):

Horizontfolgetyp	Serie	Substratfolgetyp						Lehm, Lehm- kerf, Ton
		Bänderstaub- sand		Staubsand (Sammel- form)		Tieflehm u. Tiefton		
		Körnungsart in der periglaziären Deckzone						
		S	alS + IS	S	alS + IS	S	alS + IS	
Ranker	I - VI							
Braunerde								
Braunpodsol								
Fahlerde	I - VI							
Rügerde, Fahrrügerde								
Staugleyfahlerde								
Saumpodsol	I - VI							
Podsole mit flachem Bi								
Rügpodsole	I - VI							
Staugleyrügpodsole								
Podsole mit Bi-Tiefe > 20 cm	I - VI							

4. Bei Podsolen übt die Tiefe der Bi-Obergrenze ebenfalls einen Einfluß auf die Nährkraft aus, und zwar vermindern mit zunehmender Tiefe. Beträgt die Tiefe über 20 cm, so ist sie bei Sanden um eine Fünftel-Nährkraftstufe geringer als bei Podsolen mit bis 20 cm tiefliegender Bi-Obergrenze; bei Tieflehm, Tiefton, Lehm, Lehmkerf und Ton verringert sich die Nährkraft um 1 bis 2 Fünftel-Nährkraftstufen.

5. Unberücksichtigt bleiben

- Mächtigkeit des Bi-Horizontes bei Rügpodsolen,
- das Merkmal "Filz" bei allen Podsolen und
- Mächtigkeit der Fuchssandschicht.

6. Substratfolgetypen mit dem Zusatz „Lett“ bleiben vorerst offen.

Nach diesen Grundsätzen sind die Darst. C 1 - 9 bis 15 aufgestellt worden. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die Fünftel-Nährkraftstufen für alle nach KMgCaP-Serien definierten Bodenformen abzuleiten.

Im Bodenformen-Katalog sowie in den Gruppenzuordnungs-Tabellen sind sie für alle bisher vorkommenden Feinbodenformen enthalten und somit unmittelbar ablesbar.

Darst. C 1 - 9: Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit dem Horizontfolgeyp
Ranker

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		mittel- und feinkörniger Sand			grobkörniger Sand			mittel- und feinkörn. Bändersand			grobkörniger Bändersand		
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-ri-glaziär.	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone											
			S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS
I	ab Eta	80 - 160	M ⁴			M ¹			K ⁴			-		
	dazw.	> 160	Z ¹			M ²			M ¹			-		
	ohne	frei	Z ³			-			M ³			-		
II, IV VI	ab Eta	80 - 160	Z ²			Z ¹			M ¹			K ⁵		
	dazw.	> 160	Z ⁴			Z ³			M ³			M ²		
	ohne	frei	A ¹			-			Z ¹			-		
III, V	dazw.	> 160												
	ohne	frei	A ¹			A ¹			M ⁵			M ⁵		
VII	ohne	frei	Z ³			Z ³			M ⁵			M ⁵		
VIII ⁺	ohne	frei	A ²			A ²			Z ⁴			Z ⁴		
VIII ⁰	ohne	frei	A ⁴			A ⁴			A ¹			A ¹		
VIII ⁻	ohne	frei	A ⁵			A ⁵			A ³			A ³		

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		Staubsand		Bänderstaubsand		Staubsand (Sammelform)		Decklehm		Tieflehm u. Tiefton		Lehm
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-ri-glaziär.	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone										Lehmkerf Ton
			S	aIS+IS	S	aIS+IS	S	aIS+IS	über S	ü. bS	S	aIS+IS	
I	ab Eta	80 - 160	M ¹		K ²		K ²				M ¹⁺		
	dazw.	> 160	M ²		K ³		K ⁴						
	ohne	frei	M ³		K ⁴		M ¹						
II, IV VI	ab Eta	80 - 160	M ⁵		K ⁵		K ⁴				M ³⁺ M ²⁺		M ³⁺
	dazw.	> 160	Z ¹		M ¹		M ¹						
	ohne	frei	Z ²		M ²		M ³						
III, V	dazw.	> 160									M ³⁺		
	ohne	frei	Z ²		M ²		M ³						
VII	ohne	frei											
VIII ⁺	ohne	frei	Z ³		Z ¹		Z ⁴						
VIII ⁰	ohne	frei	Z ⁵		Z ³		A ¹						
VIII ⁻	ohne	frei	A ²		Z ⁵		A ³						

Darst. C 1 - 10: Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen **Braunerde, Braunpodsol¹, Fahlerde und Staogleyfhahlerde**

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		mittel- und feinkörniger Sand			grobkörniger Sand			mittel- und feinkörn. Bändersand			grobkörniger Bändersand		
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-glaziär. Perstruk.-Serie	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone											
			S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS
I	ab Eta		M ³	K ⁵	K ³	K ⁵	K ³	K ¹	M ¹	K ³	K ¹	K ³	K ¹	R ⁴
	dazw.		M ⁴	M ¹	K ⁴	M ¹	K ⁴	K ²	M ²	K ⁴	K ²	K ⁴	K ²	R ⁵
	ohne		M ⁵	M ²	K ⁵	M ²	K ⁵	K ³	M ³	K ⁵	K ³	K ⁵	K ³	K ¹
II, IV VI	ab Eta		Z ¹	M ³	M ¹	M ⁵	M ²	K ⁵	M ³	K ⁵	K ³	M ²	K ⁴	K ²
	dazw.		Z ²	M ⁴	M ²	Z ¹	M ³	M ¹	M ⁴	M ¹	K ⁴	M ³	K ⁵	K ³
	ohne		Z ³	M ⁵	M ³	Z ²	M ⁴	M ²	M ⁵	M ²	K ⁵	M ⁴	M ¹	K ⁴
III, V	dazw.													
	ohne		Z ³	M ⁵	M ³	Z ³	M ⁵	M ³	M ⁵	M ²	K ⁵	M ⁵	M ²	K ⁵
VII	ohne		M ⁵	M ⁴	M ³	M ⁵	M ⁴	M ³	M ⁴	M ³	M ²	M ⁴	M ³	M ²
VIII ⁺	ohne		Z ⁴	Z ²	Z ¹	Z ⁴	Z ²	Z ¹	Z ³	Z ¹	M ⁵	Z ³	Z ¹	M ⁵
VIII ⁰	ohne		A ¹	Z ⁴	Z ³	A ¹	Z ⁴	Z ³	Z ⁵	Z ³	Z ²	Z ⁵	Z ³	Z ²
VIII ⁻	ohne		A ³	A ¹	Z ⁵	A ³	A ¹	Z ⁵	A ²	Z ⁵	Z ⁴	A ²	Z ⁵	Z ⁴

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		Staubsand		Bänderstaubsand		Staubsand (Sammelform)		Decklehm		Tieflehm u. Tiefton		Lehmkerf Ton
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-glaziär. Perstruk.-Serie	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone										
			S	aIS+IS	S	aIS+IS	S	aIS+IS	über S	ü. bS	S	aIS+IS	
I	ab Eta		M ¹	K ³	K ⁴	K ¹	K ⁵	K ¹	K ²	R ⁵	K ⁴	K ¹	R ⁴
	dazw.		M ²	K ⁴	K ⁵	K ²	M ¹	K ²	K ³	K ¹	K ⁵	K ²	
	ohne		M ³	K ⁵	M ¹	K ³	M ²	K ³	K ⁴	K ²		K ³	
II, IV VI	ab Eta		M ⁴	M ¹	M ²	K ⁴	M ²	K ⁴	K ⁵	K ²	M ¹⁺	K ³	K ¹
	dazw.		M ⁵	M ²	M ³	K ⁵	M ³	K ⁵	M ¹	K ³	M ²⁺	K ⁴	K ²
	ohne		Z ¹	M ³	M ⁴	M ¹	M ⁴	M ¹	M ²	K ⁴			
III, V	dazw.										M ²⁺	K ⁴	K ²
	ohne		Z ¹	M ³	M ⁴	M ¹	M ⁴	M ¹	M ²	K ⁴			K ⁵
VII	ohne								M ²	M ¹			M ¹
VIII ⁺	ohne		Z ³	Z ¹	Z ²	M ⁵	Z ³	M ⁵	M ⁵	M ⁴	Z ¹	M ⁴	M ³
VIII ⁰	ohne		Z ⁵	Z ³	Z ⁴	Z ²	Z ⁵	Z ²	Z ²	Z ¹	Z ³	Z ¹	M ⁵
VIII ⁻	ohne		A ²	Z ⁵	A ¹	Z ⁴	A ²	Z ⁴	Z ⁴	Z ³	Z ⁵	Z ³	Z ²

¹ Bei Braunpodsohlen werden generell 2 Fünftelstufen abgezogen (Festlegung der Länderarbeitsgruppe aus 2002)

Darst. C 1 - 11: Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen
Rumpfrosterde und Rumpffahlerde

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		mittel- und feinkörniger Sand			grobkörniger Sand			mittel- und feinkörn. Bändersand			grobkörniger Bändersand		
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-ri-glaziär.	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone											
			S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS
I	ab Eta		M ⁵			M ²			M ¹	K ⁵	K ⁴			K ³
	dazw.		Z ¹			M ³			M ³	M ²	M ¹			K ⁴
	ohne		Z ²			M ³			M ⁵	M ⁴	M ³			K ⁵
II, IV VI	ab Eta		Z ³			Z ²			M ⁴	M ³				M ²
	dazw.		Z ⁴			Z ³			M ⁵	M ⁴				M ³
	ohne		Z ⁵			-			Z ¹	M ⁵				-
III, V	dazw.													
	ohne		Z ⁵			Z ⁵			Z ¹	M ⁵				M ⁵
VII	ohne		Z ²			Z ²				M ⁵				M ⁵
VIII ⁺	ohne		A ¹			A ¹				Z ⁴				Z ⁴
VIII ⁰	ohne		A ³			A ³				A ¹				A ¹
VIII ⁻	ohne		A ⁵			A ⁵				A ³				A ³

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		Staubsand		Bänderstaubsand		Staubsand (Sammelform)		Decklehm		Tieflehm u. Tiefton		Lehm
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-ri-glaziär.	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone										Lehmkerf Ton
			S	aIS+IS	S	aIS+IS	S	aIS+IS	über S	ü. bS	S	aIS+IS	
I	ab Eta		M ²		K ³		K ⁴		K ⁴	K ²			R ³
	dazw.		M ³		K ⁴		K ⁵		K ⁵	K ³			
	ohne		M ⁴		K ⁵		M ¹		M ¹	K ⁴		K ³	
II, IV VI	ab Eta		Z ¹		M ¹		M ¹						R ⁵
	dazw.		Z ²		M ²		M ²						
	ohne		Z ³		M ³		M ³					K ⁵	
III, V	dazw.												K ¹
	ohne		Z ³		M ³		M ³						
VII	ohne												
VIII ⁺	ohne		Z ⁴		Z ²		Z ⁴						M ³
VIII ⁰	ohne		A ¹		Z ⁴		A ¹						M ⁵
VIII ⁻	ohne		A ³		A ¹		A ³						Z ²

Darst. C 1 - 12: Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit dem Horizontfolgetyp
Saumpodsol

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		mittel- und feinkörniger Sand			grobkörniger Sand			mittel- und feinkörn. Bändersand			grobkörniger Bändersand		
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-ri-glaziär. Perstruk.-Serie	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone											
			S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS
I	ab Eta	80 - 160	M ⁴			M ⁵								
	dazw.	> 160	Z ¹			Z ¹			M ³					
	ohne	frei	Z ³			Z ²			M ⁵					
II, IV VI	ab Eta	80 - 160	Z ²											
	dazw.	> 160	Z ⁴						Z ¹					
	ohne	frei	A ¹						Z ³					
III, V	dazw.	> 160	Z ⁴											
	ohne	frei	A ¹			A ¹			Z ³			Z ³		
VII	ohne	frei	Z ³			Z ³			Z ¹			Z ¹		
VIII ⁺	ohne	frei	A ²			A ²			Z ⁵			Z ⁵		
VIII ⁰	ohne	frei	A ⁴			A ⁴			A ²			A ²		
VIII ⁻	ohne	frei	A ⁵			A ⁵			A ⁴			A ⁴		

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		Staubsand		Bänderstaubsand		Staubsand (Sammelform)		Decklehm		Tieflehm u. Tiefton		Lehm
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-ri-glaziär. Perstruk.-Serie	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone										Lehmkerf Ton
			S	aIS+IS	S	aIS+IS	S	aIS+IS	über S	ü. bS	S	aIS+IS	
I	ab Eta	80 - 160									K ⁴		
	dazw.	> 160					M ²						
	ohne	frei	Z ¹				M ⁴				Z ¹⁺		
II, IV VI	ab Eta	80 - 160									M ³⁺		
	dazw.	> 160					M ⁵				M ³⁺		
	ohne	frei	Z ²				Z ²						
III, V	dazw.	> 160											
	ohne	frei	Z ⁴		Z ⁴⁺		Z ⁴⁺						
VII	ohne	frei											
VIII ⁺	ohne	frei					Z ⁵						
VIII ⁰	ohne	frei					A ²						
VIII ⁻	ohne	frei					A ⁴						

Darst. C 1 - 13: Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen **Podsole (mit flachem Bi), Rügpodsole und Staugleyrügpodsole**

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		mittel- und feinkörniger Sand			grobkörniger Sand			mittel- und feinkörn. Bändersand			grobkörniger Bändersand		
	peri-glaziär.	extrape-glaziär.	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone											
	Perstruk.-Serie		S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS
I	ab Eta	80 - 160	Z ¹	M ⁵	M ⁴	M ⁵	M ⁴	M ³	M ⁵	M ⁴	M ³	M ⁴	M ³	M ²
	dazw.	> 160	Z ²	Z ¹	M ⁵	Z ¹	M ⁵	M ⁴	Z ¹	M ⁵	M ⁴	M ⁵	M ⁴	M ³
	ohne	frei	Z ³	Z ²	Z ¹	Z ²	Z ¹	M ⁵	Z ²	Z ¹	M ⁵	Z ¹	M ⁵	M ⁴
II, IV VI	ab Eta	80 - 160	Z ³											
	dazw.	> 160	Z ⁵						Z ⁴					
	ohne	frei	A ¹	Z ⁵					Z ⁵					
III, V	dazw.	> 160												
	ohne	frei	A ¹	Z ⁵	Z ⁴	A ¹	Z ⁵	Z ⁴	Z ⁵	Z ⁴	Z ³	Z ⁵	Z ⁴	Z ³
VII	ohne	frei	Z ³	Z ²		Z ³	Z ²		Z ["]	Z ¹		Z ["]	Z ¹	
VIII ⁺	ohne	frei	A ²	A ¹		A ²	A ¹		A ¹	Z ⁵		A ¹	Z ⁵	
VIII ⁰	ohne	frei	A ⁴	A ³		A ⁴	A ³		A ³	A ²		A ³	A ²	
VIII ⁻	ohne	frei	A ⁵	A ⁵		A ⁵	A ⁵		A ⁵	A ⁴		A ⁵	A ⁴	

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		Staubsand		Bänderstaubsand		Staubsand (Sammelform)		Decklehm		Tieflehm u. Tiefton		Lehmkerf Ton
	peri-glaziär.	extrape-glaziär.	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone										
	Perstruk.-Serie		S	aIS+IS	S	aIS+IS	S	aIS+IS	über S	ü. bS	S	aIS+IS	
I	ab Eta	80 - 160	M ⁵		M ⁴⁺	M ³⁺	M ⁵	M ³			M ⁴⁺	M ²⁺	M ¹⁺
	dazw.	> 160	Z ¹		M ⁵⁺		Z ¹	M ⁴			M ⁴⁺	M ³⁺	M ²⁺
	ohne	frei	Z ³	Z ²	Z ¹⁺	M ⁵⁺	Z ²	M ⁵			M ⁵⁺	M ⁴⁺	
II, IV VI	ab Eta	80 - 160									Z ¹⁺		
	dazw.	> 160	Z ⁴		Z ³⁺		Z ⁴				Z ²⁺	Z ¹⁺	M ⁵⁺
	ohne	frei	Z ⁵		Z ⁴⁺		Z ⁵						Z ¹⁺
III, V	dazw.	> 160									Z ²⁺	Z ¹⁺	M ⁵⁺
	ohne	frei	Z ⁵		Z ⁴⁺		Z ⁵	Z ³					
VII	ohne	frei											Z ¹
VIII ⁺	ohne	frei	A ¹		Z ⁵		A ¹	Z ⁴			Z ⁴	Z ³	Z ²
VIII ⁰	ohne	frei	A ³		A ²		A ³	A ¹			A ¹	Z ⁵	Z ⁴
VIII ⁻	ohne	frei	A ⁵		A ⁴		A ⁵	A ³			A ³	A ²	A ¹

Darst. C 1 - 14: Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen der **restlichen Podsole** (Bi-Obergrenze in über 20 cm Tiefe)

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		mittel- und feinkörniger Sand			grobkörniger Sand			mittel- und feinkörn. Bändersand			grobkörniger Bändersand		
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-glaziär. Perstruk.-Serie	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone											
			S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS
I	ab Eta	80 - 160												
	dazw.	> 160	Z ³			Z ²			Z ²					
	ohne	frei	Z ⁴			Z ³			Z ³					
II, IV VI	ab Eta	80 - 160	Z ⁵											
	dazw.	> 160	A ¹						Z ⁵					
	ohne	frei	A ²						A ¹					
III, V	dazw.	> 160												
	ohne	frei	A ²			A ²			A ¹			A ¹		
VII	ohne	frei	Z ⁴			Z ⁴			Z ³			Z ³		
VIII ⁺	ohne	frei	A ³			A ³			A ²			A ²		
VIII ⁰	ohne	frei	A ⁵			A ⁵			A ⁴			A ⁴		
VIII ⁻	ohne	frei	A ⁵			A ⁵			A ⁵			A ⁵		

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		Staubsand		Bänderstaubsand		Staubsand (Sammelform)		Decklehm		Tieflehm u. Tiefton		Lehm
	peri-glaziär. Perstruk.-Serie	extrape-glaziär. Perstruk.-Serie	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone										Lehmkerf Ton
			S	aIS+IS	S	aIS+IS	S	aIS+IS	über S	ü. bS	S	aIS+IS	
I	ab Eta	80 - 160			M ⁵⁺								
	dazw.	> 160	Z ²		Z ¹⁺						M ⁵⁺		M ⁴⁺
	ohne	frei	Z ³		Z ²⁺						Z ¹⁺		
II, IV VI	ab Eta	80 - 160											
	dazw.	> 160	Z ⁴		Z ³⁺		Z ³⁺				Z ³⁺		Z ²⁺
	ohne	frei	Z ⁵		Z ⁴⁺		Z ⁴⁺						
III, V	dazw.	> 160	Z ⁴		Z ³⁺						Z ³⁺		Z ²⁺
	ohne	frei	Z ⁵		Z ⁴⁺						Z ⁴⁺		
VII	ohne	frei											
VIII ⁺	ohne	frei	A ¹		Z ⁵		A ¹				Z ⁵		Z ⁴
VIII ⁰	ohne	frei	A ³		A ²		A ³				A ²		A ¹
VIII ⁻	ohne	frei	A ⁵		A ⁴		A ⁵				A ⁴		A ³

Darst. C 1 - 15: Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen **Rü-
gerde und Fahrrügerde**

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		mittel- und feinkörniger Sand			grobkörniger Sand			mittel- und feinkörn. Bändersand			grobkörniger Bändersand			
	peri- glaziär. Perstruk.-Serie	extrape- riglaziär. Perstruk.-Serie	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone												
			S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS	S	aIS	IS	
I	ab Eta	80 - 160	M ⁴	M ²	M ¹	M ²	M ¹	K ⁴	M ³	M ¹	K ⁴	M ¹	K ⁴	K ³	
	dazw.	> 160	M ⁵	M ³	M ²	M ³	M ²	K ⁵	M ⁴	M ²	K ⁵	M ²	K ⁵	K ⁴	
	ohne	frei	Z ¹	M ⁴	M ³					M ⁵	M ³	M ¹			
II, IV VI	ab Eta	80 - 160													
	dazw.	> 160	Z ³							Z ¹					
	ohne	frei	Z ⁴							Z ²					
III, V	dazw.	> 160													
	ohne	frei	Z ⁴	Z ²	Z ¹	Z ⁴	Z ²	Z ¹	Z ²	M ⁵	M ⁴	Z ²	M ⁵	M ⁴	
VII	ohne	frei	Z ¹	M ⁵	M ⁴	Z ¹	M ⁵	M ⁴	M ⁵	M ⁴	M ³	M ⁵	M ⁴	M ³	
VIII ⁺	ohne	frei	Z ⁵	Z ⁴	Z ³	Z ⁵	Z ⁴	Z ³	Z ⁴	Z ³	Z ²	Z ⁴	Z ³	Z ²	
VIII ⁰	ohne	frei	A ²	A ¹	Z ⁵	A ²	A ¹	Z ⁵	A ¹	Z ⁵	Z ⁴	A ¹	Z ⁵	Z ⁴	
VIII ⁻	ohne	frei	A ⁴	A ³	A ²	A ⁴	A ³	A ²	A ³	A ²	A ¹	A ³	A ²	A ¹	

KMgCaP - Serie	CaCO ₃ -Tiefe bei		Staubsand		Bänder- staubsand		Staubsand (Sammelform)		Decklehm		Tieflehm u. Tief-ton		Lehm
	peri- glaziär. Perstruk.-Serie	extrape- riglaziär. Perstruk.-Serie	mit der Körnungsart in der periglaziären Deckzone										Lehm- kerf Ton
			S	aIS+IS	S	aIS+IS	S	aIS+IS	über S	ü: bS	S	aIS+IS	
I	ab Eta	80 - 160	M ³		M ¹⁺		M ²	K ⁴			M ¹⁺	K ⁴	K ²
	dazw.	> 160	M ⁴		M ²⁺		M ³	K ⁵			M ²⁺	K ⁵	
	ohne	frei	M ⁵		M ³⁺		M ⁴	M ¹					
II, IV VI	ab Eta	80 - 160	Z ¹	M ³	M ⁴⁺	M ¹	M ⁵	M ²			M ³⁺	M ¹⁺	
	dazw.	> 160	Z ²	M ⁴	M ⁵⁺	M ²	Z ¹	M ³			M ⁴⁺	M ²⁺	
	ohne	frei	Z ³	M ⁵	Z ¹⁺	M ³	Z ²	M ⁴					
III, V	dazw.	> 160									M ⁴⁺	M ²⁺	M ¹⁺
	ohne	frei	Z ³	M ⁵	Z ¹⁺	M ⁴	Z ²	M ⁴					
VII	ohne	frei											M ³
VIII ⁺	ohne	frei	Z ⁴		Z ³		Z ⁴	Z ²			Z ²	Z ¹	M ⁴
VIII ⁰	ohne	frei	A ¹		Z ⁵		A ¹	Z ⁴			Z ⁴	Z ³	Z ²
VIII ⁻	ohne	frei	A ³		A ²		A ³	A ¹			A ¹	Z ⁵	Z ⁴

1.2.1.1.1. Herleitung der Nährkraftstufe der halbhydromorphen Sandböden

Nach SEA 95 wurde die Nährkraft der halbhydromorphen Sandböden bisher nach den NB-Stufen im A-Horizont und den V-Werten im G-Horizont (Saugsaum) hergeleitet. Da die Bestockung den Oberboden maßgeblich beeinflusst und das Grundwasser diesen Einfluß nur bedingt kompensiert, soll die Nährkraftherleitung bei halbhydromorphen Sandböden in der Fassung der SEA 95-1 geändert werden.

Es werden drei Gruppen unterschieden:

1. Die **Gleybraunerden, Gleypodsolbraunerden, Gleyrügerden, Gleyrumpfrosterden und Gleyranker** werden wie ihre anhydromorphen Parallelförmigkeiten eingestuft. Die NB-Stufe im Oberboden entfällt als Anspruchsmerkmal. Das Merkmal „Nährstoffserie“ wird analog den anhydromorphen Formen erfaßt. Es werden kalkfreie Böden vorausgesetzt. Die Merkmalerfassung der Körnung kann unverändert bleiben.
Der V-Wert im Saugsaum wird nur bei der Grundwassertiefenstufe 4 und bei einem Wert von > 40 % wie folgt berücksichtigt:
Gleybraunerden, Gleypodsolbraunerden und Gleyrügerden der Serie I werden 3/5 Nährkraftstufen und die der Serie II und schlechter werden 5/5 Nährkraftstufen besser eingruppiert. Gleyrumpfrosterden und Gleyranker aller Nährstoffserien werden zwei Nährkraftstufen (= 10/5) besser eingruppiert.

Begründung: Bei den Sand-Gleybraunerden, Sand-Gleypodsolbraunerden und Sand-Gleyrügerden der Serie I wirkt reiches Grundwasser in der Tiefenstufe 4 nicht deutlich nährkraftverbessernd, da das Substrat insgesamt nährstoffreich ist und die Nährstoffe im verwitterten Bv-Horizont gut verfügbar sind (3/5 Nährkraftstufen Nährkraftherhöhung bei V-Wert im Saugsaum > 40). Ab Serie II ist die Substratausstattung nährstoffärmer und reiches Grundwasser in der Tiefenstufe 4 wirkt deutlicher nährkraftverbessernd (5/5 – Nährkraftstufen Nährkraftherhöhung bei V-Wert im Saugsaum > 40).

Bei den Sand-Gleyrumpfrosterden ist der Bv-Horizont weitestgehend gekappt. In der Nährkraftbewertung sind diese Böden dadurch schlechter eingestuft als Böden mit Bv-Horizont. Das reiche Grundwasser in der Tiefenstufe 4 gleicht den Verlust des Bv-Horizontes aus und sorgt bei diesen Böden bei allen Nährstoffserien für eine deutliche Nährkraftverbesserung des Standortes (10/5 – Stufen Nährkraftherhöhung).

Die Grundwassertiefenstufe 4 wird als Abgrenzkriterium definiert, da bei Grundwassertiefenstufe 5 bereits die Merkmale für anhydromorphe Böden erfüllt sind, bei denen der V-Wert im G-Horizont kein Feinmerkmal ist.

Beispiele:

Hauptbodenform	GW-Form	V-Wert im Ss > 40 %	Serie des Naturraumes	kalkfreie, anhydromorphe Parallelform	abgeleitete Nährkraft	Feinbodenform
s GB	45	X	I	LeS	K ⁴	HtSB
s GB	45	X	II	NeS	K ⁵	HtSB
s GB	45	-	I	LeS	M ²	HdSB
s GB	45	-	II	NeS	M ⁵	HdSB
s GB	56	X	I	LeS	M ²	HdSB
s GB	56	X	II	NeS	M ⁵	HdSB
s GRRE	45	X	I	NdS	K ²	AnSB
s GRRE	45	-	I	NdS	Z ²	NeSB
s GRRE	56	X	I	NdS	Z ²	NeSB
s GRRE	56	-	I	NdS	Z ²	NeSB
s GRa	45	X	III	KdS	M ¹	neue Form
s GRa	45	-	III	KdS	A ¹	FdSB
s GRa	56	X	III	KdS	A ¹	FdSB
s GRa	56	-	III	KdS	A ¹	FdSB

2. Die halbhydromorphen Sandböden der **Podsolgruppe**. Die Nährkraftherleitung erfolgt über die Merkmalskombination der entsprechenden anhydromorphen Sandböden des betreffenden Naturraumareals unter Berücksichtigung des V-Wertes im Saugsaum. Die NB-Stufe im Oberboden entfällt als Ansprachemerkmalsmerkmal. Die Merkmalerfassung der Körnung kann unverändert bleiben.

Zugrundegelegt werden kalziumkarbonatfreie Böden. Die Nährkraftstufe wird nach SEA 95-1, Teil C – Seiten 29 und 31 bis 37 ermittelt. Die so festgestellte Nährkraftstufe erhält je nach V-Wert im Saugsaum und nach Nährstoffserie einen Zuschlag bei den Fünftel-Nährkraftstufen:

Serie I	V-Wert = > 40	4 Nährkraftfünftelstufen
	V-Wert = 15 – 40	2 Nährkraftfünftelstufen
	V-Wert = < 15	0 Nährkraftfünftelstufen
Serie II – VIII	V-Wert = > 40	5 Nährkraftfünftelstufen
	V-Wert = 15 – 40	3 Nährkraftfünftelstufen
	V-Wert = < 15	0 Nährkraftfünftelstufen

Über die so ermittelte Nährkraft wird die Feinbodenform im Bodenformenkatalog bestimmt.

Beispiel:

Ausgangssituation

Sand-Gleygraupodsol mit der Wasserstufe 56 im Naturraumareal der Nährstoffserie II, Körnung reiner Sand, Bi-Tiefe bis 20 cm, V-Wert im Saugsaum 15-40 %.

Herleitung der Nährkraft

Die anhydromorphe Parrallelform ist ein Sand-Graupodsol der Serie II. Körnung und Bi-Tiefe ergeben bei einer kalkfreien Form laut SEA Teil C (Darst C 1 – 13) die Nährkraftstufe A¹. Die Nährkraft wird durch den V-Wert im Saugsaum um 3 Fünftelstufen aufgewertet. Damit ergibt sich für den halbhydromorphen Sand-Gleygraupodsol die Nährkraft Z³ (A¹ plus ³ = Z³). Die halbhydromorphe Bodenform mit diesen Merkmalen und dieser Nährkraft ist der Trenter Sandgleygraupodsol (TrSB). Die Wasserstufe (56) bleibt gleich.

3. Halbhydromorphe Sandböden mit dem Horizontfolgetyp **Rendzina** werden nach SEA 95-1 (Stand 2002) – Teil C – Seite 27 eingestuft.

1.2.1.1.2. Herleitung der Nährkraftstufe aus der NB-Stufe

Zur Herleitung der Stickstoff- und Säure-Basenstufen dienen die folgenden Darstellungen:

Darst. C 1 - 16: Wertespannen für die NB-Stufen

Säure-Basenstufe	V-Wert (%)	p _H /KCl	V-Stufe (SEA 74)
B ₈ karbonathaltig	> 66	≥ 6,0	-
B ₇ basenreich	> 46 ... 66	4,8 ... 6,2	V ₁
B ₆ basenkräftig	>30 ... 46 (48)	4,0... 5,0	V ₂
B ₅ mäßig basenhaltig	>18 ... 30 (32)	3,2 ... 4,2	V ₃
B ₄ ziemlich basenarm	> 10 ... 18 (20)	< 3,4	V ₄
B ₃ basenarm	> 6 ... 10 (12)	< 3,2	-

Die in Klammern gesetzten Werte sind Grenzwerte für die zulässige Überlappung.

Stickstoffstufe	N _t von C _t % (N _C %)	C/N	N-Stufe (SEA 74)
N ₈ sehr stickstoffreich	≤ 10,4	≥ 9,6	-
N ₇ stickstoffreich	> 6,8 ... 8,6	11,6 ... 14,7	N ₁
N ₆ stickstoffkräftig	7,0 ... 5,4	14,2 ... 18,5	N ₂
N ₅ mäßig stickstoffhaltig	5,6 ... 4,2	17,8 ... 23,8	N ₃
N ₄ ziemlich stickstoffarm	4,4 ... 3,2	22,7 ... 31,2	N ₄
N ₃ stickstoffarm	3,4 ... 2,4	29,4 ... 41,6	N ₅
N ₂ sehr stickstoffarm	≤ 2,6	≥ 38,6	-
N ₁ extrem stickstoffarm			-

Die beiden obigen Darstellungen enthalten in der rechten Spalte die bisher gebräuchlichen VN-Stufen. Anstelle der V-Stufen treten die B-Stufen. Um eine Einheitlichkeit zwischen den analytischen Merkmalen der Stamm- und Zustandseigenschaften herbeizuführen, sind die Indizes der N-Stufen denen der B-Stufen angepaßt worden. Im Gegensatz zu den klein geschriebenen Symbolen der Zustandseigenschaften werden die der Stammeigenschaften groß geschrieben.

Die N- und B-Stufen des Oberbodens sowie die B-Stufen des G- oder S-Horizontes kombinieren sich in einer bestimmten Weise. Die Kombinationen dienen der Herleitung der Nährkraftstufen in der Formenebene (vgl. Abschnitt A 1.5.1.2.).

Darst. C 1 - 17: Kombination von Nährkraftstufe und NB-Stufe

Nährkraftstufe	Kombination von N- und B-Stufe
R reich	N ₇ mit B ₇
RC ... und karbonatisch	N ₇ mit B ₈
K kräftig	N ₆ mit B ₆
KC ... und karbonatisch	N ₆ mit B ₈
M mittel oder mäßig nährstoffhaltig	N ₅ mit B ₅
MC ... und karbonatisch	N ₅ mit B ₈
Z ziemlich arm	N ₄ mit B ₄
ZC ...und karbonatisch	N ₄ mit B ₈
A arm	N ₃ mit B ₄ und N ₃ mit B ₃
AC ...und karbonatisch	N ₃ mit B ₈

1.2.1.1.3. Herleitung der Nährkraftstufe bei stärker entwässerten Sandböden

1.2.1.1.3.1 Sandböden der Halbgleygruppe

Erreichen Entwässerungen ein solches Ausmaß, daß sich für die **Sandböden der Halbgleygruppe** im langjährigen Mittel die Tiefenstufe 7 (grundwasserfern) ergibt, erhalten sie die Normalstufe der Nährkraft der parallelen anhydromorphen Feinbodenform unter Berücksichtigung der KMgCaP-Serie des betreffenden Naturraumareals, ohne Berücksichtigung des V-Wertes im Saugsaum. Zugrunde gelegt werden dabei stets die **kalziumkarbonatfreien Parallelförmigen** (mit Ausnahme der Gleyrendzinen). Hierunter fallen Feinbodenformen mit Sand, Grand und Staubsand sowie Bändersand, Bändergrand und Bänderstaubsand, außerdem Skelettsand, Skelettgrand und Skelettstaubsand sowie Skelettbändersand, Skelettbändergrand und Skelettbänderstaubsand.

1.2.1.1.3.2 Kombinationsbodenformen – entwässerte und podsolierte vollhydromorphe Sandböden

In ausgedehnten Sand-Niederungen, wie z.B. in der Lewitz, treten vollhydromorphe Sand-Hauptbodenformen auf, bei denen eine großflächige Grundwasserabsenkung zu einer sekundären Podsolierung führte. Bei diesen Hauptbodenformen erfolgt die Nährkraftherleitung über die Merkmalskombination der entsprechenden anhydromorphen Sandböden des betreffenden Naturraumareals unter Berücksichtigung des V-Wertes im Saugsaum. Zugrundegelegt werden kalziumkarbonatfreie Böden. Die Nährkraftstufe wird nach SEA 95 – Teil C – Seiten 29 und 32 bis 35 ermittelt. Die so festgestellte Nährkraftstufe erhält je nach

V-Wert im Saugsaum und nach Nährstoffserie einen Zuschlag bei den Fünftel-Nährkraftstufen:

Serie I	V-Wert = > 40	4 Nährkraftfünftelstufen
	V-Wert = 15 – 40	2 Nährkraftfünftelstufen
	V-Wert = < 15	0 Nährkraftfünftelstufen
Serie II – VIII	V-Wert = > 40	5 Nährkraftfünftelstufen
	V-Wert = 15 – 40	3 Nährkraftfünftelstufen
	V-Wert = < 15	0 Nährkraftfünftelstufen

1.2.1.1.3.3. Vollhydromorphe Sandböden ohne Podsolierung

Bei diesen Böden treten nach Entwässerung Disharmonien im Oberboden zwischen der Stickstoff- und Basenversorgung auf. Die Disharmonien nehmen mit größer werdender Trockenheit der Böden zu. Höherer Schluff- und Tongehalt und/oder Wiesenkalk wirken mindernd auf die Disharmonie.

Eine Parallelisierung mit den anhydromorphen Böden kann nicht erfolgen, da sonst immer A-C-Profile, also Sand-Ranker, entstehen würden, die die aktuelle Nährkraft nicht widerspiegeln.

Die Herleitung der Stamm-Nährkraft erfolgt deshalb durch Mitteln des N- Status des Oberbodens mit einem B_{ges} -Status.

Der B_{ges} -Status setzt sich wie folgt zusammen:

$$B_{ges} = \frac{B_{Oberboden} + 2 \times B_{Saugsaum}}{3}$$

1.2.1.1.4. Veränderungen der Normalstufe der Nährkraft

Bei der Bestimmung der Nährkraftstufe geht man von der „**Normalstufe**“ aus, d.h. von der Nährkraft einer weder unter- noch überlagerten Bodenform in ebener Lage ohne Besonderheiten der relief- und bodenbedingten Abweichungen vom Großklima.

Darst. C 1 - 18: Zuordnung der Stamm-Bodenformen zur Stamm-Nährkraftstufe bei Abweichungen von der „Normalstufe“

Stamm- Bodenformen	Normal- stufe der Nährkraft 1)	Abweichungen bei			
		reliefbedingt mäßig und stark windverhagert	nicht windgeschützt oder verhagert		
			../K, ../KL Zusatz- bezeichnung ... + bei allen Sand- böden der Feuchtestufe (T) ... 2 und ...2g	../KO, ../L, ../O, ../T Höherstufung bei reinem Sand, Grand und Staub- sand aller reliefbe- dingter Feuchtestu- fen und Grund- wasserformen	../E, ../C, ../IS Zusatz- bezeichnung ... + bei allen Sandbö- den der Feuchtestu- fe (T) ... 2 und ..2g
anhydro- morphe Sandböden	R	M .. v	-	-	-
	K	Z .. v	-	-	-
	M	A .. v	M + ..	M	-
	Z	A .. v	Z + ..	Z	-
	A	-	A + ..	A	A +
Rest der an- hydromorphen Böden	R	M .. v	-	-	-
	K	Z .. v	-	-	-
	M	A .. v	-	-	-
	Z	A .. v	-	-	-
	A	-	-	-	-
Sandböden der Halbgley- gruppe	R	-	-	-	-
	K	-	-	-	-
	M	-	M + ..	M	-
	Z	-	Z + ..	Z	-
	A	-	A + ..	A	A +
			einschließlich	ohne	einschließlich
Ranker und Podsole					

1) Die Normalstufe der Nährkraft ist dem Zuordnungs-Katalog, dem alphabetischen Feinbodenformen-Verzeichnis oder dem Bodenformen-Katalog zu entnehmen.

Nach Darst. C 1 - 18 und nach den sich daraus ergebenden Konsequenzen verändert sich die Normalstufe der Nährkraft bei

- Windverhagerung
- Unterlagerung von Sandböden durch bindige Substrate
- Überlagerung eines Bodens durch einen anderen Boden
- zweischichtigen Böden.

Zu dieser Darstellung folgen einige ergänzende Bemerkungen:

Berücksichtigung von Windverhagerung

Bei reliefbedingt mäßig und stark **windverhagert** verschlechtert sich bei den trockenen und mittelfrischen anhydromorphen Mineralböden die Normalnährkraftstufe um 2 Stufen bzw. bei Z um 1 Stufe. Die Gruppenbezeichnung erhält die Erweiterung „durch Verhagerung nur ...“ und das Gruppenkurzzeichen ...v (von verhagert), z.B.

M3v, M2v.

Berücksichtigung von Unterlagerungen

Bei nachstehenden **Unterlagerungen** mit

- .../K = kalkunterlagert (mit Halbkalk und Kalk)
- .../KL = kalklehmunterlagert (mit Kalklehm, Kalkschluff und Kalkton)
- .../KO = kalkklockunterlagert (mit Kalkklocklehm und Kalkklockton)
- .../L = lehmunterlagert (mit Lehm und Schluff)
- .../O = klockunterlagert (mit Klocklehm und Klockton)
- .../T = tonunterlagert

treten folgende Veränderung der Normalstufe der Nährkraft ein:

1. Innerhalb der Stamm-Feuchtestufe (T) .. 2 und (T) ..2g erhalten die Nährkraftstufen M, Z und A der Substrattypen Sand, Grand, oder Staubsand sowie Skelettsand, Skelettgrand und Skelettstaubsand den Zusatz ... ⁺, z.B. M⁺2, Z⁺2g, A⁺2.

2. Die Nährkraftstufe von Feinbodenformen mit den Nährkraftstufen M, Z und A wird bei allen reliefbedingten Feuchtestufen und allen Grundwasserformen mit **Ausnahme** der Horizontfolgetypen **Ranker** und **Podsol** erhöht:

- **Anhydromorphe Böden** mit Sand, Grand oder Staubsand sowie Skelettsand, Skelettgrand und Skelettstaubsand auf die Parallelförmigen mit Bändern (aber sonst gleichen Eigenschaften). Die Erhöhung hängt ab von der KMgCaP-Serie, dem Horizontfolgetyp und den Substrateigenschaften der betreffenden Feinbodenform. Die Erhöhung kann eine bis fünf Nährkraft-Fünftelstufen betragen, so daß die Feinbodenformen teils eine andere Nährkraftstufe erhalten, teils in der ursprünglichen verbleiben.

Beispiele:

Ausgangsfeinbodenform ohne Bänder		Parallelförmige mit Bändern	
BgS = M ¹	BgS/L = K ⁴	SoS =	K ⁴
GmS = Z ²	GmS/L = M ⁴⁺	SeS =	M ⁴
TeS = Z ⁴	TeS/L = M ⁴⁺	LöS =	M ⁴
aber			
FtS = M ⁵	FtS/L = M ³⁺	MeS =	M ³
NeS = M ⁵	NeS/L = M ²⁺	DoS =	M ²

In den Zuordnungs-Tabellen sind i.d.R. Beispiele für Unterlagerungen enthalten. Im Übrigen kann den drei Darst. C 1 - 10, 11 und 15 durch zeilenweisen Vergleich der Grad der Erhöhung entnommen werden.

- Stärker entwässerte Böden (Grundwassertiefenstufen 5, 6 und 7) der **Halbgleyggruppe** mit den Substrattypen Sand, Grand, oder Staubsand sowie Skelettsand, Skelettgrand und Skelettstaubsand erhalten - wie oben beschrieben - zunächst die Normalstufe der Nährkraft der parallelen anhydromorphen Feinbodenformen unter Berücksichtigung der KMgCaP-Serie des betreffenden Naturraumareals. Zugrunde gelegt werden dabei stets die **kalziumkarbonatfreien Parallelförmigen**.

In einem zweiten Schritt erfolgen der Vergleich mit der parallelen Bänder-Feinbodenform und die Erhöhung der Teilnährkraftstufen. Dieser **zweite Schritt gilt nicht** für die Horizontfolgetypen **Ranker** und **Podsol** und auch nicht für die **Nährkraftstufen R und K**.

Beispiel:

Ausgangsbodenform:

* HdSB (mfS, aIS in Delta-Zone, Nährkraftstufe M)

* lehmunterlagert, Entwässerung auf Grundwassertiefenstufe 67

Serie	anhydromorphe Parallellform (= Nährkraftstufe ohne Lehmunterlagerung)	Parallellform mit Bändern	Nährkraftstufe bei Lehmunterlagerung
I	LeS = M ²	WgS = K ⁵	HdSB/L67 = K ⁵
III	NeS = M ⁵	DoS = M ²	HdSB/L67 = M ² +
VII	KxS = M ⁴	SrS = M ³	HdSB/L67 = M ³ +
VIII+	WsS = Z ²	TIS = Z ¹	HdSB/L67 = Z ¹ +.

Hinweis: Die Zuordnungs-Tabellen enthalten wegen der Berücksichtigung von KMgCaP-Serien keine Beispiele!

Die Nährkraftstufen einschließlich ihrer Fünftel-Teilnährkraftstufen der anhydromorphen Parallellformen zu den Sand-Feinboden-formen der Halbgleygruppe können für die verschiedenen KMgCaP-Serien der Darst. C 1 - 19 entnommen werden. Die Darstellung enthält alle bisher beschriebenen Sand-Feinbodenformen der Halbgleygruppe mit Angaben zum Körnungsprofil, zur Tiefe der Bi-Obergrenze und zur Normalstufe der Nährkraft. Aus Gründen der Platzersparnis erscheinen die Teilstufen der Nährkraft als Hochzahlen.

3. Bei **Unterlagerungen** der Substrattypen reiner Sand, Grand, oder Staubsand sowie Skelettsand, Skelettgrand und Skelettstaubsand mit

- .../C = kohleunterlagert (mit Braunkohle)
- .../E = lettunterlagert (mit Lettlehm und Letton)
- .../IS = lehmsandunterlagert (lehmyger Sand, meist sehr verfestigt)

wird innerhalb der Stamm-Feuchtestufe (T)...2 und (T)..2g die Normalstufe nur bei der Nährkraftstufe **A** zu **A +** verändert. Eine Höherstufung erfolgt nicht. Diese Regelung gilt auch für die Horizontfolgetypen Ranker und Podsol und sie gilt auch für stärker entwässerte Sandböden der Halbgleygruppe, Beispiel für Staubsand-Braunerde und Sand-Saumpodsol.

DbS = Z DbS/E = Z2

AdS = A AdS/E = A+2.

Berücksichtigung zweistöckiger Böden

Bei zweistöckigen Böden in der Kombination mit dem Wörtchen „**über**“ wird die Mitte von beiden Bodenformen zur Gesamt-Nährkraftstufe. Bei den nach der KMgCaP-Serie definierten Bodenformen werden dazu die Fünftelstufen der Nährkraft angesetzt; bei den Böden der Halb- und Graugleygruppe wird das mittlere Fünftel unterstellt. Diese Regelung gilt stets auch bei Verwendung der Abkürzung

s... = übersandet (gleichzusetzen mit Sand-Ranker über ...) z.B.

sLeS = M⁵.

[Die zusätzliche Kennzeichnung von Klockeinfluß im Oberboden: „...o = klockbeeinflußt oder ...ko = kalkklockbeeinflußt“ entfällt. Diese Fälle werden wie zweistöckige Böden behandelt, also Klockformen über ...]

Zur Ermittlung der Fünftelsummen-Nährkraftstufe dienen die Darst. C. 1 - 20 bis 22. Verwendet werden die zu den beteiligten Bodenformen gehörenden eingekästelten Zahlen, z.B.

$$\frac{\text{DaS}(8)}{\text{GvS}(18)} = \frac{8+18}{2} = \frac{26}{2} = 13 = \text{M}^5$$

Bei zweistöckigen Böden in der Kombination "**über tiefliegendem**" wird in gleicher Weise verfahren, nur wird die Nährkraft der oberen Form doppelt gewichtet, z.B.

$$\frac{\text{SwS}(8)}{\text{LeS}(14)} = \frac{8+8+14}{3} = \frac{30}{3} = 10 = \text{Z}^1$$

Bei Dezimalbrüchen wird wie üblich abgerundet, z.B.

$$7,4 = \text{Z}^4, \quad 7,5 = \text{Z}^3.$$

Bei allen zweistöckigen Böden wird zusätzlich ein **Pluszeichen** (... +) gesetzt, wenn die Nährkraftstufe der begrabenen Bodenform mehr als 5/5 von der gemittelten Gesamt-Nährkraftstufe in Richtung höherer Nährkraft abweicht, z.B.

$$\frac{\text{SwS}(8)}{\text{DgL}(22)} = \frac{8+22}{2} = \frac{30}{2} = 15 = \text{M}^1 + \quad (\text{Differenz} = 7/5)$$

$$\frac{\text{SwS}(8)}{\text{DgL}(22)} = \frac{8+8+22}{3} = \frac{38}{3} = 12,7 = \text{M}^3 + \quad (\text{Differenz} = 9/5)$$

Berücksichtigung zweischichtiger Böden

Bei zweischichtigen Böden, bei denen sich Substratschichten unterschiedlicher Serienzugehörigkeit überlagern, wird für **die Herleitung der Nährkraftstufe und auch der Serie** das Gesamtprofil verwendet:

überlagernde Substratschicht bis 80 cm mächtig
= KMgCaP-Serie des Liegenden,

überlagernde Substratschicht über 80 cm mächtig
= KMgCaP-Serie des Hangenden.

Diese Regelung ist z.B. dann anzuwenden, wenn die Analysen im Bv-Horizont und C-Horizont eine unterschiedliche Serienzugehörigkeit ergeben.

Sie betrifft nicht zweistöckige Böden.

Darst. C 1 - 19: Sand-Feinbodenformen der Halbgleygruppe und die Nährkraftstufen sowie Fünftel-Teilnährkraftstufen der anhydromorphen Parallellformen unter Berücksichtigung der KMgCaP-Serien

Kurzzeichen	Kurzbezeichnung	δ-Zone	Bi > 20	Tiefe ≤ 20	Körnung	Nährkraft	KMgCaP-Serie						
							I	II,IV,VI	III, V	VII	VIII ⁺	VIII ^o	VIII ^r
Ad SB	s GÜP		> 20			Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ah SB	s GFSP			≤ 20	bs	M ³	M ⁵	Z ³	Z ³	Z ¹	Z ⁵	A ²	A ⁴
Ah SE	s FUGSP			≤ 20	bs	M ³	Z ²	Z ⁵	Z ⁵	Z ²	A ¹	A ³	A ⁵
An SB	s GRRE					Z ²	Z ²	Z ⁵	Z ⁵	Z ²	A ¹	A ³	A ³
Ar SB	s GFHP		> 20		f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
At SB	s GRP			≤ 20	[bs]	Z ²	Z ²	Z ⁵	Z ⁵	Z ²	A ¹	A ³	A ⁵
Ba SB	s GFUP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Bb SB	s GSP			≤ 20	[bs]	Z ³	M ⁵	Z ³	Z ³	Z ¹	Z ⁵	A ²	A ⁴
Bd SB	us GB					Z ³	M ⁵	Z ³	Z ³	M ⁵	Z ⁴	A ¹	A ³
Be SB	s GFHRP		> 20		f	M ⁴	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Bh SB	s GB	I S			[bs]	K ³	K ³	K ⁵	K ⁵	M ²	M ⁵	Z ²	Z ⁴
Bh SE	s HGUP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Bi SB	s GÜ		-			Z ⁴	Z ¹	Z ⁴	Z ⁴	Z ¹	A ³	A ⁵	A ⁵
Bi SE	s UGSP			≤ 20	f	Z ¹	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Bk SB	s GFRa					A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Bl SB	s GMSP		> 20			Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Bl SE	s FHGUP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Bn SB	s MGUP			≤ 20		Z ²	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
BnSB	s GFHRP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Bo SB	s MGSP		> 20		f	Z ²	Z ¹	Z ²	Z ⁴		A ³	A ⁵	A ⁵
Bö SB	s GPB					M ⁵	M ⁵	Z ³	Z ³	M ⁵	Z ⁴	A ¹	A ³
Br SB	s GMHP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Bt SB	s GFRP		> 20		bs	Z ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Bu SB	s MGSP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Bü SB	s GFHRP		> 20		bs	Z ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Bw SB	s GUP		> 20			M ⁵	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Bz SB	s GHRP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Co SB	s GSP		> 20			A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Db SB	s GRa				[bs]	M ⁴	M ³	Z ¹	M ⁵	M ⁵	Z ⁴	A ¹	A ²
Db SE	s FHGSP		> 20			Z ³	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Dd SB	s GHRP			≤ 20	[bs]	Z ²	Z ²	Z ⁵	Z ⁵	Z ²	A ¹	A ³	A ⁵
Dg SB	s GHP		> 20			M ⁵	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Dn SB	s GÜ		-		↑	Z ¹	Z ¹	Z ⁴	Z ⁴	Z ¹	A ³	A ⁵	A ⁵
Dö SB	s GFP		> 20			Z	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Dü SE	s UGUP		> 20			Z ⁵	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Dw SB	s GB	I S				M ³	K ⁵	M ³	M ³	M ³	Z ¹	Z ³	Z ⁵
Dz SB	s GRP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ea SB	s GPB	al S				M ²	M ²	M ⁵	M ⁵	M ⁴	Z ²	Z ⁴	A ¹
Eb SB	s MGSP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ei SB	s GMHP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ei SE	s FAGHP		> 20			Z ⁵	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
EI SB	s GHRP		> 20		g	Z ⁴	Z ³		A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ep SB	s MGSP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Fa SB	s MGHRP			≤ 20	f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Fd SB	s GRa					A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Fh SB	s MGRa					A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Fi SB	s GFRP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Fi SE	s AGRP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Fo SB	s MGRa					Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Fu SE	s HGSP		> 20			A ¹	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵

Kurzzeichen	Kurzbezeichnung	δ-Zone	Bi->20	Tiefe ≤ 20	Körnung	Nährkraft	KMgCaP-Serie						
							I	II,IV,VI	III, V	VII	VIII ⁺	VIII ^o	VIII ^r
Fz SB	s GÜP			≤ 20	bf	M ³⁺	Z ¹⁺	Z ⁴⁺	Z ⁴⁺		Z ⁵	A ²	A ⁴
Ga SB	s GFHP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Gä SB	s GSP		> 20			Z ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ga SE	s FUGHRP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Gd SB	s GB	al S			bg	M ²	K ³	M ¹	M ²	M ³	Z ¹	Z ³	Z ⁵
Ge SB	s GMHRP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Gh SB	s MGHRP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Gh SE	s AGSP		> 20			Z ¹	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Gl SB	s GSP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Gn SB	s MGHP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Go SB	s MGHP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Gö SB	s GB	al S			g	K ⁵	K ⁵	M ⁴	M ⁵	M ⁴	Z ²	Z ⁴	A ¹
Go SE	s HGRP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Gö SE	s FUGGRP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Gs SB	s GFHRP		> 20		[bs]	Z ²	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Gt SB	s GHRP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Gu SB	s GFHRP		> 20			A ¹	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Gü SB	s GRP		> 20		g	Z ¹	Z ³		A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Gv SB	s MGHP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Gw SE	s AGUP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ha SB	s GUP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ha SE	s HGHRP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Hb SB	s GUP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Hd SB	s GB	al S				M ²	M ²	M ⁵	M ⁵	M ⁴	Z ²	Z ⁴	A ¹
Hg SB	s MGHP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Hi SB	s GFHP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Hn SB	s GHP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ho SB	s GFP			≤ 20		Z	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ho SE	s UGUP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Hr SB	s GB					M ⁵	M ⁵	Z ³	Z ³	M ⁵	Z ⁴	A ¹	A ³
Hs SB	s MGHRP		> 20		[bs]	Z ²	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ht SB	s GB	al S				M ⁵	M ²	M ⁵	M ⁵	M ⁴	Z ²	Z ⁴	A ¹
Ib SB	s GFUP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ih SB	s GRP		> 20		[bs]	Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ja SB	s GFSP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Jä SB	s MGHP			≤ 20	f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Jg SB	s GSP		> 20		bs	M ⁵	M ⁵	Z ³	Z ³	Z ¹	Z ⁵	A ²	A ⁴
Jg SE	s HGSP		> 20		bs	M ⁵	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Jh SB	s GMHRP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Jl SB	s MGSP		> 20			Z ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Jl SE	s MGSP		> 20			Z ¹	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Jm SB	s GFUP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Jo SB	s GFUP			≤ 20	f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Js SE	s UGSP		> 20		bf	Z ¹	Z ²⁺	Z ⁴⁺	Z ⁴⁺		Z ⁵	A ²	A ⁴
Ka SB	s GFRP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Kb SB	s MGUP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ke SB	s AGSP		> 20			M ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Kg SB	s GFP		> 20			A	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Kh SB	s MGHP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ki SB	s GMHP		> 20		f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Kk SB	s GFHP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Kl SB	s GFHRP		> 20		f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Km SE	s HGSP		> 20			M ³	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Kn SE	s FUGSP		> 20			Z ³	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵

Kurzzeichen	Kurzbezeichnung	δ-Zone	Bi->20	Tiefe ≤ 20	Körnung	Nährkraft	KMgCaP-Serie						
							I	II,IV,VI	III, V	VII	VIII ⁺	VIII ^o	VIII ^r
Ko SB	s GB	I S			[bs]	M ⁵	K ³	K ⁵	K ⁵	M ²	M ⁵	Z ²	Z ⁴
Kp SB	s GRa				[bs]	M ⁴	M ³	Z ¹	M ⁵	M ⁵	Z ⁴	A ¹	A ²
Kr SB	s GFHP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Kr SE	s HGHRP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ks SB	s GB	I S			[bs]	K ⁵	K ³	K ⁵	K ⁵	M ²	M ⁵	Z ²	Z ⁴
Kt SE	s HGUP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ku SE	s AGSP		> 20			A ¹	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Kw SB	s GRRE	I S			bf	M ³	K ⁵	M ³	M ³		Z ²	Z ⁴	A ¹
Kz SE	s HGSP		> 20			Z ³	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
La SB	s GB	al S			bg	K ⁵	K ³	M ¹	M ²	M ³	Z ¹	Z ³	Z ⁵
Lb SB	s MGHP		> 20		f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Le SE	s HGUP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Li SB	s GPB					Z ³	M ⁵	Z ³	Z ³	M ⁵	Z ⁴	A ¹	A ³
Lo SE	s UGSP		> 20			A ¹	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Lu SB	s GRP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Lü SB	s GMHRP			≤ 20	f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Lü SE	s FHGUP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Lw SE	s HGHP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Lz SB	s GB	al S			bs	K ⁵	K ⁵	M ²	M ²	M ³	Z ¹	Z ³	Z ⁵
Md SB	s GB	al S			[bs]	M ²	K ⁵	M ²	M ²	M ³	Z ¹	Z ³	Z ⁵
Me SB	s GFHRP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Mg SE	s FAGUP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Mi SB	s GHP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Mi SE	s HGHP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Mk SB	s GB	al S			[bs]	K ⁵	K ⁵	M ²	M ²	M ³	Z ¹	Z ³	Z ⁵
Mn SE	s AGSP		> 20			Z ³	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Mo SB	s GRRE				bs	M ⁵	M ⁴	M ⁵	M ⁵	M ⁵	Z ⁴	A ¹	A ³
Ms SB	s GHP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ms SE	s UGSP		> 20			Z ¹	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Mu SB	s GB	al S				M ⁵	M ²	M ⁵	M ⁵	M ⁴	Z ²	Z ⁴	A ¹
Mü SB	s GFUP		> 20		[bs]	A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Mw SB	s GUP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ne SB	s GRRE					Z ⁵	Z ²	Z ⁵	Z ⁵	Z ²	A ¹	A ³	A ³
Nf SE	s FHGHRP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ni SE	s FHGHRP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Nk SB	s GSP		> 20			Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
No SB	s GHP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Nr SE	s AGUP		> 20			M ⁴	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ns SB	s GFHRP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Nu SB	s GUP		> 20		bs	Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Nu SE	s UGUP		> 20		bs	Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Nw SB	s GFSP		> 20		f	Z ²	Z ¹	Z ²	Z ⁴				
Oi SB	s GFHP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Pc SE	s AGUP		> 20		bs	Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Pe SB	s MGSP		> 20		[bs]	Z ²	M ⁵	Z ³	Z ³	Z ¹	Z ⁵	A ²	A ⁴
Pk SB	s MGSP		> 20		f	M ⁴	Z ¹	Z ²	Z ⁴				
Pr SB	s GFSP		> 20			A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Pt SB	s GRa				↑	Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Pz SB	s GFSP		> 20			Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Ra SB	s GHP			≤ 20		Z ⁴	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Rb SB	s GMRa					Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Re SB	s GHRP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Rh SB	s MGHRP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Rk SB	s MGHRP		> 20		f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Rn SB	s GPB				f	Z ¹	M ³	Z ¹	Z ¹		Z ³	Z ⁵	A ²

Kurzzeichen	Kurzbezeichnung	δ-Zone	Bi-> 20	Tiefe ≤ 20	Körnung	Nährkraft	KMgCaP-Serie						
							I	II,IV,VI	III, V	VII	VIII ⁺	VIII ^o	VIII ^r
Rö SE	s UGHP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Rr SB	s GFUP		> 20		bs	Z ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Rs SB	s MGUP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Rt SB	s GMHRP			≤ 20	f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Ru SE	s MGUP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Sa SB	s MGHP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Sb SE	s FUGHP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Sc SB	s GHRP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Sd SB	s GMSP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Se SB	s GFP			≤ 20		A	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Sf SB	s GRa					Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Sh SB	s GHP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Sh SE	s UGSP		> 20			Z ³	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Si SB	s GMRa					A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Sm SB	s GHRP		> 20		[bs]	Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Sm SE	s FUGSP			≤ 20		M ⁴	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Sn SE	s HGHP		> 20			M ⁵	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Sö SB	s GRP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Sp SE	s UGHRP		> 20			Z ⁵	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Sr SB	s MGUP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ss SB	s GFRa					Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
St SB	s GSP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Sü SB	s GMHP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Sw SB	s GMHRP		> 20		f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Sz SB	s GMSP		> 20			A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Tb SB	s MGHP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Te SB	s GB	I S			bg	K ¹	K ¹	K ⁴	K ⁵	M ²	M ⁵	Z ²	Z ⁴
Tm SB	s MGSP		> 20			Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Tr SB	s GUP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Tu SE	s MGUP			≤ 20		Z ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Tw SB	s GFUP			≤ 20	bs	M ⁵	Z ²	Z ⁵	Z ⁵	Z ²	A ¹	A ³	A ⁵
Tw SE	s MGUP			≤ 20	bs	M ⁵	Z ²	Z ⁵	Z ⁵	Z ²	A ¹	A ³	A ⁵
Ut SE	s FUGSP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Vi SB	s GB				bf	M ¹	M ¹	M ⁴	M ⁴	M ⁴	Z ²	Z ⁴	A ¹
Vo SE	s HGSP		> 20			Z ¹	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Vs SB	s GÜP			≤ 20	f	Z ¹	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Wb SB	s GHRP			≤ 20		A ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Wb SE	s HGRP			≤ 20		Z ¹	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Wd SB	us GB	al S				M ⁵	M ²	M ⁵	M ⁵	M ⁴	Z ²	Z ⁴	A ¹
Wd SE	s UGHRP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
We SB	s GHRP		> 20			Z ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Wi SB	s GFHRP		> 20		f	Z ²	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Wk SB	s GRP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Wl SB	s GFRP		> 20		[bs]	Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Wr SB	s GMSP			≤ 20		Z ³	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Wu SB	s GMHP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Ww SB	s GHP		> 20		f	Z ⁵	Z ³	Z ⁵	Z ⁵		A ¹	A ³	A ⁵
Ww SE	s UGUP		> 20		bs	A ²	Z ³	A ¹	A ¹	Z ³	A ²	A ⁴	A ⁵
Wz SE	s UGHP		> 20			Z ⁴	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Za SE	s HGRP		> 20			Z ⁵	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵
Zü SB	s GUP		> 20			A ²	Z ⁴	A ²	A ²	Z ⁴	A ³	A ⁵	A ⁵

Darst. C 1. - 20: Fünftel-Nährkraftstufen bei Feinbodenformen mit KMgCaP-Serie I

Fünftel	R	K	M	Z	A																																	
1	25	Bb R Bu LU Cw S Eh tLU Jh tL Ld S Lk tL Ma S Md S Ms R Lz tL	20 Na S Pe R Pm S Sb L Ss tLB Wg R Wh LB	15 As S Bg S Bh LB Dv S Fd tL Rg S Kn S Lb S Mg LB Pc S Sh LB	10 Aw S Bs S Ga S Gh S He tLB Ki S Pd S Qu S Rr S Sa tLB	5																																
							2	24	CrS Cz S Eh tLB Ev tL Fc S Hd R	19 Ja L Lb dL Mu S Ra R Sf S Sg S	14 Bl S G wS Ha tL Jl S Le S Ly tLU	9 Hl S Hs S LwSE Nd S Rl S Sl S	4																									
														3	Br LU St L	23	Ak S Ba R Be S Bm tL Bo tL Bu S Bw S Co LU Cr R Gv S Hp S	18 Kz S Lz tLB Ne dL Nr S Pk S Pl R Pm tL Ml R Wl S Ze tL	13 Ae S Gd S Km SE Ja S Jw S Kr S Lh S Lo S Lz S	8 Da S Ff S Ge S Nh S Nn S Ri S Sk S Sw S Wi S Zd S Zp S	3																	
																						4	Bf T CiS Dg L Ei R Hf TB Ho L Hü R La L Rb LB	22	Ro S Rp LU Rü LU We L Zw R	Af S Au tL Cw R Fb S Gä S Gö S Gü S Jü S Kg S	17 Pt S Ru tK Sö tL So S Th S Up S	12 Bo S Df S Fu tLB Gt S Hk S Kb tLB Lv S Lx S Mf S	7 Nr SE Qs S SmSE Sm tLB We S Zö tLB	2 Eb S Em S Hi S Nb S Um S								
																															5	Ca L Di T Go R Gs ITU Ik dL Kh R Ld tLB Pi R Rd S Sf L	21 Ts tLU	Bm S Cm S El S Fd S Gr S Gz S Kb S Ma R Pg S	16 Pr S Tf S Wg S Ww S Wz R	11 Cp tLB Fn S Fü S Ft S Hm S Hn S Iv S Jm S Ks S Kü S	6 Mh tLB SnSE Su S Wu tLB Zk S	1

Darst. C 1 - 21: Fünftel-Nährkraftstufen bei Feinbodenformen mit
KMgCaP-Serie **II ...VI** und **II ... VIII**

	R	K	M	Z	A					
1	25		20	15	10	5				
		Br L Hü T Mt LU Ra L Wi L Zd L		Ax tLB Br tL Cp S Fr S Gu S Gz tTU Hä S Hg S	Hm tL Hü S Mi S Wd S	Bi SE DI S Ee tLB Gh SE JISE Js SE Kö S Ku tLB Lu S	MsSE Sx R Tn S TuSE Vo S Wb SE Wü S Zi S	Bi S Di S La S Lm S Dß S Fm S Fu SE Ho S Jz S Kd S	Kw S Mü S Nx S Ns S Ru S Nß S Lo SE Ut SE Üz S Zn S	
	2	24		19	14	9	4			
			Go L Kd LB Ri LB Sn LU Zü LU Zw LU		Bd S Do S Ei S Ha S Hw tL Jo S Nz S Rc S	Kf S Kw tLB Lp tTB Mi S Nd dL Rt S	Ah S Df tTB FiSE Gk S Gm S GoSE Hf S HoSE Kp S LeSE Rö S	Wb S Wh tLB Wu S Wx S	At S Br S Eh S Gw SE Hr S KrSE Kt SE Lh S Lü SE Mr S Mw S	Ni SE Os S Re S Rn S Rö SE St S Tr S Wd SE Ww SE Zz S
		3	23		18	13	8	3		
				Bb tL Cd S Gr dLU Pi tT Sk tLU Sw tL Wo tLB		Bz S Et S Gr tLU Hö S Lö S Ls S Pa S Pr tL Pr tLB	Ra S Rk S Sd tL Td S Tr tLE Uc S Uk S Wa S Za S	BäS Db SE GaSE GbS Gö SE Hk tLB HüS Kc S KmS Kn SE Kz SE LnS	Mn SE NuSE PiS RuSE Sb SE ShSE SöS Sp S TüS ÜtS WnS Ze S	
			4	22		17	12	7	2	
					FI S Hf tL Ht S Ke S Ld tL Ln dLB Lö tLU	Mm dLB Re dL Rf tLU Sb tLU Sl tLB	Gr tLB LwS My S OgS Pf S RhS SeS	Ad S Ap S Bb S Bh SE BI SE Cf S Ha SE Jn S Lü S Mg SE Mh S Mi SE	Mö tLB NfSE Nr SE PcSE Te S Wz SE	

Darst. C 1 - 21: Fünftel-Nährkraftstufen bei Feinbodenformen mit KMgCaP-Serie II ...VI und II ... VIII Fortsetzung						
	R	K	M	Z	A	
5	Li L	21	16	11	6	1
			Be tL	Ar S	Bh S	Lr S
			Bü R	Ah SE	Cn S	Nm S
			Cb S	Bk S	Dh S	Ps S
			Fe S	HZ S	Dü S	Pz S
			Ho TU	Jg SE	DüSE	Rü S
			Ka S	Kk S	EiSE	SpSE
			Om S	Ne S	Eo S	Tg S
			Pp S	Sm S	Fh S	To S
			Re tLU	Sn S	Fu S	Tu S
			Su L	Tw SE	Go S	Wa R
			VI S	Wt S	Gß S	Wk S
				Tz S	Jb S	Wt S
				Hh S	ZaSE	
				Li S		

Darst. C 1. - 22: Fünftel-Nährkraftstufen bei Feinbodenformen mit
KMgCaP-Serie **VII ... VIII** und **Sonderserien**

	R	K	M	Z	A
1	25	20	15	10	5
		Gr T	Fa dLB	Ad tL	Dr S
		Wi tT	Pe TB	Gg S	Fg S
				Gn S	Gf S
				Jä S	La tL
2	24	19	14	9	4
		Bs L	Fi S	Ba LU	Oi S
		Hu LU	Hs dL	Co S	Pi LB
		Kü L	Li dL	Gt R	Sz LB
			Rb S	Kh S	Ws S
				Ko S	
				Lt R	
				Mo S	
3	23	18	13	8	3
		Sa tT	Ad LB	Rö LU	Bü S
			Bö S	Sr S	Db S
			GI S	Sw TU	Gw tLU
			Hb TB	Vi L	Gw tT
			Le L	Wi LB	Hd S
			Mz S		KI S
			Ni LB		Mn S
		Pf L		So tLU	
				Ba S	
				GI R	
				Pe S	
				Tp S	
				Wm S	
				Wü R	

Darst. C 1. - 22: Fünftel-Nährkraftstufen bei Feinbodenformen mit
KMgCaP-Serie **VII ... VIII** und **Sonderserien**
Fortsetzung

4		22		17		12		7	PIS	2
			Bu tL Lü tTB		Ho TU KI tLB Kx S Lg S Pe tL Po tLB Ra tLU Sd S		Bf S Dö tLB Fo S Pw S Sa S Sw tLB Zh S			
5	Ue LU	21		16		11		6		1
					Ag LB Bö LB Bt S Go tTB Gö tTU LI S Ok S Os LU	Rn tL Sc S Sp tT	Ku S Lu tTB Si tL		By S Fw S Gi S He S Or S Ot S Pu S Rs S	Wf S

1.2.1.2. Berücksichtigung karbonatreicher Schichten

1.2.1.2.1. Zuordnung zur Karbonatstufe

Durch das Vorhandensein hochsanstehender karbonatreicher Schichten, die in der Gruppenebene durch die „Karbonatstufe“ berücksichtigt werden, können sich bei den Stamm-Standortsformengruppen Stickstoff- und Säure-Basenstufe in harmonischer oder disharmonischer Beziehung zueinander befinden. Ersteres ist bei der Nährkraftstufe R = Reich der Fall, denn hier stehen sich „karbonatisch“ und „stickstoff-reich“ harmonisch gegenüber. Disharmonische Beziehungen bestehen bei den Nährkraftstufen K = Kräftig bis A = Arm mit den Stickstoffstufen „stickstoffkräftig“ bis „stickstoffarm“, aber der Säure-Basenstufe „karbonatisch“. Solche Beziehungen sind vor allem mit mineralischen Extremstandorten, den in Trocken- und Verhagerungslagen befindlichen Rendzinen, verbunden oder mit karbonatführenden und entwässerten meso- bis oligotrophen Moorstandorten.

Die Zuordnung zur Karbonatstufe erfolgt nach dem Grundprinzip:

⇒ Je hydromorpher ein Standort ist, desto größer muß die Disharmonie sein, damit eine Karbonatstufe gerechtfertigt ist.

Diesem Grundprinzip folgend, wird in der Gruppenebene Karbonat (Kalzium- und Magnesiumkarbonat) berücksichtigt:

1. Im **anhydromorphen Bereich** bei Rendzinen und Bodenformen mit hochanstehendem Karbonat (Kalksand und mehr, aber kein Tiefkalk!), und zwar bei den

Stamm-Feuchtestufen trocken, mittelfrisch und frisch [(T)..3, (T)..2, (T)..1], wechselfrisch [(T)...1w], wechselfeucht [N..2w] sowie überflutungsfeucht [Ü..2] in Kombination mit den Stamm-Nährkraftstufen **R, K und M**.

Beispiele:

Buchsmühler Kalkstaubsand-Rendzina, reliefbedingt trocken	= KC3
Buddenhäger Halbkalk-Braunrendzina	= RC2
Salzmündener Kalklocksand, kurzzeitig gering überflutet	= ÜRC2.

In allen anderen Fällen bleibt der Karbonatgehalt unberücksichtigt.

2. Die vorstehenden Regeln gelten für **vollhydromorphe Böden** und die der **Halbgleygruppe** ebenfalls, wenn durch stärkere Entwässerung die karbonathaltigen Substrate in die Stamm-Feuchtestufe „frisch“ oder bei sehr starker Entwässerung in die Feuchtestufe „mittelfrisch“ gelangen, z.B.

Döllner Kalksand-Gleyrendzina	56	= RC 1
Zittvitzer Kalklehm-Anmoorstaugley	37	= RC 1w.

In den übrigen Fällen bleibt in der Gruppenebene der Karbonatgehalt unberücksichtigt, also

Döllner Kalksand-Gleyrendzina	45	= NR 2
Zittvitzer Kalklehm-Anmoorstaugley	34	= NR 1.

3. Bei **organischen Böden** der Stamm-Feuchtestufen 2 (sumpfig) und 3 (wasserbeherrscht), in der Gruppenebene also bei Sümpfen (0..2) und nassen Brüchern (0..3) ab Stamm-Nährkraftstufe **M** und **nährstoffärmer** wird der Karbonatgehalt in der Gruppenebene ebenfalls angegeben, z.B.

Moor, arm, karbonatisch = M.AC3 = OAC 3.

4. Bei allen Stamm-Standortsformengruppen mit dem Zusatz

...+ = „... mit reichem Untergrund“ und

...v = „... durch Verhagerung nur ...“

entfällt die Unterteilung in eine karbonatfreie und karbonatische Stufe.

1.2.1.2.2. Berücksichtigung von Karbonat im Untergrund

Wenn auf die Darstellung der Feinbodenformen in der Standortkarte verzichtet wird ist es zweckmäßig, das Vorhandensein von Kalzium- und Magnesiumkarbonat im Untergrund auch in der Gruppenebene zu berücksichtigen. Hierdurch lassen sich waldbauliche Entscheidungen leichter fällen und die Baumartenwahl besser steuern, z.B. das Einbringen von Laubbaumarten in großflächige Kiefernforsten. Die Angabe ist vor allem dann zweckmäßig, wenn das Kartierungsgebiet aus einem flächenhaften Wechsel von Feinbodenformen der Serie II und Serie III besteht, also einem flächenhaften Wechsel von Feinbodenformen mit Karbonat und ohne Karbonat im Untergrund.

Beim Vorhandensein von Karbonat im Untergrund wird im Gruppenkurzzeichen hinter die Substratuntergruppe ein hochgestelltes < ca > angefügt, z.B. für

CpS = M2 (bS^{ca}).

Werden Feinbodenformen in der Standortkarte dargestellt, erübrigt sich die zusätzliche Kennzeichnung von Karbonat im Untergrund, weil das Karbonatvorkommen unmittelbar aus der Feinbodenform ablesbar ist.

1.2.1.3. Zuordnung zur Feuchtestufe

Die Stamm-Feuchtestufe ergibt sich aus der Kombination von Hauptbodenform, Mesoklimaeigenschaften als relief- und bodenbedingte Abweichungen vom Großklima in Abstufungen sowie Grund- und Stauwasserform. Sie wird mit Hilfe der Darst. C 1 23 - 27 bestimmt, von denen die Darst. C 1 23 und 24 eigentlich in die Formenebene gehören, der Vollständigkeit halber hier ebenfalls eingefügt werden.

Einzelheiten sind den Tabellen zu entnehmen, nachfolgend sollen einige ergänzende Bemerkungen angeführt werden:

Hauptbodenform

Im **küstenfeuchten Klima** wird bei anhydromorphen Sandböden mit dem Horizontfolgetyp

Filzhumuspodsol	Filzgraupodsol
Filzhumusrostpodsol	Filzsaumpodsol
Filzrostpodsol	Filzrügpodsol

sowie den Grundwasserformen 56, 57, 67 und 7 die Feuchte um eine Stufe erhöht (vgl. Darst. C 1 - 27).

Sand-Gleyfilzpodsole, Sand-Moorgleypodsole und Gleymoorpodsole fallen nur dann unter obige Regelung, wenn sie infolge Entwässerung mit den genannten Grundwasserformen kombiniert sind.

Zwar mächtige, aber humusarme Horizonte von Braunerden u.ä. Hauptbodenformen bleiben bei der Zuordnung zur Feuchtestufe ebenfalls **unberücksichtigt** (hierzu gehört h... = humusreich), desgleichen Humuspodsole, Humusrostpodsole und Humusrügpodsole sowohl im anhydromorphen Bereich als auch im Bereich der Halbgleygruppe.

Reliefbedingte Abweichungen vom Großklima

Während sich der Einfluß der Mesoklimaeigenschaften auf die Feuchtestufe bei stärker hydromorphen Böden verwischt, wirken bei wenig hydromorphen Böden die reliefbedingten Abweichungen

fr = „reliefbedingt frischer“	um eine Feuchtestufe erhöhend,
tr = „reliefbedingt trockener“	um eine Feuchtestufe vermindern.

Grund- und Stauwasserform

Beide sind in Darst. C 1 - 23 bzw. 24 definiert. Die Darstellungen bilden die Grundlage für die Zuordnung zur Stamm-Feuchtestufe, wie sie in den Darst. C 1 - 25 bis 27 zusammengestellt ist.

Bei der Zuordnung zur Feuchtestufe von Böden mit der **Kombination Stauwasserform** (für die obere schwer durchlässige Schicht) und **Grundwasserform** (für den Untergrund) wird in der Standortsformengruppe nur eine Feuchtestufe angegeben. Für die Zuordnung zur Stamm-Feuchtestufe wird die ökologisch wirksamere und damit die feuchtere Wasserstufe herangezogen.

Z.B. LadLU $\frac{36}{56}$ ergibt die Feuchtestufe N...2 w (F_W) – die obere Wasserstufe gilt,

aber BhdLG $\frac{15}{23}$ ergibt die Feuchtestufe N..0 (S_D) – die untere Wasserstufe gilt.

Die Regelung gilt auch für Böden mit oberflächlich stauenden Torfen, wenn gleichzeitig der darunterliegende Boden entwässert ist. Die natürlichen Wasserstufen sind im Bodenformenkatalog SEA, Teil D enthalten.

Decklehme und Decktone der Graugleygruppe ohne allochtoner organischer Substanz (Klock, Fledd, Quebb oder Modd) sowie alle sandunterlagerten Lehm- und Tonböden werden wie Böden ohne Grundwasser behandelt, d.h. für die Zuordnung zur Feuchtestufe wird nur die Stauwasserform berücksichtigt.

Mehrstöckige Böden

Bei den mehrstöckigen Böden wird die Stamm-Feuchtestufe grundsätzlich für den Gesamtboden bestimmt, und zwar nach den Angaben in der Formenebene. Soweit die Bodenform die Feuchtestufe beeinflusst, ist die Bodenform des obersten Stockwerkes maßgebend, z.B. im küstenfeuchten Klima

$$\frac{SwS}{WISB} \quad 6 \quad = \text{Z2g} \quad (\text{nicht Z1, obwohl WISB mit Filz), aber}$$

$$\frac{KwS}{TrS} \quad 6 \quad = \text{Z1} \quad (\text{weil KwS mit Filz}).$$

Weitere Besonderheiten

- Anhydromorphe lehmunterlagerte Sand-Bodenformen mit geringen Stauwasserspuren erhalten die Grundwasserform 57 = halbzeitig grundwasserbeeinflusst, z.B. SoS/L 57.
- Sand-Bodenformen der Halb- und Graugleygruppe mit Lehmunterlagerung werden wie unterlagerungsfreie behandelt; die stärkere Austrocknungstendenz ist erforderlichenfalls

durch einen stärkeren Absinkbetrag zu berücksichtigen. Wird die Lehmunterlagerung jedoch durch Entwässerung freigelegt, dann gilt die Regelung wie zuvor.

- Lehme, Tieflehme, Tone und Tieftone mit schwachen Stauwasserspuren unterhalb von 80 cm Tiefe erhalten als neutrale Bezeichnung die Wasserform 57 = halbezeitig wasserbeeinflusst, z.B. Jh tL 57.
- Zwischen periodischer und episodischer Überflutung wird in der Gruppenebene (entgegen früherer Regelung) nicht unterschieden. Die schwächere ökologische Wirkung einer episodischen Überflutung wird bereits in der Formenebene durch Reduzierung der Andauerstufe auf die einer vergleichbaren schwächeren periodischen Überflutung berücksichtigt.

Darstellung C 1 – 23a: Grundwasserformen (Stand 2002)

Frühjährliche Tiefenstufe	jahreszeitliche Andauerstufe der Überwässerung bzw. Überflutung in Monaten						
	> 10	8 ... 10	6 ... 8	4 ... 6	2 ... 4	1 ... 2	< 1
oberhalb Flur	ständig überwässert bzw. überflutet 11 (Gewässer)	langzeitig überwässert bzw. überflutet 12 (SS)	halbezeitig überwässert bzw. überflutet 13 (S)	kurzzeitig stark mäßig ziempl. gering gering überwässert bzw. überflutet			
				14 (S)	15 (N)	16 (F)	17 (F)

Frühjährliche Tiefenstufe	jahreszeitliche Absinkstufe des Grundwassers						
	0	1	2	3	4	> 4	
	bei spätsommerlich-herbstlichem Tiefstand absinkend in die Tiefenstufe (= 2. Stelle)						
um 0,1 (0 ... 0,2)	ständig grundsumpfig (schwamm- oder schwingsumpfig) 22 (SS)	langzeitig grundsumpfig 23 (S)	halbezeitig grundsumpfig 24 (N)	kurzzeitig stark mäßig ziempl. gering grundsumpfig			
um 0,35 (>0,2 ... 0,5)	ständig grundwasserbeherrscht 33 (N)	langzeitig grundwasserbeherrscht 34 (N)	halbezeitig grundwasserbeherrscht 35 (F)	kurzzeitig stark grundwasserbeherrscht 36 (F)	mäßig 37 (I)		
um 0,75 (>0,5 ... 1,0)	ständig grundwasser-nah 44 (F)	langzeitig grundwasser-nah 45 (F)	halbezeitig grundwasser-nah 46 (I)	kurzzeitig grundwasser-nah 47 (I)			
um 1,4 (>1,0 ... 1,8)	ständig grundwasserbeeinflusst 55 (I)	langzeitig grundwasserbeeinflusst 56 (I)	halbezeitig grundwasserbeeinflusst 57 (I')				
um 2,4 (>1,8 ... 3,0)	ständig schwach grundwasserbeeinflusst 66 (I')	langzeitig schwach grundwasserbeeinflusst 67 (I')					

Darst. C 1 – 24a: Stauwasserformen (Stand 2002)

Frühjährliche Tiefenstufe	jahreszeitliche Andauerstufe nach der Andauer der Überwässerung bzw. Überflutung in Monaten					
	8...10	6...8	4...6	2...4	1...2	< 1
oberhalb Flur	langzeitig	halbzeitig	kurzzeitig			
	überwässert bzw. überflutet	überwässert bzw. überflutet	stark	mäßig	ziemlich gering	gering
	12 (SS)	13 (S)	14 (S)	15 (N)	16 (F)	17 (F)

Frühjährliche Tiefenstufe	jahreszeitliche Andauerstufe nach der Andauer der Austrocknung des Bodens in Monaten					
	um 2	um 4	um 6	um 8	> 8	
um 0,1 (0 ... 0,2)	langzeitig	halbzeitig	kurzzeitig			
	stausumpfig	stausumpfig	stark	mäßig	ziemlich gering	
	23 (S)	24 (N)	25 (N)	26 (F)	27 (F)	
um 0,3 (> 0,2 ... 0,4)	langzeitig	halbzeitig	kurzzeitig			
	stauwasser- beherrscht	stauwasser- beherrscht	stark	mäßig		
	34 (N)	35 (F)	36 (F)	37 (I)		
um 0,6 (> 0,4 ... 0,8)	langzeitig stau- wassernah	halbzeitig stau- wassernah	kurzzeitig stau- wassernah			
	45 (F)	46 (I)	47 (I)			

Um eine Verbindung zu den Darst. C1 - 25 bis 27 herzustellen, sind neben den Kurzzeichen der Wasserstufen die der Feuchtestufen eingetragen. Weil in der Formenebene im Hinblick auf die Grund- und Stauwasserformen maximal 7 Absink- bzw. Andauerstufen vorkommen können, in der Gruppenebene bislang jedoch nur 6 Feuchtestufen vorgesehen waren, ist die Feuchtestufe „frisch“ in zwei Unterstufen aufgegliedert worden. Dadurch wird eine bessere Anpassung beider Ebenen erreicht. Die Kurzzeichen der Feuchtestufen bedeuten:

- SS = sehr sumpfig
- S = sumpfig
- N = naß
- F = feucht
- I = frisch (feuchtere Unterstufe)
- I' = frisch (trockenere Unterstufe)
- M = mäßig frisch (Wasserstufe 7 = Wasser > 3,00 Meter).

Die Feuchtestufe „trocken“ = T gehört nicht zu den Grund- und Stauwasserformen und fehlt deshalb in den beiden Tabellen.

Darst. C 1 – 25a: Zuordnung der Kombination aus Grundwasserform und Bodenform zur Feuchtestufe der Stamm-Standortsformengruppe (Stand 2002)

Früh- jahr- liche Tiefen- stufen	Stamm-Boden- formen- merkmale (jeweils Grundgley)	spätsommerlich-herbstliche Andauerstufe bzw Absinkstufe												
		1	2		3		4		5		6		7	
1	Moor und Gleymoore	Ge- wäss.	O..1	SS	O..2	S _{OÜ}	O..2	S _{OÜ}	O..3ü	N _{OÜ}	O..4ü	F _{OÜ}	O..4ü	F _{OÜ}
	alle Mineral- böden				Ü..0	S _Ü	Ü..0	S _Ü	Ü..1	N _Ü	Ü..2	F _Ü	Ü..2	F _Ü
2	Moor u. Gleymoore		O..1	SS	O..2	S _{OD}	O..3	N _{OD}	O..3	N _{OD}	O..4w	F _{OW}		
	alle Mineral- böden				N..0	S _D	N..1	N _D	N..1w	N _W	N..2w	F _W	N..2w	F _W
3	Moor und Gleymoore				O..3	S _{OD}	O..3	N _{OD}	O..4	F _{OD}				
	alle Mineral- böden						N..1	N _D	N..2	F _D	N..2w	I _W	T..1w	I _W
4	Moor und Gleymoore						O..4	N _{OD}	O..4	F _{OD}	O..4	I _{OD}		
	Voll-,Grau-, Entw.-gleye, Gleypodsole						N..2	N _D	N..2	F _D	N..3	I _E	T..1w	I _W
	übrige Mine- ralböden								N..2	F _D	T..1	I _D	T..1w	I _W
5	Moor u. Gley- moore								O..4	F _{OD}	O..4	I _{OD}		
	Voll-,Grau-, Entw.-gleye, Gleypodsole								N..3	I _E	T..1	I _D	T..2g	I'
	übrige Mine- ralböden								T..1	I _D	T..1	I _D	T..2g	I'
6	Moor u. Gleymoore										O..4	I' _O	O..4	I' _O
	alle Mineralbö- den										T..2g	I'	T..2g	I'

Die Stamm-Feuchtestufe T...2 soll nur noch bei Grundwasserfreiheit (GW-Stufe 7) vergeben werden.

Darst. C 1 – 26a: Zuordnung der Kombination aus Stauwasserform und Bodenform zur Feuchtestufe der Stamm-Standortsformengruppe (Stand 2002)

Früh- jahr- liche Tie- fen- stufe	Stamm-Boden- formenmerkmale (jeweils Staugley)	spätsommerlich-herbstliche Andauerstufe											
		2		3		4		5		6		7	
1	Staugleymoore	O..1	SS	O..2	S _{OÜ}	O..2	S _{OÜ}	O..3ü	N _{OÜ}	O..4ü	F _{OÜ}	O..4ü	F _{OÜ}
	Mineralische Böden			Ü..0	S _Ü	Ü..0	S _Ü	Ü..1	N _Ü	Ü..2	F _Ü	Ü..2	F _Ü
2	Staugleymoore	O..1	SS	O..2	S _{OD}	O..3	N _{OD}	O..3	N _{OD}	O..4w	F _{OW}		
	Mineralische Böden			N..0	S _D	N..1	N _D	N..1w	N _W	N..2w	F _W	N..2w	F _W
3	Staugleymoore					O..3	N _{OD}	O..4	F _{OD}				
	Mineralische Böden					N..1	N _D	N..2	F _D	N..2w	F _W	T..1w	I _W
4	Staugleymoore							O..4	F _{OD}				
	Mineralische Böden							N..2	..F _D	T..1	I _W	T..1w	I _W

Darst. C 1 – 27a: Zuordnung anhydromorpher oder halbhydromorpher Bodenformen zur Feuchtestufe der Stamm- Standortsformengruppe (Stand 2002)

Klima- stufe	Grund- wasser- form	Stamm-Bodenformenmerkmale	reliefbedingt						
			frisch	mittel		trocken			
küsten- feucht	56	Sand-Gleyfilzpodsole	N..2	F _D	T..1	I _D			
		Sand-Filzpodsole	N..2	F _D	T..1	I _D			
		übrige Sand-Bodenformen	T..1	I _D	T..1	I _D			
	frei	57	Sand-Gleyfilzpodsole	N..3	I _D	T..1	I _D		
		67	Sand-Filzpodsole	T..1	I _D	T..1	I _D	T..2	M
			übrige Sand-Bodenformen	T..1	I _D	T..2	M	T..3	T
übrige	56		T..1	I _D	T..1	I _D			
	67	alle betroffenen Mineralböden	T..1	I _D	T..2g	I'	T..3	T	
	frei		T..1	I _D	T..2	M	T..3	T	

1.2.1.4. Zuordnung zur Klimastufe

Für die Klimastufe ist der Großklimabereich bestimmend. Dabei gilt folgende Zuordnung:

alpha	zu f	= (binnen-)feucht
beta	zu m	= mäßig trocken
gamma	zu t	= trocken
delta	zu m	= mäßig trocken
epsilon	zu m	= mäßig trocken
zeta	zu f	= (binnen-)feucht
eta	zu f	= (binnen-)feucht
kappa	zu lm	= mäßig küstenfeucht (I von litoral)
lambda	zu lf	= küstenfeucht (I von litoral)
my	zu f	= (binnen-)feucht
omikron	zu lm	= mäßig küstenfeucht (I von litoral)
pi	zu m	= mäßig trocken
rho	zu f	= (binnen-)feucht
sigma	zu lf	= küstenfeucht
ypsilon	zu f	= (binnen-)feucht
phi	zu m	= mäßig trocken
chi	zu f	= (binnen-)feucht.

Anders geordnet ergibt sich als Zuordnung:

zu	lf	:	lambda und sigma
	lm	:	kappa, omikron
	f	:	alpha, eta, zeta, my, rho, ypsilon und chi
	m	:	beta, delta, epsilon, pi und phi
	t	:	gamma.

1.2.1.5. Zuordnung zu den Großgruppen des Standortmosaiks

Die Großgruppen des Standortmosaiks als Merkmal für die standörtliche Einbindung in die Nachbarschaft werden aus dem Standortmosaik abgeleitet und nach Darst. C 1 - 28 ermittelt. Die Mindestgröße für die Berechnung beträgt dabei 25 ha Waldfläche. Bei Arealen mit kleinerem Waldflächenanteil entfällt die Angabe.

Diese Regelung ist bis auf weiteres gültig. Vorgesehen ist eine stärkere Mosaik-Einbindung der Standortformengruppen. Sie wird eingeführt, sobald die entsprechenden naturräumlichen Grundlagen dazu vorliegen.

Darst. C 1 - 28: Großgruppen des Standortsmosaiks

Mannigfaltigkeit nach dem Anteil (%) der Grenzkontraste (Nährkraft- und Feuchtestufen sind dabei addiert)	Reichtum nach dem Anteil an Nährkraft- (und Feuchte-)stufen		
	reich > 2/3 R + K	mittel dazwischen	arm > 2/3 Z2 + Z3 + A1 + A2 + A3
einförmig (> 95 % bis zu 1 Stufe)	I ' 1	II ' 2	III ' 3
mäßig mannigfaltig	I ' ' 4	II ' ' 5	III ' ' 6
sehr mannigfaltig (> 50 % über 1 Stufe)	I ' ' ' 7	II ' ' ' 8	III ' ' ' 9

x = Signierziffern

1.2.2. Zuordnung zu den Zustands-Standortsformengruppen

Die Zuordnung zu den Zustands-Standortsformengruppen ergibt sich aus der Zustands-Nährkraftstufe und der Zustands-Feuchtestufe. Beide werden aus der Humusform abgeleitet. Die Nährkraftstufe kann eingliedrig oder zweigliedrig, unter Umständen auch mehrgliedrig sein.

1.2.2.1. Zustands-Standortsformengruppen mit eingliedriger Nährkraftstufe

Die eingliedrige Nährkraftstufe bezieht sich auf Humusformen mit Harmonie zwischen Stickstoff- und Säure-Basenstufe, ausgedrückt durch die seit langem gebräuchlichen Bezeichnungen Mull, mullartiger Moder usw. Neu ist die Humusform "Hungerrohhumus" = Hu, gekennzeichnet durch die Zustands-Vegetationsform "Flechten-Formengruppe" (bisher als trockener Magerrohhumus = tMa bezeichnet).

Darst. C 1 - 5 (Seite 16 im Abschnitt 1.1.2.1.) enthält die Humusformen mit ihrer Aufgliederung nach Nährkraftstufe und Feuchtestufe. Die Zustands-Standortsformengruppen werden demnach aus den Humusformen unmittelbar abgeleitet. Eine Sonderstellung nehmen die **Hager-Humusformen** ein. In der Gruppenebene werden sie durch den Zusatz "... und verhagert" und das Kurzzeichen ... v gekennzeichnet.

1.2.2.2. Zustands-Standortsformengruppen mit zwei- und mehrgliedriger Nährkraftstufe

In Immissionsgebieten kommen zur Kennzeichnung der Nährkraftstufe je nach Immissionstyp zur Stickstoffstufe in der Regel eine, in manchen Gebieten auch noch weitere Glieder hinzu.

Darst. C 1 - 6 (Seite 17 im Abschnitt 1.1.2.2.) zeigt eine zweigliedrige Nährkraftstufe, bestehend aus Stickstoffstufe und Säure-Basenstufe. Aus Platzgründen enthält die Darstellung nur Nährkraftstufen und keine Feuchtestufen. In ihrem Gesamtumfang umfaßt sie jedoch wie Darst. C 1 - 5 alle Feuchtestufen, also trocken, mäßig frisch, frisch, feucht und naß. Die Ableitung der Zustands-Standortsformengruppen ist in allen Fällen gleich und sinngemäß vorzunehmen.

Bei den in der Darstellung stark eingekästelten Humusformen bzw. Zustands-Standortsformengruppen befinden sich Stickstoff- und Säure-Basenstufe in harmonischer Beziehung zueinander, alle übrigen sind disharmonische Nährkraftstufen.

Die Angabe von Nährkraftstufen erfolgt - wenn nötig - für Oberboden und Unterboden gesondert (z.B. Rieselfeld, ehemals landwirtschaftlich genutzte Böden u.ä.), getrennt durch einen Bruchstrich, z.B.

Formenebene $\frac{b_7}{b_5}$ oder Gruppenebene $\frac{r}{m}$.

Auch bei Humusformen mit zweigliedriger Nährkraftstufe sind **Hagerformen** möglich, dann im allgemeinen disharmonisch mit verringerter Stickstoffstufe und normaler Säure-Basenstufe.

Da bekannt ist, daß Immissionen den Standortzustand nicht nur hinsichtlich Stickstoff- und Säure-Basenstatus verändern, ist die Kennzeichnung weiterer Elemente notwendig. Vorgesehen ist eine Parallelisierung aller Elemente in einer 10stufigen Skala und einer Abstufung nach absoluten Werten. Die bisher berücksichtigten und in naher Zukunft zu erwartenden Elemente sind:

Schwefelstufe = s
Kaliumstufe = k
Phosphorstufe = p.

Von den angeführten Kurzzeichen werden die eingebürgerten Mu, MM usw. zur Kennzeichnung der Stickstoffstufe beibehalten. Die alten Kurzzeichen für die Säure-Basenstufe wie z.B. s', s^o werden in der Formenebene wegen der Verwechslungsmöglichkeit mit der Schwefelstufe abgelöst durch z.B. b₃, b₄ usw., die Gruppenebene bleibt unverändert.

Unbefriedigend ist zur Zeit noch die Kennzeichnung der Zustands-Nährkraftstufen "ziemlich arm" und "arm" nach dem Säure-Basen-Status. Nach den gegenwärtigen Analysenbefunden ist eine Trennung beider Stufen weder mit der Basensättigung noch mit dem P_H-Wert möglich. Deshalb bleiben beide Stufen so lange zusammengefaßt, bis verfeinerte analytische Methoden eine eindeutige Kennzeichnung und damit Trennung ermöglichen.

Als Übergangslösung ist wie folgt zu verfahren:

- Bei der Klassifizierung der Zustands-Nährkraft ist der Begriff "arm" sowohl in der Formenebene (für Rohhumus) als auch in der Gruppenebene weiterhin gültig.
- Bei der Berechnung des Zustandswandels (z.B. für Naturraumareale) ist nur die Säure-Basenstufe b_4 zu verwenden, damit der Wandel nicht zweistufig erscheint, obwohl er nur einstufig ist.

1.2.2.3. Gleich- oder Nachlauf der Vegetationsentwicklung

Ein weiteres, in den Darstellungen C 1 - 5 und 6 nicht enthaltenes Merkmal ist der Gleich- oder Nachlauf der Vegetationsentwicklung.

Wir sprechen von **Gleichlauf** dann, wenn der Analysenbefund für die Nährkraftstufe im Einklang steht mit der zugehörigen Vegetationsform.

Ein **Nachlauf** der Vegetationsentwicklung liegt dann vor, wenn die Nährkraftstufe nach dem Analysenbefund um ein oder zwei Stufen höher bzw. bei Versauerung niedriger liegt als die Vegetationsform anzeigt. Wegen der unterschiedlichen Entwicklungsrichtung des Nachlaufes wird unterschieden:

- Nachlauf aus reichem Altzustand = ... → ... ⇒
- Nachlauf aus ärmerem Altzustand = ... ← ... ⇐

Die Richtung der Pfeile wurde so gewählt, daß sie der üblichen Abfolge der Nährkraftstufen in Tabellen und Übersichten entspricht:

Nachlauf aus reichem Altzustand

reich	kräftig	mittel	ziemlich arm	arm
-------	---------	--------	--------------	-----

Nachlauf aus ärmerem Altzustand

Die Kennzeichnung ist in der Formen- und Gruppenebene gleich und wird sowohl bei eingliedriger als auch bei zwei- und mehrgliedriger Nährkraftstufe durch hochgestellte Pfeile vorgenommen.

Stets zu beachten ist die unterschiedliche Schreibweise von Humusform und Zustands-Standortsformengruppe hinsichtlich der Reihenfolge von Feuchtestufe, Stickstoffstufe und Säure-Basenstufe:

Humusform

Feuchtestufe	Säure-Basenstufe	Stickstoffstufe
i	b_5	RM

Zustands-Standortsformengruppe

Stickstoffstufe	Säure-Basenstufe	Feuchtestufe
z	m	i

Es folgen nun Beispiele für den Nachlauf aus **ärmerem Altzustand**:

- eingliedrige Nährkraftstufe

Gleichlauf	= ohne Kennzeichnung		
Nachlauf um 1 Stufe	= ... ←	i RM ←	bzw. z i ←
Nachlauf um 2 Stufen	= ... ←	i RM ←	bzw. z i ←

- zweigliedrige Nährkraftstufe

Gleichlauf	= ohne Kennzeichnung		
Nachlauf um 1 Stufe	= ... ←	i b ₅ RM ←	bzw. z m i ←
Nachlauf um 2 Stufen	= ... ←	i b ₅ RM ←	bzw. z m i ←.

Die hochgestellten Pfeile beziehen sich auf die ganze Nährkraftstufe, weil wir noch nicht in der Lage sind, den Nachlauf auf die Stickstoff- und Basen-Sättigungsstufe aufzuschlüsseln. Sollte dies später möglich sein, dann hieße es z.B. bei Nachlauf um 1 Stufe

- bezogen auf Säure-Basenstufe i b₅ ← RM bzw. z ← m i

- bezogen auf Stickstoffstufe i b₅ RM ← bzw. z m ← i.

In bisher seltenen Fällen ist ein Nachlauf in beide Richtungen festgestellt worden. Die Bezeichnung lautet dann:

Nachlauf in beide Richtungen
(hervorgerufen durch gleichzeitige Veränderung der Säure-Basenstufe und Stickstoffstufe) = i b₅ → RM ← = z → m ← i.

Denkbar wären später solche Darstellungen auch für mehrgliedrige Nährkraftstufen.

Die obige Darstellungsweise ist sachlich in Ordnung und bietet die Möglichkeit eines weiteren Ausbaus. Aufgrund der komplizierten Zustands-Verhältnisse ist sie jedoch wenig eingängig und auf den ersten Blick nicht ohne weiteres zu verstehen. Außerdem nehmen die Pfeile einen beachtlichen Platz ein, so daß Schwierigkeiten bei der Kartenherstellung entstehen können. Aus diesen Gründen suchen die Forstplanungsämter der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt nach einfacheren Darstellungsmöglichkeiten, die kartographisch weniger aufwendig sind und in der forstlichen Praxis eine höhere Akzeptanz erwarten lassen.

Literatur

KOPP, D. und G. SCHULZE: SEA 74 - C 3.2 -Gruppenzuordnung der Standortsformen für das Tiefland

KOPP, D.: Naturräumliche Grundlagen ökologiegerechter Landnutzung, in Vorbereitung

KOPP, D. und W. SCHWANECKE: Standörtlich-naturräumliche Grundlagen ökologiegerechter Forstwirtschaft, Berlin, 1994.

1.3. Zuordnungskatalog

Der Zuordnungskatalog ist ein Teil der Standortserkundungs-Anleitung SEA 95-1 - Teil C. 1. „Forstökologische Gruppierung der Standortformen und Standortsmosaik“. In ihm werden die Feinbodenformen nach ihren Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und mit den häufigsten Stamm-Standortsformengruppen verknüpft. Generell fehlen schwer vorstellbare Kombinationen von Stamm-Nährkraftstufe und Stamm-Feuchtestufe. Die in den folgenden Tabellen verwendeten Begriffe, Kurzzeichen und Kurzbezeichnungen der Feinbodenformen sind den Teilen A und C der SEA 95 entnommen und gegebenenfalls hier nachzulesen.

Der Zuordnungskatalog soll ein schnelles Auffinden folgender Kriterien ermöglichen:

- vollständige Bezeichnung der Feinbodenform (Ortsname, Hauptbodenform)
- Normalstufe der Nährkraft und als Hochzahl die Fünftel-Nährkraftstufe
- Stamm-Standortsformengruppe unter Berücksichtigung der wichtigsten Kombinationen (Feinbodenform mit Grund- und Stauwasserform, KMgCaP-Serie, relief- und bodenbedingte Abweichungen vom Großklima und Unterlagerungen).

Die Spalte „Hinweise“ enthält Besonderheiten, auf die bei der Ausscheidung von Standortformen oder Stamm-Standortsformengruppen zu achten ist. Die in dieser Spalte enthaltenen Zeichen bedeuten:

bs **g**, **bg**, **f** oder **bf** : Sandböden der Halbgleygruppe mit diesen Körnungsangaben können auch nach erfolgter Entwässerung für die Kartierung verwendet werden (vgl. SEA Teil A, Abschnitt 1.5.4.5., Seite 84). Hierzu zählen ebenfalls alle Feinbodenformen mit der nicht besonders gekennzeichneten Körnungsart **mfs**.

[bs] Körnungsangabe bei Sandböden der Halbgleygruppe: es fehlt die Trennung von **bs**, **f** und **bf**. Diese Feinbodenformen sind bei Neukartierungen nicht mehr zu verwenden, gegebenenfalls sind neue entsprechend der vorliegenden Körnungsart zu bilden.

f+bf Sammelform für anhydromorphe Staubsandböden, bei ihnen erfolgte keine Trennung in Staubsand und Bänderstaubsand; bei Neukartierungen sind diese Feinbodenformen nicht mehr zu verwenden, gegebenenfalls sind neue zu bilden.

K Im küstenfeuchten Klima tritt eine Veränderung der Zuordnung zur Feuchtestufe ein. Dies betrifft anhydromorphe Sandböden mit dem Horizontfolgetyp

FHP FHRP FRP FUP FSP FÜP.

In der Darst. C 1 - 30 sind Beispiele für die Zuordnung zur Feuchtestufe für einige Hauptbodenformen angeführt.

(K) Für halbhydromorphe Sandböden mit den Horizontfolgetypen Gleyfilz...podsole, Moorgley...podsole und Gleymoor...podsole

sowie für aus Entwässerung hervorgegangene Sandböden (Kombiformen) mit den Horizontfolgetypen **Filz..gley...podsole, Anmoor..podsole, Moorgley..podsole**

tritt oben genannte Veränderung nur in der Kombination mit den Grundwasserformen 56, 57, 67, oder 7 nach Entwässerung ein.

↑ Erhöhung der Nährkraftstufe bei Unterlagerungen usw. beachten (die angeführten Beispiele berücksichtigen nur solche Erhöhungen, die nicht an die KMgCaP-Serie eines bestimmten Mosaikareals gebunden sind).

≈ Die Zuordnung zur Stamm-Feuchtestufe richtet sich nach der Wasserform, die feuchter ist. In diesen Beispielen wird nur die Stauwasserform angegeben (in der Formenebene ist stets die Kombination aus Stau- und Grundwasserform anzugeben).

Bei Sandunterlagerung (../S) Veränderung der Hauptbodenform-Bezeichnung mitamphi... beachten (z.B. RpLU = Rupensdorfer Lehm-Staugley, aber RpLU/S = Rupensdorfer Lehm-Grauamphigley).

Der ausführliche Tabellenkopf wird nur auf der ersten Seite der Tabellen angeführt:

Feinbodenform		Normal-Nährkraftstufe	Hinweise	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe in Abhängigkeit von Grund- und Stauwasserform, Mesoklimaeigenschaften und Unterlagerungen in Beispielen									
Kurzzeichen	Name und Kurzbezeichnung			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Um Platz zu sparen, erhalten die übrigen Seiten nur eine Kurzfassung des Tabellenkopfes. Im Kästchen rechts sind die beiden ersten Buchstaben der Kurzzeichen für die erste und letzte Feinbodenform der jeweiligen Seite angegeben:

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.									
------------	-----------------	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beim Aufsuchen der Stamm-Standortsformengruppen ist zu beachten, daß anstelle von Grund- und Stauwasserformen aus Gründen der Platzersparnis häufig nur Punkte gesetzt worden sind. Die Punkte beziehen sich stets auf die links von ihnen stehenden Grund- oder Stauwasserformen. Bei der Feinbodenform AdL bedeuten z.B.

7	..fr	..tr	.. v
AdL 7	AdL 7 fr	AdL 7 tr	AdL 7 v
Z2	Z1	Z3	A2v

Darst. C 1 - 29: Zuordnung der Standortsformen zur Stamm-Standortsformengruppe

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
				34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr	
Ab dLU	Annaburger l/s UA	K	≈	NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1	K1w	K1w	K2	K1	
Ab SB	Albersdorfer Is SHRP	Z ⁴		45,..fr NZ2	46,55,fr NZ3	47 Z1w	..fr Z1	56,..fr Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..L ..+2	..E ..2	
Ad LB	Abtsdorfer l/et SF	M ³		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1					
Ad s	Arendseer s SP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2	
Ad SB	Altdaberscher s GÜP	Z ³		45,..fr NZ2	46,55,fr NZ3	47 Z1w	..fr Z1	56,..fr Z1	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	
Ad tL	Arnsdorfer s/e F	Z ¹		7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v							
Ae s	Altheider f RRE	M ³	↑	56,..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..tr M3	..v A2v	..L K2	..Lfr K1	..E M2		
Af s	Altfriedländer f RRE	K ⁴	f+bf	56,..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2	
Ag LB	Altgolmer u SF	M ⁵		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1					
Ah LG	Abtshäger I HS	R		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	47 R1w	
Ah s	Ahlbecker s Ra	Z ²		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2	
Ah SB	Adlerhorster s GFSP	M ³	(K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..L ..+2	..E ..+2		
Ah SE	Adlerhorster s FUGSP	M ⁵	bs (K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..L ..+2	..E ..+2		
Ah SG	Altheider s MG	M		23 NMO	24 NM1	25 NM1w	26 NM2w	27 NM2w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	
Ak LU	Akener ol UG	R		1 × 4 ÜR0	1 × 5 ÜR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	
Ak s	Altkalener f B	K ³	f+bf	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2	

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Al S	Altlangseer yof K	M	56	..fr	57,67	..fr	7	..fr						
			M1	M1	M2g	M1	M2	M1						
An SB	Ankershagener s GRRE	Z ²	45, ..fr	46,56,fr	47	..fr	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
			NK2	Z1	Z1w	Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2 ⁺	Z2
Ap S	Ahrenshooper s FSP	Z ⁴	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E	
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z2 ⁺	Z1	Z2	
Ar S	Altruppiner us B	M ⁵	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
			M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M ⁺ 2	M1	M2		
Ar SB	Altdarßer s GFHP	Z ⁵	f (K)	45,..fr	46,55,fr	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E	
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	Z2	
As S	Alt-Schweriner g Ra	M ¹	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
			M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M ⁺ 2	M1	M2		
At S	Alteicher g HRP	A ²	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
			A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A ⁺ 2	A1	A ⁺ 2		
At SB	Ateritzer bs GRP	Z ²	[bs]	45	..fr	46	56	47	57	6	..fr	..L	..E	
				NZ2	NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z2g	Z1	..+2	..2	
Au SB	Aumühler ls SB	M ³	45	..fr	46,56,..f	47	..fr	57,67	7	..fr	..L	..E		
			NM2	NM2	M1	M1w	M1	M2g	M2	M1	..+2	..2		
Au tL	Augustenhofer s/ I FÜ	K ⁴	7	..fr	..tr	..v								
			K2	K1	K3	Z2v								
Av S	Alt Devwinkeler bs SP	M ⁵	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
			M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M ⁺ 2	M1	M2		
Aw S	Arniswalder s Ü	Z ¹	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E	
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	M ⁺ 2	M1	Z2	
Ax tLB	Alexanderdorfer s/ I SF	M ⁺ 1		46	..fr	47	..fr	7	..fr					
				M1	M1	M1w	M1	M ⁺ 2	M1					
Az M	Alt Zachuner im Fe	K	22	23	24									
			OK1	OK2	OK3									
Ba dL	Bannenbrücker kl/s Re	RC	≈	56	..fr	57,67	..fr	7	..fr	..tr				
				RC1	RC1	RC2g	RC1	RC2	RC1	RC3				
Ba L	Badekower I F	K ¹	7	..fr	..tr	..v								
			K2	K1	K3	Z2v								
Ba LU	Baselitzer I US	Z ²		34	35	36	46	..fr	47	..fr	7	..fr		
				NZ1	NZ2	NZ2w	Z1	Z1	Z1w	Z1	Z2	Z1		

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Ba R	Banzkower rg B	K ³	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2	
Ba S	Bockaer f Ra	A ³	f+bf A1	56 A2g	57,67 A1	..fr A2	7 A1	..fr A3	..tr A2v	..v A+2	../L A1	../Lfr A+2	../E
Bä S	Bärenthorener s B	Z ³	↑ Z1	56 Z2g	57,67 Z1	..fr Z2	7 Z1	..fr Z3	..tr A2v	..v M+2	../L M1	../Lfr M1	../E Z2
Ba SB	Baaber s GFUP	A ²	(K) NA2	45, ..fr NA3	46,55 NA3	..fr A1	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
Ba SE	Blankenhagener s UGHRP	M ⁴	(K) [bs]	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Ba SG	Barkower s HG	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	46,55 NM3	47 M1w	..fr M1	56 M1	..fr M1
Ba tTG	Barther s/t HS	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	47 M1w	..fr M1			
Bb dLB	Berendsbrücker kl/s AReRC	≈	1 × 5 ÜR1	1 × 6 ÜR2	45 NR2	46 RC1	47 RC1w	56 RC1	..fr RC1	57 RC2g	..fr RC1	67 RC2g	
Bb R	Blocksberger rs B	K ¹		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Bb S	Blocksberger bs RP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Bb SB	Blocksbrücker s GSP	Z ³	[bs]	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Bb tL	Berkenbrücker s/IF	K ³		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Bc S	Buckower os K bzw. V	K		1 × 6 ÜK2	1 × 7 ÜK2	56 K1	..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1		
Bc SB	Bärenbrucher s GFRa	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Bd LU	Baudaer ol UG	K		1 × 4 ÜK0	1 × 5 ÜK1	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1
Bd S	Bardenitzer g B	M ²	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Bd SB	Bindower us GB	Z		45 NZ2	..fr NZ2	46,56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Bd SG	Bohldammer s MG	K		23 NK0	24 NK1	25 NK1w	26 NK2w	27 NK2w	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	45 NK2
Be KG	Belower kd AG	RC	■	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w
Be S	Bergsdorfer bs B	K ³		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Be SB	Barkheider s GFHRP	M ⁴	f (K)	45, ..fr NM2	46,55 NM3	56, ..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Be tL	Behrensdoerfer s/l RRE	K ⁵		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Be TU	Belower t US	M	■	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1
Bf S	Ballendorfer s HRP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Bf T	Breitefenner t F	R ⁴		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v						
Bg S	Bergrader s B	M ¹	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Bg SU	Brieselanger s UG	K	bs+ bf	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	45 NK2	46,55 NK3	47 K1w	56 K1	57 K2g	67 K2g
Bg tLB	Berger os/l SK	K	■	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1				
Bh dLG	Buchenhainer l/s AA	R	≈	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w
Bh LB	Blankenhäger l SÜP	M ⁺¹	■	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M+2	..fr M1				
Bh RB	Blohmer r GRa	A		45 NA2	..fr NA2	46,56,fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L A+2	../E A+2
Bh S	Buchhainer g RRE	Z ⁵	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Bh SB	Behnkenhäger s GB	K ³	[bs]	45 NR2	..fr NR2	46,56,fr R1	47 R1w	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	../L R2	../E R2
Bh SE	Bahlenhüscherer s HGUP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Bh SU	Bahlenhüscher s FUGM			34 NM1	35 NM2	36 NM2w	45 NM2	46,55 NM3	47 M1w	56 M1	57 M2g	67 M2g		
Bi dLU	Bickinger l/s UA	K	≈	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K2	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1	
Bi LB	Bitterfelder ol SK bzw. SV	R		1 × 5 ÜR1	1 × 6 ÜR2	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1			
Bi RB	Binzer r GSP	A		45, ..fr NA2	46,55 NA3	56, ..fr A1	47 A1w	57, 67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L .. +2	..E .. +2	
Bi s	Biegener s RP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E +2	
Bi SB	Birkholzer s GÜ	Z ⁴		45 NZ2	..fr NZ2	46,56,fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr ZA1	7 Z2	..fr Z1	..L .. +2	..E .. 2	
Bi SE	Billerbacher s UGSP	Z ¹	f	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L .. +2	..E .. 2	
Bk LB	Brakener l SRF	R ³		46 R1	46fr R1	47 R1w	47fr R1	7 R2	7fr R1					
Bk s	Bräunigker g B	M ⁵	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2	
Bk SB	Bramhakener s GFRa	A ¹	(K)	45 NA2	..fr NA2	46,56,..fr A1	47 A1w	57, 67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L .. +2	..E .. +2	
Bl dTG	Blumenthaler t/s MA	K	≈	1 × 4 ÜK0	1 × 5 ÜK1	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w					
Bl R	Blankenförder sr RRE	M ²	↑	56,..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..tr M3	..v A2v	..L K2	..Lfr K1	..E M2		
Bl s	Blieschower bs Ü	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2	
Bl SB	Bliesenrader s GMSP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L .. +2	..E .. 2	
Bl SE	Blumenberger s FHGUP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L .. +2	..E .. 2	
Bm s	Bruchmühler f B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2	

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe													
Bm tL	Blumenower s/l RRE	K ³		7	..fr	..tr	..v										
				K2	K1	K3	Z2v										
Bn dLB	Braunaer ol/s AK bzw. AV	M	≈	45	46	47	56	..fr	57	..fr	67	..fr					
				NM2	M1	M1w	M1	M1	M2g	M1	M2g	M1					
Bn s	Bodener os K bzw. V	M		56	57,67	..fr	7	..fr	..v	..L	..fr						
				M1	M2g	M1	M2	M1	A2v	M+2	M1						
Bn SB	Banzkower s GFHRP	Z ²		45, ..fr	46,55	56, ..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E				
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	.. +2	..2				
Bn SE	Billenhagener s AGHRP	M ⁴	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E				
				NM2	NM3	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	.. +2	..2				
Bn SU	Banzkower s UG	M		34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67				
				NM1	NM2	NM2w	M1w	NM2	NM3	M1w	M1	M2g	M2g				
Bö LB	Börlner l/t SF	M ⁵		46	..fr	47	..fr	7	..fr								
				M1	M1	M1w	M1	M2	M1								
Bo LG	Bockhäger l MS	M		23	24	25	34	35	36	37							
				NM0	NM1	NM1w	NM1	NM2	NM2w	M1w							
Bo s	Bodenseichener s B	M ⁴	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E				
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2				
Bö s	Böhlaer g B	M ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E				
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2				
Bo SB	Borner s MGSP	Z ²	f (K)	45, ..fr	46,55	56, ..fr	47	57, 67	..fr	7	..fr	..L	..E				
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	.. +2	Z2				
Bo SU	Boeker ks UG	RC		34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67				
				NR1	NR2	NR2w	RC1w	NR2	NRC3	RC1w	RC1	RC2g	RC2g				
Bö SB	Bötzower s GPB	M ⁵		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E				
				NM2	NM3	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	.. +2	..2				
Bo SE	Borger s AGRP	Z ²	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E				
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	.. +2	..2				
Bo tL	Bossower s/l RRE	K ³		7	..fr	..tr	..v										
				K2	K1	K3	Z2v										
Br dLU	Bresker ol/s UA	K	≈	1 x 4	1 x 5	34	35	36	37	46	..fr	47	..fr				
				ÜK0	ÜK1	NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1	K1w	K1				
Br L	Bresegarder l/t F	K ¹		7	..fr	..tr	..v										
				K2	K1	K3	Z2v										

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Br LU	Bremerhäger l/t US	R ³	■	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1	
Br S	Brunkauer s HRP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2	
Br SB	Brandener s GMHP	Z ²	f (K)	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L .. +2	../E ..2	
Br SU	Bredower s UG	R	bs+ bf	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2	46,55 NR3	47 R1w	56 R1	57 R2g	67 R2g	
Br tL	Briesenlucher s/l F	M ⁺¹		7 M+2	..fr M1	..tr M3	..v A2v							
Br tLG	Braaker s/l HS	M	■	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	47 M1w					
Bs L	Bastorfer u F	K ²		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v							
Bs R	Brustorfer sr B	M ¹		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2	
Bs S	Braunsberger s RRE	Z ¹	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2	
Bs SB	Bahlenhüscherer s MGUP	Z ²	(K)	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L .. +2	../E .. +2	
Bt S	Brottewitzer s B	M ⁵	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2	
Bt SB	Bartelshagener s GFRP	Z ¹	bs (K)	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L .. +2	../E ..2	
Bu dTG	Buschmühler t/s AA	K	≈	1 ^x 4 ÜK0	1 ^x 5 ÜK1	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	
Bu K	Buddenhäger k BRe	RC		7 RC2	..fr RC1	..tr RC3	..v M2v							
Bu LU	Busdorfer u US	K ¹	■	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1	
Bü R	Bülstringer sr B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2	
Bu RG	Buhlitzer r AG	K		23 NK0	24 NK1	25 NK2	26 NK2w	27 NK2w	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	45 NK2	

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr. Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Bu S	Buchsmühler kf Re	K ³ C	56 KC1	57,67 KC2g	..fr KC1	7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v	../L KC2	../Lfr KC1	
Bü S	Bühlauer s RP	Z ³	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Bu SB	Buchhorster s MGSP	Z ³ (K)	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Bü SB	Brünkendorfer s GFHRP	Z ¹ bs (K)	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Bu tL	Brunshauptener s/ F	K ⁴	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Bu tLÜ	Bussiner s/ US	K	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Bu TU	Burower t US	K	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Bw S	Brodowiner ks Re	K ³ C	56 KC1	57,67 KC2g	..fr KC1	7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v	../L KC2	../Lfr KC1	
Bw SB	Birkenwerder s GUP	M ⁵	45, ..fr NM2	46,55 NM3	56, ..fr M1	47 MZ1w	57, 67 M2g	..fr M1	7 MZ2	..fr MZ1	../L ..+2	../E ..2
By S	Booßener s RRE	A ⁵	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Bz S	Bülziger g B	M ³ ↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Bz SB	Banzkower s GHRP	Z ²	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57, 67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ca L	Camminer l F	R ⁵	7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v						
Ca S	Carpiner bs BP	M ⁵	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M2	../Lfr M1	../E M2
Cb S	Colbitzer g B	K ⁵	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Cd S	Consrader bg B	K ³	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Cf S	Charlottenfelder s Ra	Z ⁴	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe											
Ch S	Charlottenthaler yos K	K		56	..fr	57,67	..fr	7	..fr						
				K1	K1	K2g	K1	K2	K1						
Ci S	Choriner bug B	R ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				R1	R2g	R1	R2	R1	R3	M2v	R2	R1	R2		
Cm S	Cramoner us B	K ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2		
Cn S	Crinitzer f RP	Z ⁵	f+bf	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2		
Co LU	Cordshäger l US	K ³		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr		
				NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1	K1w	K1	K2	K1		
Co S	Coseler us B	Z ²	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2		
Co SB	Commerauer s GSP	A ¹		45, ..fr	46,55	56, ..fr	47	57, 67	..fr	7	..fr	../L	../E		
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	..+2	..+2		
Cp S	Caputher bs B	M ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M2	M1	M2		
Cp t1B	Carpiner s/l SHRP	M ⁵		46	..fr	47	..fr	7	..fr						
				M1	M1	M+1w	M1	M+2	M1						
Cr R	Criewener rs B	K ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2		
Cr S	Crivitzer bg B	K ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2		
Cw R	Crussower krs Re	KC ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				KC1	KC2g	KC1	KC2	KC1	KC3	Z2v	KC2	KC1	KC2		
Cw S	Conower g B	K ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2		
Cz S	Carwitzer g B	K ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2		
Da S	Damerower s SP	Z ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2		
Dä S	Dänschenburger s HP	A ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E		
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2		
Db L	Dabruner ol K bzw. V	R		1 ^x 6	1 ^x 7	56	..fr	57, 67	..fr	7	..fr				
				ÜR2	ÜR2	R1	R1	R2g	R1	R2	R1				

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Db S	Dannenberger f B	Z ³	f+bf	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2	
Db SB	Dobbrikower bs GRa	M ⁴	[bs]	45, ..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2	
Db SE	Drosselberger s FHGSP	Z ³	(K)	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Dd S	Dahmsdorfer os K bzw. V	K		1 ^x 6 ÜK2	1 ^x 7 ÜK2	56 K1	..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..v Z2v	../L K2	
Dd SB	Dadower s GHRP	Z ²	[bs]	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Dd SU	Deyelsdorfer s UG	K	bs +bf	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	45 NK2	46,55 NK3	47 K1w	56 K1	57 K2g	67 K2g	
De RG	Dubnitzer r MG	A		24 NA1	25 NA1w	26 NA2w	34 NA1	35 NA2	36 NA2w	45 NA2				
Df S	Dorfstädter usB	M ⁴	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2	
Df tTB	Drehfahler s/t SRP	Z ⁺²		46 NZ3	..fr NZ3	47 Z1w	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1					
Dg L	Darguner l F	R ⁴		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v							
Dg SB	Dergenthiner s GHP	M ⁵		45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2	
Dh S	Drögeheider f HRP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2	
Dh SE	Dierhagener s AGUP	Z ²	(K)	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56, ..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Di S	Dippmannsdorfer s HRP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2	
Di SG	Dittmannsdorfer s AG	M		23 NM0	24 NM1	25 NM1w	26 NM2w	27 M1w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	
Di SU	Dietrichsdorfer s UG	Z	g	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2	46,55 NZ3	47 Z1w	56 Z1	57 Z2g	67 Z2g		
Di T	Diedrichshäger t F	R ⁵		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v							

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Dk S	Doberlug-Kirchhainer s BP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Dl S	Doller f B	Z ¹	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Dl SB	Döllner ks GRe	MC		45 NM2	46 MC1	47 MC1w	56 MC1	..fr MC1	57,67 MC2g	..fr MC1	7 MC2	..fr MC1	../L MC2
Dl SG	Dusterlaker s HG	R		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2	46,55 NR3	47 R1w	..fr R1	56 R1	..fr R1
dILM.A	Decklehm-Gleymoor, arm	A	≈	12 OA1	13 OA2	14 OA2	23 OA2	24 OA3	25 OA4	26 OA4w	34 OA3	35 OA4	45 OA4
dILM.AC	Decklehm-Gleymoor, arm, karbonatisch	AC	≈	12 OA1	13 OAC2	14 OAC2	23 OAC2	24 OAC3	25 OA4	26 OA4w	34 OAC3	35 OA4	45 OA4
dILM.K	Decklehm-Gleymoor, kräftig	K	≈	12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OK3	25 OK4	26 OK4w	34 OK3	35 OK4	45 OK4
dILM.KC	Decklehm-Gleymoor, kräftig, karbonatisch	KC		12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OK3	25 OK4	26 OK4w	34 OK3	35 OK4	45 OK4
dILM.M	Decklehm-Gleymoor, mäßig nährstoffh.	M	≈	12 OM1	13 OM2	14 OM2	23 OM2	24 OM3	25 OM4	26 OM4w	34 OM3	35 OM4	45 OM4
dILM.MC	Decklehm-Gleymoor, mäßig nährstoffh. carb.	MC	≈	12 OM1	13 OMC2	14 OMC2	23 OMC2	24 OMC3	25 OM4	26 OM4w	34 OMC3	35 OM4	45 OM4
dILM.R	Decklehm-Gleymoor, reich	R	≈	12 OK1	13 OK2	14 OR2	23 OK2	24 OR3	25 OR4	26 OR4w	34 OR3	35 OR4	45 OR4
dILM.RC	Decklehm-Gleymoor, reich, karbonatisch	RC		12 OK1	13 OK2	14 OR2	23 OK2	24 OR3	25 OR4	26 OR4w	34 OR3	35 OR4	45 OR4
dILM.Z	Decklehm-Gleymoor, ziemlich arm	Z	≈	12 OM1	13 OZ2	14 OZ2	23 OZ2	24 OZ3	25 OZ4	26 OZ4w	34 OZ3	35 OZ4	45 OZ4
dILM.ZC	Decklehm-Gleymoor, ziemlich arm, karbonat.	ZC	≈	12 OM1	13 OZC2	14 OZC2	23 OZC2	24 OZC3	25 OZ4	26 OZ4w	34 OZC3	35 OZ4	45 OZ4
dMKM.K	Deckmoddkalk- Gleymoor, kräftig	KC	≈	12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OK3	25 OK4	26 OK4w	34 OK3	35 OK4	45 OK4
Dm S	Dahmener yos K	R		56 R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	..v M2v	../L R2			
Dn SB	Doberaner s GÜ	Z ¹	↑	45, ..fr NZ2	46,56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Dö dLU	Döberner ol/s UA	R	≈	1 ^x 4 ÜR0	1 ^x 5 ÜR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1
Do M	Dobbiner ih Fe	R		12 OK1	13 OK2	14 OR2	23 OK2	24 OR3	25 OR4	26 OR4w	34 OR3	35 OR4	45 OR4
Do S	Dobritzer bs B	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2
Dö S	Döllinger bg RP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Dö SB	Döringsbrücker s GP	Z		45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Do SE	Doggerscher s HGHRP	Z ¹	(K)	45, ..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Dö tLB	Döbraer s/l SRP	Z ⁴		46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1				
Dr S	Dobraer g HÜP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2
Dr SB	Drieberger s GB	M ²		45,..fr NM2	46,56,..fr M1	47 M1w	..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..L ..+2	..E ..2
Ds tLU	Dessauer s/l US	M ¹		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1
Dß S	Darßer s FSP	A ¹	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2
Dt LU	Dersentiner kl UG	RC		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	..fr RC1	47 RC1w	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1
Dt S	Diemitzer bf Ra	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2
Du dKU	Dunkelforther k/s UA	RC	≈	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	..fr RC1	47 RC1w	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1
Dü S	Düpenkolker f HRP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Du SB	Duckower kos GK	RC ³		45, ..fr NR2	46,55 RC1	56,..fr RC1	47 RC1w	57,67 RC2g	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1	..L ..RC2	..E RC2
Dü SE	Dütschower s UGUP	Z ⁵		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Dü SG	Dürrenhofer s HG	A		34 NA1	35 NA2	36 NA2w	45 NA2	46,55 NA3	47 A1w	..fr A1	56 A1	..fr A1	
Dv S	Devwinkler f RRE	M ¹	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Dw S	Drosedower bf RRE	M ³		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Dw SB	Dennewitzer s GB	M ³		45,..fr NM2	46,56,..fr M1	47 M1w	..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Dz SB	Döberitzer s GRP	Z ⁴		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ea SB	Ellerauer s GPB	M ²		45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Eb S	Eiserbuder s RP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Eb SB	Ellerbecker s MGSP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ed TU	Eduardspringer t US	R		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1
Ee tLB	Elsenecker s/l SRP	Z+ ¹		46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1				
Eh S	Eichhofer s HP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Eh SU	Eichhofer s UG	M	f	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	46,55 NM3	47 M1w	56 M1	57 M2g	67 M2g
Eh tLB	Ellhorner s/l SF	K ²		46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1				
Eh tLU	Elmenhorster s/l US	K ¹		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Ei dL	Eilsberger l/s F	K ³	≈	56 K1	..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3			
Ei dTG	Eicher qt/s AA	K	≈	1 x 4 ÜK0	1 x 5 ÜK1	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w				
Ei R	Eichhester sr B	R ⁴		56 R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v	../L R2	../Lfr R1	../E R2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Ei S	Eichhofer f RRE	M ²	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ei SE	Eichhorster s FAGHP	Z ⁵	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ei SB	Eichkoppler s GMHP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ek S	Eickelberger s RRE	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
El S	Eldenaer bf RRE	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
El SB	Eldenaer s GHRP	Z ⁴	g	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
El SU	Elder s UG	R		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2	46,55 NR3	47 R1w	56 R1	57 R2g	67 R2g
Em S	Ehmkenhagener s UP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
EO S	Eichhofer f FUP	Z ⁵	K	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Ep SB	Esper-Orter s MGSP	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
Es S	Eschorster bus B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Et S	Etinger f RRE	M ³	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ev tL	Everstorfer s/l F	K ²		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Ew tLB	Eichwalder s/l SSP	Z ⁴		45,..fr NZ2	46,55 Z1	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1		
Ex SG	Exiner s AG	R		23 NR0	24 NR1	25 NR1w	26 NR2w	27 NR2w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2
Ez R	Eichholzer rg BP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Ez S	Eichholzer g BP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Fa dLB	Falkenstruther l/s ASF	M ¹	≈	45 NM2	46 M1	47 M1w	56 M1	..fr M1	57 M2g	..fr M1	67 M2g	..fr M1	
Fä S	Fährkruger os K bzw. V	R		1 ^x 6 ÜR2	1 ^x 7 ÜR2	56 R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	..v M2v	..L R2	
Fa SB	Fastbültenhakener s MGHRP	Z ⁵	f (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E .. 2
Fb S	Fiebigershofer s B	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Fc S	Felchower ls B	K ²		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Fd S	Federower us B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Fd SB	Friedersdorfer s GRa	A ¹		45,..fr NA2	46,56 A1	..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L ..+2	..E ..+2
Fd tL	Freudenberger s/l Ra	M ⁺¹		7 M+2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
Fe tL	Tieflehm s/l SP	K ⁴		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Fe S	Fercher f B	K ⁵	f+bf	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Ff S	Friedrichshofer s FHRP	Z ³	K	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Fg S	Falkenberger f HRP	A ¹	f+bf	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2
Fh dTU	Frauenhorster t/s UA	K	≈	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Fh S	Frehner us ÜP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Fh SB	Fuchsneider s MGRa	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,56 A1	..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L ..+2	..E ..+2
Fh SG	Falkenhäger s HG	R		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2	46,55 NR3	47 R1w	..fr R1	56 R1	..fr R1
Fi S	Fischbacher bg B	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Fi SB	Friedrichsmoorer s GFRP	Z ²	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	.. +2	..2
Fi SE	Friedrichsmoorer s AGRP	Z ²	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	.. +2	..2
Fk SU	Finkenkruger s UG	K		34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67
				NK1	NK2	NK2w	K1w	NK2	NK3	K1w	K1	K2g	K2g
F1 S	Flottsteller f Ra	K ⁴	f+bf	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
F1 SG	Flatenhorster s FHG	Z		34	35	36	45	46,55	..fr	47	..fr	56	..fr
				NZ1	NZ2	NZ2w	NM2	NZ3	NZ2	Z1w	Z1	Z1	Z1
Fm S	Fleetmarker bs RP	A ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Fn S	Farnitzer s ÜP	M ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Fo S	Folberner s RP	Z ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Fo SB	Fuchsorter s MGRa	Z ³	(K)	45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E
				NZ2	Z1	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	.. +2	..2
Fr dLU	Friesacker l/s UA	M	≈	34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7 ..	fr
				NM1	NM2	NM2w	M1w	M1	M1	M1w	M1	M2	M1
Fr S	Freilebener bf B	K ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Fs dLG	Falkenseer l/s HA	R	≈	13	14	15	16	34	35	36	37	46	47
				ÜR0	ÜR0	ÜR1	ÜR2	NR1	NR2	NR2w	R1w	R1	R1w
Ft S	Finowtaler s B	M ⁵	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Fu S	Fuchsberger f FHRP	Z ⁵	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Fü S	Fürstenseer s BP	Z ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Fu SE	Funkamter s HGSP	A ¹	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	A+2	A+2
Fu tLB	Fuhlendorfer s/l SHÜP	M+ ⁴		46	..fr	47	..fr	7	..fr				

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				M1	M1	M1w	M1	M+2	M1				
Fw S	Freienwalder g RP	A ⁵		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Fz SB	Freienholzer s GÜP	M ⁺³	bf	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Ga S	Garftitzer s ÜP	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Gä S	Gädebehner bg B	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Ga SB	Garlitzer s GFHP	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
Gä SB	Goldenstädter s GSP	Z ¹		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ga SE	Garwitzer s FUGHRP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ga SG	Garlitzer s MG	M		23 NM0	24 NM1	25 NM1w	26 NM2w	27 NM2w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2
Gb S	Griebener g RRE	Z ³	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Gd dLG	Germendorfer kl/s HA	RC	≈	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	47 RC1w
Gd S	Gersdorfer bf FÜP	M ⁺³	K	56 M1	57,67 M+2g	..fr M1	7 M+2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M+2
Gd SB	Gottschdorfer s GB	M ²	bg	45,..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Ge S	Glaver s UP	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Ge SB	Goldenstädter s GMHRP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
GF S	Grünhofer s B	A ¹	↑	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E A+2
Gg S	Großwiger s B	Z ¹	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Gg SB	Gegenseer s MGSP	Z ¹		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Gh LG	Grubenhagener I MS	R		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w
Gh S	Gresenhorster bs HRP	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Gh SB	Grünhufener s MGHRP	Z ²	f(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Gh SU	Grünhofer s UG	Z	f	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2	46,55 NZ3	47 Z1w	56 Z1	57 Z2g	67 Z2g	..fr Z1
Gh SE	Glashorster s AGSP	Z ¹	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Gi S	Granziner s FHRP	A ⁵	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Gk S	Görzker s RRE	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
G1 LB	Glashäger kol SK bzw. SV	RC		1 × 5 ÜR1	1 × 6 ÜR2	46 RC1	..fr RC1	47 RC1w	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1		
G1 R	Glauschnitzer sr RP	A ³		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
G1 S	Glaubitzer bg B	M ³		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
G1 SB	Gellmer s GSP	A ¹		45, ..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
G1 SE	Gladrower s UGHRP	M ³	(K) [bs]	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
G1 SU	Glashäger os UG	R		1 × 4 ÜR0	1 × 5 ÜR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2	46,55 NR3	47 R1w	56 R1
Gm S	Grubenmühler s B	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Gm SB	Golmengliner Is SF	K ⁵		45 NK2	..fr NK2	46,56,..f r K1	47 K1w	..fr K1	57,67 K2g	7 K2	..fr K1	../L K2	../E K2
Gm SU	Gellmersdorfer os UG	R		1 × 4 ÜR0	1 × 5 ÜR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2	46 NR3	47 R1w	56 R1

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Gn S	Gniester g B	Z ¹	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Gn SB	Galliner s MGHP	A ²	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
Gn TG	Gnevkwower t MS	R		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w
Gö dLG	Görnewitzer l/s HA	M	≈	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	47 M1w	..fr M1			
Go L	Godemser u F	K ²		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Go R	Goderner rbg B	R ⁵		56 R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v	../L R2	../Lfr R1	../E R2
Go S	Goosfelder bs HRP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Gö S	Göhrener f Ra	K ⁴	f+bf	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Go SB	Goldenbaumer s MGHP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Gö SB	Götschendorfer s GB	K ⁵	g	45,..fr NK2	46,56 K1	..fr K1	47 K1w	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	../L K2	../E K2
Go SE	Goldenstädter s HGRP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Gö SE	Göthener s FUGRP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Go SU	Goltewitzer s UG	Z		34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2	46,55 NZ3	47 Z1w	56 Z1	57 Z2g	67 Z2g	
Go TG	Gordener t AS	Z		24 NZ1	25 NZ2	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w					
Go tTB	Golchener s/t SF	M ⁵		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1				
Gö tTU	Göllnitzer s/t US	M ⁵		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1
Gp dTG	Graupaer t/s HA	K	≈	13 ÜK0	14 ÜK0	15 ÜK1	16 ÜK2	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	47 K1w

Kurzz.	LB	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
					1 x 5 ÜR1	1 x 6 ÜR2	46 RC1	..fr RC1	47 RC1w	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1		
Gp	S	Großplastener kl SRe	RC		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Gq	S	Großkmehlener	A 2		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Gr	dLU	Gräfendorfer l/s UA	K ³	≈	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Gr	L	Gramnitzer kl Re	KC		7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v						
Gr	S	Grüneberger s B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Gr	SB	Gränzer os GK bzw. GV M			45 NM2	46 M1	47 M1w	56 M1	..fr M1	57 M2g	..fr M1	67 M2g		
Gr	T	Griebower t F	K ¹		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Gr	tLB	Grünaer s/l SRA	M ⁺⁴		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M+2	..fr M1				
Gr	tLU	Grabower s/l US	M ⁺³		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M+2	..fr M1
Gs	S	Grenzhauser s RP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Gs	SB	Gelbensander s GFHRP	Z ²	(K) [bs]	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Gs	SU	Großschauener ks UG	RC		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	45 NR2	46,55 NRC3	47 RC1w	56 RC1	57 RC2g	67 RC2g
Gs	tTU	Grumsiner s/t US	R ⁵		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1
Gß	S	Großsterner f FFHRP	Z ⁵	K	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Gt	R	Großthiemiger sr RRE	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Gt	S	Gostorfer s Ü	M ⁴	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Gt SB	Gritteler s GHRP	A ²		45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L .. +2	..E .. +2
Gt SU	Geltower s UG	R	g	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2	46,55 NR3	47 R1w	56 R1	57 R2g	67 R2g
Gu LB	Guttauer ol SK bzw. SV	K		1 x 5 ÜK1	1 x 6 ÜK2	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1		
Gu S	Gumtower bf B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Gü S	Grüssower bf Ra	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Gu SB	Guschlucher s GFHRP	A ²	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L .. +2	..E .. +2
Gü SB	Güstrower s GRP	Z ¹	g	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L .. +2	..E ..2
Gu SG	Gudower s AG	M		23 NM0	24 NM1	25 NM1w	26 NM2w	27 NM2w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2
Gv dKG	Gievitzer ik/s AA	RC	≈	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w
Gv S	Grevesmühlener bf B	K ³		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Gv SB	Grevener s MGHP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L .. +2	..E ..2
Gw S	Gerswalder bs B	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2
Gw SE	Gogelwieser s AGUP	A ²	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L .A+2	..E .. A+2
Gw tLU	Grünwalder s/e US	Z ³		34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	
Gw tI	Grünwalder s/t PF	Z ³		7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v						
Gz S	Granitzer f Ü	K ⁵	f+bf	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Gz SB	Görziger os GK bzw. GVK			1 x 5 ÜK1	1 x 6 ÜK2	45 NK2	46 K1	47 K1w	56 K1	..fr K1	57 K2g	..fr K1	67 K2g

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Gz tLG	Gebelziger s/l HS	Z		34	35	36	46	47	..fr				
				NZ1	NZ2	NZ2w	Z1	Z1w	Z1				
Ha dLG	Hartmannsdorfer dl/s HAR		≈	24	25	33	34	35	36	37			
				NR1	NR1w	NR1	NR1	NR2	NR2w	R1w			
Ha dLU	Hanumer l/s UA	M	≈	34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NM1	NM2	NM2w	M1w	M1	M1	M1w	M1	M2	M1
Ha s	Hagelberger s B	M ²	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2
Hä s	Hasenhäger g B	M ¹	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2
Ha SB	Hauer s GUP	Z ²		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Ha SE	Hagenower s HGHRP	Z ⁴		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Ha tL	Hagener s/l FaÜP	M ⁺²		7	..fr	..tr	..v						
				M+2	M1	M3	A2v						
Hb L	Heinrichsberger l RF	R ⁵		7	..fr	..tr	..v						
				R2	R1	R3	M2v						
Hb S	Hülsebecker of K	M		56	..fr	57,67	..fr	7	..fr	..tr			
				M1	M1	M2g	M1	M2	M1	M3			
Hb SB	Hirschburger s GUP	Z ²	f	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Hb SU	Hossbrinker s UG	M	f	34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67
				NM1	NM2	NM2w	M1w	NM2	NM3	M1w	M1	M2g	M2g
Hb TB	Hohenbüssower t SF	M ³		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				M1	M1	M1w	M1	M2	M1				
Hc R	Hohenleipischer rs RP	A ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Hc S	Hohenleipischer s RP	A ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Hc tLB	Hohenleipischer s/l SRP	Z ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v			
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v			
Hd R	Höltingsdorfer rl F	K ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Hd S	Haidaer g Ra	Z ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Hd SB	Henningsdorfer s GB	M ²		45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NM2	M1	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2
He S	Helmer s HRP	A ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
He SB	Hermsdorfer os GK bzw. GV	K		1×5	1×6	45	46	47	56	..fr	57	..fr	67
				ÜK1	ÜK2	NK2	K1	K1w	K1	K1	K2g	K1	K2g
He tLB	Helmshagener s/ SFSP	Z ⁺¹		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				Z1	Z1	Z1w	Z1	Z+2	Z1				
Hf S	Heringsdorfer s FSP	Z ²	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Hf TB	Hohenfelder t SF	R ⁴		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				R1	R1	R1w	R1	R2	R1				
Hf tL	Herzfelder s/ F	K ⁴		7	..fr	..tr	..v						
				K2	K1	K3	Z2v						
Hg S	Hagendorfer f B	M ¹	f+bf	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Hg SB	Högder s MGHP	Z ²	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Hg SE	Hägerholzer Sand- Graugleyhumuspodsol	Z		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Hh dLG	Henriettenhofer dl/s HA	M	≈	24	25	33	34	35	36	37			
				NM1	NM1w	NM1	NM1	NM2	NM2w	M1w			
Hh S	Hilkenhöhler f RP	Z ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Hh SG	Hinrichshäger s MG	Z		24	25	26	34	35	36	45			
				NZ1	NZ1w	NZ2w	NZ1	NZ2	NZ2w	NZ2			
Hi R	Hirschfelder rs BP	Z ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Hi S	Hirschburger s FRP	Z ⁴	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Hi SB	Hillmersdorfer s GFHP	Z ³	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	.. +2	..2
Hk S	Heckenhauser s BP	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Hk tLB	Holzkruger s/l SHRP	Z ⁺³		46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1				
Hl S	Hammelspringer bs RP	Z ²		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Hm S	Hermersdorfer s RRE	M ⁵	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Hm SE	Hammer s AGHRP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L .. +2	../E ..2
Hm tL	Hamfelder s/l PF	M ⁺¹		7 M+2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
Hn S	Hahnenhorster g SP	M ⁵		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Hn SB	Hinterseer s GHP	A ¹		45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L .. +2	../E .. +2
Ho dLG	Horster q/s AA	K	≈	23 NK0	24 NK1	25 NK1w	33 NK1	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w		
Ho dTG	Hohennauener t/s HA	R	≈	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	47 R1w
Ho L	Hohenmockersche l/t F	R ⁴		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v						
Hö S	Hohengöhrener bf RRE	M ³		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ho S	Hohenleipischer g Ra	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Ho SB	Hohenbrucher s GP	Z		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L .. +2	../E ..2
Ho SE	Hohewischer s UGUP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L .. +2	../E ..2
Ho tTU	Hohenleipischer s/t US	M ⁴		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Ho TU	Hottendorfer t US	K ⁵		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1	
Hp LG	Hoppenrader kl HG	RC		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	47 RC1w	
Hp S	Harnekooper bs B	K ³		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2	
Hr S	Heidenseer s FHP	A ²	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2	
Hr SB	Heinersdorfer s GB	M ⁵		45,..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..L ..+2	..E ..2	
Hs dL	Haselhorster l/s F	M ²	≈	56 M1	..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3				
Hs S	Haselberger s RP	Z ²		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2	
Hs SB	Heiligenseer s MGHRP	Z ²	(K) [bs]	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Ht S	Holthusener bs B	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2	
Ht SB	Hüttermühler s GB	M ⁵		45,..fr NK2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..L M+2	..E M2	
Hu L	Hundisburger ku Re	KC		7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v							
Hü LG	Hülseburger kl MG	RC		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	
Hu LU	Hundehäger u US	K ²		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1	
Hü R	Hütterkoppeler rbg B	R ⁴		56 R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v	..L R2	..Lfr R1	..E R2	
Hü S	Hütter bf ÜP	Z ⁺³		56 Z1	57,67 Z+2g	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z+2	
Hu SE	Haubacher s HGRP	M ⁵	(K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..L ..+2	..E ..2	
Hü T	Hüttener t F	K ¹		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v							

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Hw tL	Hohenwulscher s/I F	M ⁺²		7	..fr	..tr	..v							
				M ⁺²	M1	M3	A2v							
Hz dLG	Herzfelder l/s MA	Z	≈	23	24	25	34	35	36	37				
				NZ0	NZ1	NZ1w	NZ1	NZ2	NZ2w	Z1w				
Hz S	Herzberger kg Re	M ⁵ C		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr		
				MC1	MC2g	MC1	MC2	MC1	MC3	A2v	M ⁺ C2	MC1		
Ib SB	Ibenhorster s GFUP	Z ⁴	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E	
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2	
Ih SB	Ihlower s GRP	Z ³	[bs]	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E	
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2	
Ik dL	Ivenacker l/s F	R ⁵	≈	56	..fr	57,67	..fr	7	..fr	..tr				
				R1	R1	R2g	R1	R2	R1	R3				
Is S	Iseborner s HRP	Z ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E	
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z ⁺ 2	Z1	Z2	
Iv S	Ivendorfer bf ÜP	M ⁺⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E	
				M1	M ⁺ 2g	M1	M ⁺ 2	M1	M3	A2v	M ⁺ 2	M1	M ⁺ 2	
Ja L	Jarnitzer l FÜ	K ²		7	..fr	..tr	..v							
				K2	K1	K3	Z2v							
Ja S	Jabeler s B	M ³	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E	
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M ⁺ 2	M1	M2	
Jä S	Jänkendorfer bg B	Z ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E	
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z ⁺ 2	Z1	Z2	
Ja SB	Jasnitzer s GFSP	Z ³	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E	
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	Z2	
Jä SB	Jägerbültener s MGHP	Z ⁵	f (K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E	
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	+2	2	
Ja SE	Jatznicker s UGRP	Z ¹	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E	
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2	
Jä SE	Jädkemühler s HGHRP	Z ³	(K)	45,..fr	45,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E	
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2	
Jb S	Jägerbrücker f HRP	Z ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E	
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z ⁺ 2	Z1	Z2	
Jg SB	Jagdschlosser s GSP	M ⁵	bs	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E	
				NM2	NM3	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2	

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Jg SE	Jagdschlosser s HGSP	M ⁵	bs	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..L ..+2	..E ..2	
Jh SB	Jagdhausener s GMHRP	Z ²	f (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ2	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Jh tL	Johannisberger s/I F	K ¹		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v							
Jk S	Jatzkeer bs RRE	M ³		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L K2	..Lfr K1	..E M2	
Jl S	Jellener us B	M ²	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L K2	..Lfr K1	..E M2	
Jl SE	Jameler s MGSP	Z ¹	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Jm S	Joachimsthaler f BP	M ⁵		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2	
Jm SB	Jameler s GFUP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Jn S	Jävenitzer f SP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2	
Jo S	Johannismühler bg Ra	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2	
Jo SB	Josaarer s GFUP	Z ²	f (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Js SE	Jagenstadter s UGSP	Z ¹	bf	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z+2g	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..+2	
Jü L	Jürgenshagener yol K	R		56 R1	..fr R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v			
Jü S	Jülchendorfer g B	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2	
Ju SE	Jagdkruger s FUGHRP	M ⁴	(K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..L ..+2	..E ..2	
Jw S	Jennewitzer bf ÜP	M ⁺³		56 M1	57,67 M+2g	..fr M1	7 M+2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M+2	
Jz S	Jasnitzer us RP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2	

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Ka dLB	Kalberwischer ol/s AK bzw. AV	R	≈	1 × 5 ÜR1	1 × 6 ÜR2	45 NR2	46 R1	47 R1w	56 R1	..fr R1	57 R2g	..fr R1	67 R2g
Ka s	Kalkseer bs B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Ka SB	Kathendorfer s GFRP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Ka SE	Kramswiesener s HGUP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..L ..+2	..E ..2	
Kb R	Kiesenberger Kalksandskelett- Rend- zina	KC ⁵		56 KC1	57,67 KC2g	..fr KC1	7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v	..L KC2	..Lfr KC1	
Kb s	Kahlenberger g B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Kb SB	Kiepenbrucher s MGUP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Kb tLB	Kronsberger s/l SÜP	M ⁺ 4		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M+2	..fr M1				
Kc s	Kirchhoffer s FBP	Z ³	K	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Kc SB	Kaschower s GHP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Kd LB	Kerzendorfer l/t SF	K ²		46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1				
Kd s	Kersdorfer s Ra	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2
Ke s	Kemlitzer bg B	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Ke SE	Kreiner s AGSP	M ⁴		45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..L ..+2	..E ..2
Kf LG	Krusenfelder l MS	R		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w
Kf s	Krebsfördener g B	M ²	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L K2	..Lfr K1	..E M2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Kg S	Karlsburger f B	K ⁴	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2	
Kg SB	Krugauer s GP	A	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2	
Kh R	Kalkhorster rl/s F	R ⁵	7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v							
Kh S	Kienheider s RP	Z ²	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2	
Kh SB	Koldenhofer s MGHP	Z ⁴ (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Kh SE	Kriegholzer s AGSP	M ⁴	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2	
Ki LU	Kiesower u US	Z	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1		
Ki RB	Kiekuter r GUP	A	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..2	
Ki S	Kamminker bf ÜP	Z ⁺¹	56 Z1	57,67 Z+2g	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z+2	
Ki SB	Kirrer s GMHP	Z ⁵ f(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Ki SE	Kirch Rosiner s AGSP	Z ¹ (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Kk dLU	Kakernebler l/s UA	K ≈	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K2	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1	
Kk S	Kerkower bs RRE	M ⁵	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2	
Kk SB	Kiecker s GFHP	A ² (K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2	
Kl dK	Klosterwalder ik/s Re	RC ≈	56 RC1	..fr RC1	57,67 RC2g	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1	..tr RC3				
Kl K	Klinker k Re	RC	7 RC2	..fr RC1	..tr RC3	..v M2v							

Kurzeich.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
				13	14	15	23	24	25	34	35	36	37	
Kl KG	Klädener kd MG	RC		ÜR0	ÜR0	ÜR1	NR0	NR1	NR1w	NR1	NR2	NR2w	RC1w	
Kl S	Klödener s Ra	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2	
Kl SB	Koppelstromer s GFHRPZ ⁵	f (K)		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..+2	
Kl tLB	Klockower s/e SF	M ⁴		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1					
Km dLG	Kannomühler ql/s AA	R	≈	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	33 NR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w			
Km S	Kremminer bs SP	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2	
Km SE	Kremmener s HGSP	M ³		45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2	
Kn S	Kölpiner g B	M ¹	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2	
Kn SE	Knebelsdorfer s FUGSP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Kn SG	Knuster s FHG	M	bs	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	47 M1w	..fr M1				
Kn tLG	Kriener s/l HS	R		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	47 R1w	
Kö LG	Körbaer l HS	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	47 M1w	..fr M1				
Ko S	Korgauer g B	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2	
Kö S	Königsmarker bs Ra	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2	
Ko SB	Kollmer s GB	M ⁵	[bs]	45,..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2	
Ko SU	Kossenblätter os UG	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	46,55 NM3	47 M1w	56 M1	57 M2g	67 M2g	
Kö SU	Köplitzer s UG	Z	bs +bf	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2	46,55 NZ3	47 Z1w	56 Z1	57 Z2g	67 Z2g		

Kurzeich.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
Kp S	Kölpinseer s SP	Z ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Kp SB	Kropstädter s GRa	M ⁴	[bs]	45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NM2	M1	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2
Kr dLG	Krahner l/s MA	K	≈	13	14	15	23	24	25	34	35	36	37
				ÜK0	ÜK0	ÜK1	NK0	NK1	NK1w	NK1	NK2	NK2w	K1w
Kr S	Kellersche bs RRE	M ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Kr SB	Kleinsterner s GFHP	Z ²	f(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Kr SE	Kronskamper s HGHRP	A ²		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	..+2	..2+
Kr SG	Kreuzbrucher s HG	M		34	35	36	37	45	46,55	47	..fr	56	..fr
				NM1	NM2	NM2w	M1w	NM2	NM3	M1w	M1	M1	M1
Ks S	Kurtschläger us B	M ³	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Ks SB	Kossiner s GB	K ⁵	[bs]	45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NK2	K1	K1	K1w	K2g	K1	K2	K1	K2	K2
Ks SE	Kastellanger s AGHP	Z ⁴	(K)	45,..fr	46,55	56	..fr	47	57,67	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1	Z1w	Z2g	Z2	Z1	..+2	..2
Kt SE	Katerberger s HGUP	A ²		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	..+2	..2+
Kt SU	Katthorser s UG	M		35	36	37	45	46,55	47	..fr	56	..fr	
				NM2	NM2w	M1w	NM2	NM3	M1w	M1	M1	M1	
Kü dLB	Kührener ol/s AK o. AV	R	≈	1x5	1x6	45	46	47	56	..fr	57	..fr	67
				ÜR0	ÜR1	NR2	R1	R1w	R1	R1	R2g	R1	R2g
Kü L	Kühlungsborner l F	K ²		7	..fr	..tr	..v						
				K2	K1	K3	Z2v						
Ku S	Kunersdorfer bs B	Z ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Kü S	Krüseliner bs RRE	M ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Kü SB	Knüppeldammer s GHRP	Z ¹		45, ..fr	46,55	56, ..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Ku SE	Kuhstorfer s AGSP	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
Ku tLB	Kummer s/l SRP	Z ⁺¹		46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1				
Kv S	Klein Vielener sRRE	M ⁵		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M ⁺²	../Lfr M1	../E M2
Kw S	Korswandter s FSP	A ¹	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Kw SB	Karbower s GRRE	M ³	bf	45,..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Kw tLB	Kolkwitzer s/l SF	M ⁺²		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M+2	..fr M1				
Kx S	Kauxdorfer s B	M ⁴	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Kz S	Kratzeburger ug B	K ³		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Kz SE	Krenzliner s HGSP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
La dLU	Lausigker ol/s UA	M	≈	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1
La L	Lankener l/ik F	R ⁴		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v						
La S	Langseer s FRa	A ¹	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Lä S	Lärzer bf B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
La SB	Lapauscher sGB	K ⁵	bg	45 NK2	46 K1	47 K1w	56 K1	..fr K1	57 K2g	..fr K1	67 K2g	..fr K1	
La tL	Lamitscher s/l FaÜP	A ¹		7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v						
Lb dL	Lindenberger l/s RF	K ²	≈	56 K1	..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3			

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Lb KG	Lebbiner k HG	RC	■	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	47 RC1w
Lb S	Liebenberger bs B	M ¹		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Lb SB	Leubrucher s MGHP	Z ⁵	f(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Lc S	Lauchhammer bs BP	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Ld S	Lindenhagener kg Re	KC ¹		56 KC1	57,67 KC2g	..fr KC1	7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v	../L KC2	../Lfr KC1	
Ld SB	Lindenaer s GSP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ld tL	Lindauer s/l F	K ⁴		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Ld tLB	Landower s/l SF	R ⁵	■	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1				
Le dTL	Lehder t/s AA	R	≈	1 × 4 ÜR0	1 × 5 ÜR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1
Le L	Lebusaer l/e F	M ³		7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
Le S	Leistener s B	M ²	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Le SE	Lewitzer s HGUP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	../L ..+2	../E ..2	
Le tL	Leussiner ks/kl Re	KC		7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v						
Le TU	Letziner t US	K	■	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Lf dLB	Lichterfelder ol/s Ak bzw. AV	R	≈	1 × 5 ÜR1	1 × 6 ÜR2	45 NR2	46 R1	47 R1w	56 R1	..fr R1	57 R2g	..fr R1	67 R2g
Lf S	Lichterfelder f RP	A ¹	f+bf	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Lg S	Ligaer bs B	M ⁴		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Lg SB	Lugauer ls SHP	Z ⁵		45,..fr NZ2	46,55 Z1	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	../L ..+2	../E ..2	
Lh LG	Lehnenhofer l MS	K		13 ÜK0	14 ÜK0	15 ÜK1	23 NK0	24 NK1	25 NK1w	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w
Lh S	Lindenhofer g RRE	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Lh SU	Lindhorster s UG	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	46,55 NM3	47 M1w	56 M1	57 M2g	67 M2g
Li dL	Linzer l/s F	M ²	≈	56 M1	..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3			
Li L	Lindenberger l RF	R ⁵		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v						
Li RG	Lietzower r MG	M		23 NMO	24 NM1	25 NM1w	26 NM2w	27 NM2w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2
Li S	Limsdorfer s RP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Li SB	Liepser s GPB	Z ³		45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	../L ..+2	../E ..2	
Li SE	Liepgartener	Z ⁵	(K)	45,..fr NZ2	45,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Lk tL	Lanker s/l F	K ¹		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Ll S	Lindthaler f B	M ⁵	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Lm dLGL	Lomnitzer l/s AA	M	≈	23 NM0	24 NM1	25 NM1w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w			
Lm S	Leuchtturmer s FFRa	A ¹	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Lm SE	Lühmannsdorfer s HGHRP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	45,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
LM.A	Lehm-Gleymoor, arm	A		12 OA1	13 OA2	14 OA2	23 OA2	24 OA3	25 OA3	26 OA4w	34 OA3	35 OA4	45 OA4
LM.AC	Lehm-Gleymoor, arm, karbonatisch	AC		12 OA1	13 OAC2	14 OAC2	23 OAC2	24 OAC3	25 OA3	26 OA4w	34 OAC3	35 OA4	45 OA4

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
LM.K	Lehm-Gleymoor, kräftig	K		12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OK3	25 OK3	26 OK4w	34 OK3	35 OK4	45 OK4
LM.KC	Lehm-Gleymoor, kräftig karbonatisch	KC		12 OK1	13 OKC2	14 OKC2	23 OKC2	24 OKC3	25 OK3	26 OK4w	34 OKC3	35 OK4	45 OK4
LM.M	Lehm-Gleymoor, mäßig nährstoffhaltig	M		12 OM1	13 OM2	14 OM2	23 OM2	24 OM3	25 OM4	26 OM4w	34 OM3	35 OM4	45 OM4
LM.MC	Lehm-Gleymoor, mäßig nährstoffh., karbonatisch	MC		12 OM1	13 OMC2	14 OMC2	23 OMC2	24 OMC3	25 OM3	26 OM4w	34 OMC3	35 OM4	45 OM4
LM.R	Lehm-Gleymoor, reich	R		12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OR3	25 OR3	26 OR4w	34 OR3	35 OR4	45 OR4
LM.RC	Lehm-Gleymoor, reich, carbonatisch	RC		12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OR3	25 OR3	26 OR4w	34 OR3	35 OR4	45 OR4
LM.Z	Lehm-Gleymoor, ziemlich arm	Z		12 OM1	13 OZ2	14 OZ2	23 OZ2	24 OZ3	25 OZ3	26 OZ4w	34 OZ3	35 OZ4	45 OZ4
LM.ZC	Lehm-Gleymoor, ziemlich arm, karbonat.	ZC		12 OM1	13 OZC2	14 OZC2	23 OZC2	24 OZC3	25 OZC3	26 OZ4w	34 OZC3	35 OZ4	45 OZ4
Lm S	Leuchtturmer s FFra	A ¹	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2
Lm SE	Lümannsdorfer sHGHRP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	45,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Ln dLB	Langnower l/s ASF	K ⁴	≈	45 NK2	46 K1	47 K1w	56 K1	..fr K1	57 K2g	..fr K1	67 K2g	..fr K1	
Ln S	Lichtenower us B	Z ³	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E Z2
Lo S	Lohmer bg ÜP	M ³		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2
Lö S	Löwenberger bg RRE	M ³		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2
Lö SB	Lödderitzer os GK o. GV	R		1 x 5 ÜR1	1 x 6 ÜR2	45 NR2	46 R1	47 R1w	56 R1	..fr R1	57 R2g	..fr R1	67 R2g
Lo SE	Loosener s UGSP	A ¹		45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L ..+2	..E ..2
Lo SG	Lohmener sd HG	R		23 NR0	24 NR1	25 NR1w	26 NR2w	27 NR2w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe											
L _o t _{LB}	Lorbecker s/ SFHÜP	M ⁺ 4		46	..fr	47	..fr	7	..fr						
				M1	M1	M1w	M1	M+2	M1						
L _ö t _{LU}	Löhstener s/ US	K ⁴		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr		
				NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1	K1w	K1	K2	K1		
L _p S	Leipper g RRE	A ¹	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	Z+2	Z1	A+2		
L _p t _{LG}	Lieper s/ HS	K		13	14	15	16	34	35	36	37	46	47		
				ÜK0	ÜK0	ÜK1	ÜK2	NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1w		
L _p t _{TB}	Leppiner s/t SF	M ⁺ 2		46	..fr	47	..fr	7	..fr						
				M1	M1	M1w	M1	M+2	M1						
L _r S	Linderberger f FRP	Z ⁵	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2		
L _s S	Lübesser ug B	M ³	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2		
L _s S _E	Lehsener s AGRP	Z ³	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2		
L _s S _G	Lemseller s HG	R		34	35	36	37	45	46,55	47	..fr	56	..fr		
				NR1	NR2	NR2w	R1w	NR2	NR3	R1w	R1	R1	R1		
L _s t _L	Laascher s/ SP	M ⁺ 4		7	..fr	..tr	..v								
				M+2	M1	M3	A2v								
L _t R	Lautaer sr RP	Z ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2		
L _t S	Lubaster f RP	A ¹	f+bf	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2		
L _t S _E	Lübtheener s AGUP	M ⁵	(K) bs	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
				NM2	NM3	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2		
L _u R _B	Lubkower r GUP	A		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	..+2	..+2		
L _u S	Ludwigsauer bs RRE	Z ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2		
L _ü S	Lühmannsdorfer s Ü	Z ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2		

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Lü SB	Lübker s GMHRP	Z ⁵	f (K)	45,..fr NZ2	45,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E .. 2
Lu SB	Lubolzer s GRP	A ¹		45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
Lü SE	Lüblower s FHGUP	A ²	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..A+2	../E ..A+2
Lu tTB	Luthersteiner s/t SRP	Z ⁵		46 Z1	..fr Z1	47 Z2	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1				
Lü tTB	Lütendorfer s/t SF	K ⁴		46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1				
Lv S	Laevener bs RRE	M ⁴		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	.. v A2v	../L M ⁺ 2	../Lfr M1	../E M2
Lw dL	Lönnewitzer ol/s K bzw. V	K	≈	1 × 6 ÜK2	1 × 7 ÜK2	56 K1	..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1		
Lw S	Lienewitzer s B	M ⁴	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	.. v A2v	../L M ⁺ 2	../Lfr M1	../E M2
Lw SE	Liebenwalder s HGHP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E .. 2
Ly tLU	Leyerhofer s/l US	M ²		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1
Lx S	Lexower f RRE	M ⁴	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	.. v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Lz dLG	Liebitzer l/s HA	Z	≈	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	37 Z1w	46 Z1	47 Z1w	..fr Z1			
Lz S	Lenzer f B	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	.. v A2v	../L M ⁺ 2	../Lfr M1	../E M2
Lz SB	Leizener s GB	K ⁵	bs	45,..fr NK2	46,56 K1	..fr K1	47 K1w	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1		
Lz tL	Luziner s/l RRE	K ¹		56 K1	..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3			
Lz tLB	Luziner s/l SF	K ³		45,..fr NK2	46,56 K1	..fr K1	47 K1w	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1		
M.A	Moor, arm	A		12 OA1	13 OA2	14 OA2		23 OA2	24 OA3	34 OA3	35 OA4	45 OA4	56 OA4

Kurzz.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				12	13	14	23	24	34	35	45	56	
M.AC	Moor, arm, karbonatisch AC			12 OA1	13 OAC2	14 OAC2	23 OAC2	24 OAC3	34 OAC3	35 OA4	45 OA4	56 OA4	
M.K	Moor, kräftig	K		12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OK3	34 OK3	35 OK4	45 OK4	56 OK4	
M.KC	Moor kräftig, karbonat.	KC		12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OK3	34 OK3	35 OK4	45 OK4	56 OK4	
M.M	Moor, mäßig nährstoffh.	M		12 OM1	13 OM2	14 OM2	23 OM2	24 OM3	34 OM3	35 OM4	45 OM4	56 OM4	
M.MC	Moor, mäßig nährstoffh., karbonatisch			12 OM1	13 OMC2	14 OMC2	23 OMC2	24 OMC3	34 OMC3	35 OM4	45 OM4	56 OM4	
M.R	Moor, reich	R		12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OR3	34 OR3	35 OR4	45 OR4	56 OR4	
M.RC	Moor, reich, karbona- tisch	RC		12 OK1	13 OK2	14 OK2	23 OK2	24 OR3	34 OR3	35 OR4	45 OR4	56 OR4	
M.Z	Moor, ziemlich arm	Z		12 OM1	13 OZ2	14 OZ2	23 OZ2	24 OZ3	34 OZ3	35 OZ4	45 OZ4	56 OZ4	
M.ZC	Moor, ziemlich arm, karbonatisch	ZC		12 OM1	13 OZC2	14 OZC2	23 OZC2	24 OZC3	34 OZC3	35 OZ4	45 OZ4	56 OZ4	
Ma LU	Maßlauer ol UG	R		1 × 4 ÜR0	1 × 5 ÜR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1
Ma R	Maltziner ksr Re	K ⁵ C		56 KC1	57,67 KC2g	..fr KC1	7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v	..L KC2	..Lfr KC1	
Ma S	Markower f B	K ¹	f+bf	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2
Ma SE	Mandelshagener s HGHRP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	45,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L .. +2	..E .. 2
Ma SG	Mannhausener s MG	R		23 NR0	24 NR1	25 NR1w	26 NR2w	27 NR2w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2
Ma SU	Malker s UG	A		34 NA1	35 NA2	36 NA2w	45 NA2	46,55 NA3	47 A1w	56 A1	57 A2g	67 A2g	
Ma TU	Marnitzer t US	R		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1
Mb S	Müncheberger g RRE	M ²	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L K2	..Lfr K1	..E M2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Mc S	Malchower f Ra	M ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Mc SB	Mückenhorster s GSP	M	bf	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NM2	NM3	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2
Md S	Mahlendorfer bg B	K ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Md SB	Meinsdorfer s GB	M ²	[bs]	45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NM2	M1	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2
Me S	Melchower bs B	M ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Me SB	Meiersberger s GFHRP	A ¹	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	..+2	..+2
Me SU	Meuselkower s UG	M	bs	34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67
				NM1	NM2	NM2w	M1w	NM2	NM3	M1w	M1	M2g	M2g
Mf S	Meschendorfer s Ra	M ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Mg LB	Matgendorfer I MSHRP	M ⁺¹		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				M1	M1	M1w	M1	M+2	M1				
Mg SE	Menckengräber s FA-GUP	Z ⁴	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Mh S	Mahlitzer bf SP	Z ⁺⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Mh tLB	Markgrafenheider s/l SÜP	M ⁺⁵		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				M1	M1	M1w	M1	M+2	M1				
Mi dLGM	Miesterhorster l/s MA	R	≈	13	14	15	23	24	25	34	35	36	37
				ÜR0	ÜR0	ÜR1	NR0	NR1	NR1w	NR1	NR2	NR2w	R1w
Mi S	Michelsdorfer bus B	M ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Mi SB	Milkeler s GHP	A ²		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	..+2	..2
Mi SE	Mirower s HGHP	Z ⁴		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Mk SB	Markendorfer s GB	K ⁵	[bs]	45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				NR2	R1	R1	R1w	R2g	R1	R2	R1	R2	
M1 R	Mühlenberger sr RRE	K ³		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
M1 S	Möllendorfer f Ra	M ¹	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
M1 SG	Malchiner ks MG	RC		23 NR0	24 NR1	25 NR1w	26 NR2w	27 NR2w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	45 NR2
Mm dLBM	Molmker l/s AF	K ⁴	≈	45 NK2	46 K1	47 K1w	56 K1	..fr K1	57 K2g	..fr K1	67 K2g	..fr K1	
Mn S	Marknaundorfer bs B	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Mn SE	Menzendorfer s AGSP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Mo S	Moschwiger s ÜP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Mö S	Mönchsneider f B	M ²	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Mo SB	Moraaser s GRRE	M ⁵	bs	45,..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Mo SE	Mooster s HGRP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Mö SG	Möwenorter s FHG	A		34 NA1	35 NA2	36 NA2w	45 NA2	46,55 NA3	47 A1w	..fr A1	56 A1	..fr A1	67 A2g
Mö tKGM	Möllenhagener s/ik HG	R		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	47 R1w
Mö tLBM	Möreler s/l SFHRP	Z ⁺⁴		46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1				
Mr LG	Mühlroser l AS	A		24 NA1	25 NA1w	34 NA1	35 NA2	36 NA2w					
Mr S	Mecklenburger s FFUP	A ²	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
Ms R	Mueßer rg B	K ¹		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Ms S	Mühlroser bg RP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Ms SB	Mastkabener s GHP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ms SE	Mastkabener s UGSP	Z ¹		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Mt LU	Mentiner l/t US	K ¹		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Mu LG	Mulkwitzer l AS	Z		24 NZ1	25 NZ1w	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w					
Mu R'	Mukraner r Ro	?		56 ..1	57,67 ..2g	..fr ..1	7 ..2	..fr ..1	..tr ..3	..v ..2v	../L ..+2	../Lfr ..1	../E ..+2
Mu S	Murchiner bf B	K ²		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Mü S	Mützlitzer s SP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Mu SB	Mullberger s GB	M ⁵		45,..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Mü SB	Mückenberger s GFUP	A ¹	(K) [bs]	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
Mw S	Medewitzer s RRP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A2+
Mw SB	Marienwerther s GUP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
My S	Mylberger bs RRE	M ⁴		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Mz LG	Melzower akql HS	RC		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w
Mz S	Möglener s B	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Na S	Naugartener bs B	K ¹		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Na SG	Nassenheider s HG	K		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	45 NK2	46,55 NK3	47 K1w	..fr K1	56 K1	..fr K1
Nb S	Neubukower s HRP	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Nb SB	Neubrücker os GK bzw. GV	R		1 ^x 5 ÜR1	1 ^x 6 ÜR2	45 NR2	46 R1	47 R1w	56 R1	..fr R1	57 R2g	..fr R1	67 R2g
Nb SE	Neuburger s UGUP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Nd dL	Neuendorfer l/s F	M ²	≈	56 M1	..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3			
Nd LB	Naundorfer u SÜP	Z ¹		46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1				
Nd S	Neuendorfer s RRE	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Ne dL	Neeberger l/s RF	K ³	≈	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v			
Ne S	Nedlitzer s B	M ⁵	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ne SB	Nennhausener s GRRE	Z ⁵		45,..fr NZ2	46,56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Nf SE	Neuhofer s FHGHRP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ng S	Neu Gaarzer f B	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ng SB	Neubrandenburger yos GK	K		45 NK2	46 K1	47 K1w	56 K1	..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3
Nh dLU	Neuhofer l/s UA	R	≈	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1
Nh S	Niederhäger f RP	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Nh SG	Neuholländer s AG	K		23 NK0	24 NK1	25 NK1w	26 NK2w	27 NK2w	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	45 NK2
Ni LB	Nieskyer l SF	M ³		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1				

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
				1 ^x 6	1 ^x 7	56	57,67	..fr	7	..fr	..v	..L		
Ni S	Niemegker os K bzw. V	K		ÜK2	ÜK2	K1	K2g	K1	K2	K1	Z2v	K2		
Ni SE	Niendorfer s FHGHRP	A ²	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L A1	..+2	..+2
Nk R	Neukircher rg RP	A ³		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2	
Nk S	Neukircher g RP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2	
Nk SB	Naderkauer s GSP	Z ³		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Nl S	Neulangseer yof K	R		56 R1	..fr R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	..tr R3				
Nm dLG	Neumühler dl/s MA	R	≈	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	33 NR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w			
Nm S	Neukollmer bg RP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2	
Nn S	Nienhagener g RP	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2	
No S	Nossentiner us B	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2	
No SB	Nordstromer s GHP	Z ²	f	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Nr S	Niederlandiner bus B	K ³		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	..L K2	..Lfr K1	..E K2	
Nr SE	Neuenroder s AGUP	Z ⁴	(K) bs	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Ns S	Nordstrander s FFSP	A ¹	K	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2	
Ns SB	Neuhauser s GFHRP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2	
Nß S	Neudarßer s SP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2	
Nü S	Neubrücker s HP	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2	

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Nu SB	Neuschneiser s GUP	Z ³	bs	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Nu SE	Neuschneiser s UGUP	Z ³	bs	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Nw SB	Nordweger s GFSP	Z ²	f (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Nx S	Nexdorfer g RP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Nz LU	Neetzower ku UG	RC		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	..fr RC1	47 RC1w	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1
Nz M	Neu Zaucher im Fe	R		23 NR0	24 NR1	25 NR1w	26 NR2w	27 NR2w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2
Nz S	Neuzeller ks Re	MC ²		56 MC1	57,67 MC2g	..fr MC1	7 MC2	..fr MC1	..tr MC3	..v A2v	../L M+C2	../Lfr MC1	
Oc SB	Ochsenkruger s GRRE	M ³		45,..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Od S	Ottendorfer bs ÜP	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Oe SG	Oetteliner s MG	R		23 NR0	24 NR1	25 NR1w	26 NR2w	27 NR2w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2
Og S	Ortkruger g B	M ⁴	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ok S	Ochsenkopfer bs B	M ⁵		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
O1 S	Oßlinger ug B	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
O1 SB	Oldenburger s GFHP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	..fr Z1	56,..fr Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Om S	Ottmannsdorfer bs B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Op S	Ostpeener bs RRE	M ¹		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Op TG	Oppelhainer t MS	Z		24 NZ1	25 NZ1w	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w					

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Or S	Ortrander s Ra	A ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Os LU	Ochsenaaaler lt US	M ⁵		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NM1	NM2	NM2w	M1w	M1	M1	M1w	M1	M2	M1
Os S	Otoseer s FFHP	A ²	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Ot S	Otterschützer f HRP	A ⁵	f+bf	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Pa S	Paplitzer bs Ra	M ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Pä S	Pätower s FHRP	A ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Pa SG	Palmhorster ks HG	RC		34	35	36	37	45	46,55	47	..fr	56	..fr
				NR1	NR2	NR2w	RC1w	NR2	NRC3	RC1w	RC1	RC1	RC1
Pa tTU	Papenhagener s/t US	K		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1	K1w	K1	K2	K1
Pb S	Priemerburger g B	M ²	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2
Pc S	Petznickseer us B	M ¹	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2
Pc SE	Parchimer sAGUP	Z ³	(K) bs	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Pd S	Podelziger s Ra	Z ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Pe R	Peckateler sr B	K ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Pe S	Petershainer g RP	A ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Pe SB	Peenemünder s MGSP	Z ²	(K) [bs]	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Pe TB	Petershagener t SF	M ¹		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				M1	M1	M1w	M1	M2	M1				
Pe tL	Petersdorfer s/l F	M ⁴		7	..fr	..tr	..v						
				M2	M1	M3	A2v						

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe												
Pf L	Pfaffendorfer u F	M ³		7	..fr	..tr	..v									
				M2	M1	M3	A2v									
Pf S	Pfalzheimer us B	M ⁴	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E			
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2			
Pg S	Picheberger s B	K ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E			
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2			
Ph LG	Probsthainer l HS	Z		34	35	36	46	47	..fr							
				NZ1	NZ2	NZ2w	Z1	Z1w	Z1							
Ph S	Pritzhagener f RRE	A ¹	f+bf	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E			
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2			
Ph SU	Poggenhofer os UG	K		1 x 4	1 x 5	34	35	36	37	45	46,55	47	56			
				ÜK0	ÜK1	NK1	NK2	NK2w	K1w	NK2	NK3	K1w	K1			
Pi LB	Piskowitzer l SF	Z ²		46	..fr	47	..fr	7	..fr							
				Z1	Z1	Z1w	Z1	Z2	Z1							
Pi R	Pinnower sr B	R ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E			
				R1	R2g	R1	R2	R1	R3	M2v	R2	R1	R2			
Pi S	Picherscher g Ra	Z ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E			
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2			
Pk LU	Parkentiner kol UG	RC		1 x 4	1 x 5	34	35	36	37	46	..fr	47	..fr			
				ÜR0	ÜR1	NR1	NR2	NR2w	RC1w	RC1	RC1	RC1w	RC1			
Pk S	Petznicke g B	K ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E			
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2			
Pk SB	Peterskreuzer s MGSP	M ⁴	f(K)	45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E			
				NM2	M1	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2			
Pk TU	Plötzkauer kot UG	RC		1 x 4	1 x 5	34	35	36	37	46	..fr	47	..fr			
				ÜR0	ÜR1	NR1	NR2	NR2w	RC1w	RC1	RC1	RC1w	RC1			
Pl R	Plater sr B	K ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E			
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2			
Pl S	Plessaer s SP	A ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E			
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2			
Pl SG	Plattkower s AG	A		24	25	26	34	35	36	45						
				NA1	NA1w	NA2w	NA1	NA2	NA2w	NA2						
Pl tT	Plankener s/t F	K ³		7	..fr	..tr	..v									
				K2	K1	K3	Z2v									

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Pm S	Pamitzer bf B	K ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Pm tL	Pampiner s/l PF	K ³		7	..fr	..tr	..v						
				K2	K1	K3	Z2v						
Pn S	Plöwener bus B	M ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Po dTG	Pohlenzer qt/s AA	R	≈	1 × 4	1 × 5	34	35	36	37				
				ÜR0	ÜR1	NR1	NR2	NR2w	R1w				
Po S	Poucher os K bzw. V	R		1 × 6	1 × 7	56	..fr	57,67	..fr	7	..fr	..v	../L
				ÜR2	ÜR2	R1	R1	R2g	R1	R2	R1	M2v	R2
Pö S	Plöwener bs Ra	K ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Po tLB	Ponickauer s/l SF	M ⁴		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				M1	M1	M1w	M1	M2	M1				
Pp KU	Poppentiner k US	RC		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NR1	NR2	NR2w	RC1w	RC1	RC1	RC1w	RC1	RC2	RC1
Pp S	Papenberger bg B	K ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Pr RG	Proraer r AG	A		24	25	26	34	35	36	45			
				NA1	NA1w	NA2w	NA1	NA2	NA2w	NA2			
Pr S	Polchower f RRE	K ⁵	f+bf	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Pr SB	Prerower s GFSP	A ¹	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	.. +2	.. +2
Pr SG	Preetzener ks AG	RC		23	24	25	26	27	34	35	36	37	45
				NR0	NR1	NR1w	NR2w	NR2w	NR1	NR2	NR2w	RC1w	NR2
Pr tL	Prötzener s/l SP	M ⁺³		7	..fr	..tr	..v						
				M+2	M1	M3	A2v						
Pr tLB	Pritzerber s/l SRa	M ⁺³		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				M1	M1	M1w	M1	M+2	M1				
Ps S	Prinzensteiger f FRP	Z ⁵	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Pt LG	Potthagener I AS	M		23	24	25	34	35	36	37			
				NM0	NM1	NM1w	NM1	NM2	NM2w	M1w			

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Pt R	Peutscher rs B	M	1	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E	
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2	
Pt S	Petersdorfer bf RRE	K	4	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E	
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2	
Pt SB	Pratauer s GRa	Z	3	45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E	
				NZ2	Z1	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	ZK2	Z2	
Pu S	Puschwitzer s SP	A	5	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E	
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2	
Pu SB	Pulverhofer s GB	Z	3	45,..fr	46,56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E	
				NZ2	Z1	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	ZK2	Z2	
Pw S	Patzschwiger g B	Z	4	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
					Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Py S	Pötenitzer s B	K	5	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E	
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2	
Pz dLU	Plaazer l/s UA	R	≈	34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr	
				NR1	NR2	NR2w	R1w	R1	R1	R1w	R1	R2	R1	
Pz S	Planitzer f RP	Z	5	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E	
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2	
Pz SB	Premnitzer s GFSP	Z	3	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
					NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Qa S	Quassower bs BP	M	4	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E	
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M2	K1	M2	
Qs S	Quassower g RRE	M	4	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
					M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2
Qu S	Questiner f SP	Z	1	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E	
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2	
Qu SB	Quassower s GRa	K	5	45	46	47	56	..fr	57,67	..fr	7	..fr	..tr	
				NK2	K1	K1w	K1	K1	K2g	K1	K2	K1	K3	
Qz tTU	Quitzböbeler s/t US	M	1	■	34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
					NM1	NM2	NM2w	M1w	M1	M1	M1w	M1	M2	M1
Ra L	Rabener u F	K	1	7	..fr	..tr	..v							
				K2	K1	K3	Z2v							
Ra LG	Radischer l MS	Z	■	24	25	34	35	36						
					NZ1	NZ1w	NZ1	NZ2	NZ2w					

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
Ra R	Rabensteinfelder sr B	K ²		K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Ra S	Rahnsdorfer f B	M ³	↑	M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Rä S	Räbeler os K bzw.V	R		ÜR2	ÜR2	R1	R1	R2g	R1	R2	R1	M2v	R2
Ra SB	Radenslebener s GHP	Z ⁴		NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Ra SU	Rastower s UG	Z	bg	NZ1	NZ2	NZ2w	NZ2	NZ3	Z1w	Z1	Z2g	Z2g	Z1
Ra tLUR	Radeberger s/l US	M ⁴		NM1	NM2	NM2w	M1w	M1	M1	M1w	M1	M2	M1
Rb LB	Richtenberger I SF	R ⁴		R1	R1	R1w	R1	R2	R1				
Rb S	Radeburger bs B	M ²		M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Rb SB	Rabenhorster s GMRa	Z ³	(K)	NZ2	Z1	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Rb SE	Rothbecker s AGUP	M ⁴	(K) bs	NM2	NM3	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2
Rb tKGR	Riesenbrücker s/ik HG	K		ÜK0	ÜK0	ÜK1	ÜK2	NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1w
Rc S	Ricklinger bs BP	M ²		M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v			
Rd dL	Rathsdorfer ol/s K o. V	R	≈	ÜR2	ÜR2	R1	R1	R2g	R1	R2	R1		
Rd LG	Raduhner I AS	K		ÜK0	ÜK0	ÜK1	NK0	NK1	NK1w	NK1	NK2	NK2w	K1w
Rd S	Rabensteinfelder bg B	R ⁵		R1	R2g	R1	R2	R1	R3	M2v	R2	R1	R2
Re dL	Reinsdorfer l/s F	K ⁴	≈	K1	K1	K2g	K1	K2	K1	K3			
Re S	Rehberger s FUP	A ²	K	A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Re SB	Reesdorfer s GHRP	Z ³		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Re tLU	Reitweiner s/l US	K ⁵		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Rf S	Rückersdorfer g Ra	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Rf tLU	Rehfelder s/l US	K ⁴		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Rg S	Roggower bs Ra	M ¹		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Rh S	Rehainer f B	M ⁴	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Rh SB	Rehorster s MGHRP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Ri LB	Ribbensdorfer l SF	K ²		46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1				
Ri S	Ribnitzer f RP	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Rk S	Rädigker f Ra	M ³	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Rk SB	Rosenspecker s MGHRP	Z ⁵	f(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Rl S	Reddelicher f FÜP	Z ²	K	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Rn S	Reudnitzer g RP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Rn SB	Rathsteiner s GPB	Z ¹	f	45,..fr NZ2	46,55 Z1	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Rn tL	Rauener s/e F	M ⁵		7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
Ro dLU	Rosenfelder l/s UA	M	≈	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1
Rod T	Rodenskrugerkt/s Re	RC		1 × 6 ÜR2	1 × 7 ÜR2	56 RC1	57,67 RC2g	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1	..v M2v	../L RC2	

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Ro dTB	Rockendorfer kot/s AK bzw. AV	RC	≈	1 × 5 ÜR1	1 × 6 ÜR2	45 NR2	46 RC1	47 RC1w	56 RC1	..fr RC1	57 RC2g	..fr RC1	67 RC2g
Rö LU	Röderner I US	M ³		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1
Ro M	Roezer kah Fe	RC		12 OK1	13 OK2	14 OR2	22 OK1	23 OK2	24 OR3	34 OR3	35 OR4	45 OR4	56 OR4
Ro S	Rosenower bg B	R ⁴		56 R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v	..L R2	..Lfr R1	..E R2
Rö S	Rövershäger f Ra	Z ²		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Ro SB	Rottaer os GK bzw. GV	K		1 × 5 ÜK1	1 × 6 ÜK2	45 NK2	46 K1	47 K1w	56 K1	..fr K1	57 K2g	..fr K1	67 K2g
Ro SE	Rosenhagener s AGHRP	M ⁵	(K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..L ..+2	..E ..2
Rö SE	Rögnitzer s UGHP	A ²		45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L ..+2	..E ..+2
Ro SG	Rostocker s HG	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	46,55 NM3	47 M1w	..fr M1	56 M1	..fr M1
Ro TB	Rosenburger kot SK bzw. SV	RC		1 × 5 ÜR1	1 × 6 ÜR2	45 NR2	46 RC1	47 RC1w	56 RC1	..fr RC1	57 RC2g	..fr RC1	67 RC2g
Ro tLG	Röhner s/l HS	A		34 NA1	35 NA2	36 NA2w	46 A1	47 A1g	..fr A1				
Rp KG	Ramper mk MG	KC		13 ÜK0	14 ÜK0	15 ÜK1	23 NK0	24 NK1	25 NK1w	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 KC1w
Rp LU	Rupensdorfer I US	R ⁴		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1
Rr S	Regelsdorfer g RP	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Rr SB	Rookhorster s GFUP	Z ¹	bs (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Rs dL	Rehsener ol/s K bzw. V R		≈	1 × 6 ÜR2	1 × 7 ÜR2	56 R1	..fr R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1		
Rs S	Rosengartener g HRP	A ⁵		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Rs SB	Rosiener s MGUP	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
Rß S	Rotfließler uos V	M		56 M1	..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1				
Rt S	Reetzer bg B	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Rt SB	Rethsegger s GMHRP	Z ²	f (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Rü LU	Rügebänder I US	R ⁴		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1
Ru S	Reudener s RRP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Rü S	Rüthnicker s RRE	Z ⁵	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Ru tK	Rusewaser s/k Ü	K ⁴		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Ru SE	Ruscher s MGUP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Rw L	Reichenwalder ol K o. V M	M		56 M1	..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1				
Rw S	Rodenwalder yos K	M		56 M1	..fr M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1				
Rz S	Reinharzer g RP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Sa dL	Sauziner kl/s Re	RC	≈	7 RC2	..fr RC1	..tr RC3	..v M2v						
Sa K	Saßnitzer ik Re	KC		7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v						
Sa S	Sackwitzer s B	Z ⁴		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Sa SB	Sadelpuhler s MGHP	Z ²	f (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Sa SE	Sandförder s UGHRP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Sa SG	Sandkrueseer s MG	M		23 NM0	24 NM1	25 NM1w	26 NM2w	27 NM2w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2
Sa SU	Saatener s UG	K	g	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	45 NK2	46,55 NK3	47 K1w	56 K1	57 K2g	67 K2g
Sa tLB	Sanzer s/l MSSP	Z ⁺¹		46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1				
Sa tT	Sagaster s/t F	K ³		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Sb L	Schöneberger uF	K ¹		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Sb LG	Scharbower l HS	K		13 ÜK0	14 ÜK0	15 ÜK1	16 ÜK2	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	47 K1w
Sb S	Sternebecker g B	A ¹	↑	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E A+2
Sb SB	Schwaningsberger os GK	M		45 NM2	46 M1	47 M1w	56 M1	..fr M1	57 M2g	..fr M1	67 M2g		
Sb SE	Stutenbaumer s FUGHP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Sb SU	Stallberger ks UG	RC	kf	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	45 NR2	46 RC1	47 RC1w	56 RC1	57 RC2g	67 RC2g
Sb tLU	Steinbecker s/l US	K ⁴		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Sc R	Schönborner rg B	Z ²		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Sc S	Schönborner g B	M ⁵		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2
Sc SB	Schamhorster s GHRP	Z ²	f	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Sc SE	Schleppelshorster s FUGSP	Z ²	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Sc SG	Stechauer s HG	Z		34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2	46,55 NZ3	47 Z1w	..fr Z1	56 Z1	..fr Z1	

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
sd S	Schradener g B	M ⁴		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
sd SB	Strandhorster s GMSP	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
sd tL	Schlunkendorfer s/l Ra	M ⁺³		7 M+2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
se dKG	Selchower k/s HA	RC	≈	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	47 RC1w
se S	Schwenower bs B	M ⁴		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
se SB	Seelensdorfer s GFP	A	K	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
se tL	Selliner s/l FÜ	M ⁺¹		7 M+2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
sf L	Steinfelder l RF	R ⁵		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v						
sf S	Senftentaler f B	K ²	f+bf	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
sf SB	Sommerfelder s GRa	Z ³		45,..fr NZ2	46,56 Z1	..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
sg S	Stoltenhäger bs B	K ²		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
sh dLG	Schweinehorster l/s AA	M	≈	14 ÜM0	15 ÜM1	16 ÜM2	23 NM0	24 NM1	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	
sh LB	Sievertshäger l SFHÜP	M ⁺¹	K	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M+2	..fr M1				
sh S	Steinhorster bs RP	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
sh SB	Steffenshagener s GHP	Z ⁴		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2w	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
sh SE	Schönhorster s UGSP	Z ³		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
sh SM	Schützenhauser im/s Fe K			13	14	15	16	23	24	34	35	45	

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				OK2	OK2	OK3ü	OK4ü	OK2	OK3	OK3	OK4	OK4	
si s	Schiedeler s Ra	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
si SB	Siemshorster s GM Ra	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA2	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2
si SE	Siggelkower s UGSP	Z ¹		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
si tL	Silberberger s/e FaÜP	Z ⁵		7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v						
sk s	Schönebecker s RP	Z ³		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
sk TG	Schkönaer t HS	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	47 M1w	..fr M1			
sk tLUS	Satzkorners s/ US	K ³		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
sl s	Stülower f ÜP	Z ²		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
sl SB	Schleesener os GK bzw. GV	M		45 NM2	46 M1	47 M1w	56 M1	..fr M1	57 M2g	..fr M1	67 M2g		
sl tLBS	Slater s/ SF	K ⁴		46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1				
SM.A	Sand-Gleymoor, arm	A		12 OA1	13 OA2	14 OA2	22 OA1	23 OA2	24 OA3	34 OA3	35 OA4	45 OA4	56 OA4
SM.AC	Sand-Gleymoor, arm karbonatisch	AC		12 OA1	13 OAC2	14 OAC2	22 OA1	23 OAC2	24 OAC3	34 OAC3	35 OA4	45 OA4	56 OA4
SM.K	Sand-Gleymoor, kräftig	K		12 OK1	13 OK2	14 OK2	22 OK1	23 OK2	24 OK3	34 OK3	35 OK4	45 OK4	56 OK4
SM.KC	Sand-Gleymoor, kräftig, karbonatisch	KC		12 OK1	13 OK2	14 OK2	22 OK1	23 OK2	24 OK3	34 OK3	35 OK4	45 OK4	56 OK4
SM.M	Sand-Gleymoor, mäßig nährstoffhaltig	M		12 OM1	13 OM2	14 OM2	22 OM1	23 OM2	24 OM3	34 OM3	35 OM4	45 OM4	56 OM4
SM.MC	Sand-Gleymoor, mäßig nährstoffh., karbonat.	MC		12 OM1	13 OMC2	14 OMC2	22 OM1	23 OMC2	24 OMC3	34 OMC3	35 OM4	45 OM4	56 OM4
SM.R	Sand-Gleymoor, reich	R		12 OK1	13 OK2	14 OR2	22 OK1	23 OK2	24 OR3	34 OR3	35 OR4	45 OR4	56 OR4

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
SM.RC	Sand-Gley Moor, reich, karbonatisch	RC		12 OK1	13 OK2	14 OR2	22 OK1	23 OK2	24 OR3	34 OR3	35 OR4	45 OR4	56 OR4
SM.Z	Sand-Gley Moor, ziemlich arm	Z		12 OM1	13 OZ2	14 OZ2	22 OM1	23 OZ2	24 OZ3	34 OZ3	35 OZ4	45 OZ4	56 OZ4
SM.ZC	Sand-Gley Moor, ziemlich arm, karbonatisch	ZC		12 OM1	13 OZC2	14 OZC2	22 OM1	23 OZC2	24 OZC3	34 OZC3	35 OZ4	45 OZ4	56 OZ4
Sm S	Schmerberger g B	M ⁵	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Sm SB	Semmeriner s GHRP	Z ³	[bs]	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Sm SE	Sommerswalder s FUGSP	M ⁴	(K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Sm SU	Schmerkendorfer s UG	M	bs +bf	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	46 NM3	47 M1w	56 M1	57 M2g	67 M2g
Sm tLB	Schnatermannscher s/ SFÜP	M ⁴		46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M+2	..fr M1				
Sn LU	Spornitzer I US	K ²		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Sn S	Sauener bs B	M ⁵		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Sn SB	Schuenhagener s GRP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Sn SE	Schönwalder s HGHP	M ⁵	(K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
So dKG	Sorgenloser ik/s HA	RC	≈	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	47 RC1w
So S	Sonnenburger bs B	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Sö S	Schönaer g B	Z ³	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Sö SB	Söllichauer s GRP	Z ³		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Sö tL	Schönholzer s/ F	K ⁴		7	..fr	..tr	..v						

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
				K2	K1	K3	Z2v						
so tLU	Sollschwitzer s/l US	Z ³		34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	
sp L	Selpiner l FaÜP	M ⁺¹		7 M+2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
sp S	Stepenitzer s BP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
sp SB	Sponholzer s GRa	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
sp SE	Spornitzer s UGHRP	Z ⁵		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
sp SM	Straupitzer im/s Fe	R		13 OK2	14 OR2	15 OR3ü	16 OR4ü	23 OR2	24 OR3	34 OR3	35 OR4	45 OR4	
sp SU	Staupitzer s UG	A		34 NA1	35 NA2	36 NA2w	45 NA2	46,55 NA3	47 A1w	56 A1	57 A2g	67 A2g	..fr A1
sp tT	Staupitzer s/tF	M ⁵		7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
sr S	Straucher bs B	M ³		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2
sr SB	Steinreffer s MGUP	A ²	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA2	46,56 NA3	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..L ..+2	..E ..+2
ss S	Stresower s Ü	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E M2
ss SB	Schmalreffseer s GFRa	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
ss tLB	Schwanseer s/l SF	K ¹		46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1				
st dLG	Steinsdorfer l/s HA	K	≈	13 ÜK0	14 ÜK0	15 ÜK1	16 ÜK2	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	47 K1w
st dLU	Stresendorfer l/s UA	K	≈	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
st KG	Stegelitzer mk AG	RC		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w
st L	Stolzenhagener l RF	R ³		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v						

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr. Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
St LB	Stolper I SF	R ⁵	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1				
St R	Stietener sr B	K ³	56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
St RG	Stapheler r HG	A	34 NA1	35 NA2	36 NA2w	45 NA2	46,55 NA3	47 A1w	..fr A1	56 A1	..fr A1	
St S	Stahnsdorfer s RP	A ²	56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
St SB	Stapeler s GSP	Z ³	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
St SU	Storkower kos UG	RC	1 ^x 4 ÜR0	1 ^x 5 ÜR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	45 NR2	46 RC1	47 RC1w	56 RC1
St TG	Sternfelder t HS	R	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	47 R1w
St tLB	Stolper s.I SUP	Z ⁴	45,..fr NZ2	46,55 Z1	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z ⁺ 2	..fr Z1	45,..fr NZ2	46,55 Z1
Su L	Suckower I F	K ⁵	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v						
Su S	Stubnitzer bs ÜP	M ⁵	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Sü S	Salzmündener kos K o. V	RC	1 ^x 6 ÜR2	1 ^x 7 ÜR2	56 RC1	57,67 RC2g	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1	..v M2v	../L RC2	
Sü SB	s GMHP	Z ²	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Su SU	Summter s UG	M	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2	46,55 NM3	47 M1w	56 M1	57 M2g	67 M2g
Sü TG	Süßenhörener t MS	K	13 ÜK0	14 ÜK0	15 ÜK1	16 ÜK2	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	47 K1w
Su tLB	Subzower s/I SSP	Z ⁺ 1	46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z ⁺ 2	..fr Z1				
Sw KG	Schwinzer kd HG	RC	13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜR2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	47 RC1w
Sw S	Schwärzer s Ra	Z ³	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
Sw SB	Schwinkeler s GMHRP	Z ⁵	f (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Sw TG	Schmeckwitzer t HS	K		13 ÜK0	14 ÜK0	15 ÜK1	16 ÜK2	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	47 K1w	
Sw tL	Schwarzheider s/l F	K ³		7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v							
Sw tLB	Stannewischer s/l SÜP	Z ⁴		46 Z1	..fr Z1	47 Z2	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1					
Sw TU	Schwepnitzer t US	M ³		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1	
Sx R	Schadewitzer rs ÜP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2	
Sx S	Schadewitzer g BP	Z ²		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M2	../Lfr Z1	../E Z2	
Sy S	Schildaer bs RP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z2	../Lfr Z1	../E Z2	
Sy TU	Steckbyer ot UG	R		1 × 4 ÜR0	1 × 5 ÜR1	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	
Sz LB	Schmelzer l/et SÜP	Z ²		46 Z1	..fr Z1	47 Z2	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1					
Sz S	Schweinitzer os K o. V	M		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..v A2v	../L M+2				
Sz SB	Salzsteiner s GMSP	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	..fr A1	47 A2w	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2	
Sz SE	Sanitzer s UGUP	M ⁴		45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2	
Sz TG	Schwarzcollmer t HS	A		34 NA1	35 NA2	36 NA2w	46 A1	47 A1w	..fr A1					
Ta S	Tauerscher g BP	Z ³	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2	
Ta SB	Tarnower os GK o. GV	R		1 × 5 ÜR1	1 × 6 ÜR2	45 NR2	46 R1	47 R1w	56 R1	..fr R1	57 R2g	..fr R1	67 R2g	
Ta SG	Tauschaer s AG	Z		24 NZ1	25 NZ1w	26 NZ2w	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2				

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Ta tLU	Tannenberger s/l US	K ³		34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1
Tb s	Trebuser s UP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Tb SB	Torfbrücker s MGHP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Td LG	Tradoer l HS	A		34 NA1	35 NA2	36 NA2w	46 A1	47 A1w	..fr A1				
Td s	Tasdorfer s B	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Te s	Teschendorfer s RRE	Z ⁴	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Te SB	Teerofener s GB	K ¹		45,..fr NK2	46,56 K1	..fr K1	47 K1w	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	../L K2	../E K2
Te SG	Teerbrenner s MG	R		23 NR0	24 NR1	25 NR1w	26 NR2w	27 NR2w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	45 NR2
Tf s	Teufelsberger bs RRE	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Tg s	Torgelower f UP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Th RG	Thießower r MG	Z		24 NZ1	25 NZ1w	26 NZ2w	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2			
Th s	Thurower bs Ra	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v			
Th tLG	Thränaer s/l HS	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	47 M1w	..fr M1			
Ti L	Tieckower kl Re	KC		7 KC2	..fr KC1	..tr KC3	..v Z2v						
Tl s	Thielenheider bs B	Z ¹		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Tm SB	Trassenmoorer s MGSP	Z ³	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Tn s	Tuchener f B	Z ¹	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
To S	Trockenstücker f HRP	Z ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
To SU	Tornauer os UG	M		34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67
				NM1	NM2	NM2w	M1w	NM2	NM3	M1w	M1	M2g	M2g
Tp S	Trepliner s B	A ³	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Tr dLU	Treibitzer l/s UA	K	≈	34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1	K1w	K1	K2	K1
Tr S	Trassenheider s UP	A ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
Tr SB	Trenter s GUP	Z ³		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Tr SG	Trappenberger s HG	K		34	35	36	37	45	46,55	47	..fr	56	..fr
				NK1	NK2	NK2w	K1w	NK2	NK3	K1w	K1	K1	K1
Tr tLE	Trammer s/l HGHRP	M ⁺³		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr		
				NM2	NM3	M1	M1w	M+2g	M1	M+2	M1		
Ts SG	Tschinkaer s MG	A		24	25	26	34	35	36	45			
				NA1	NA1w	NA2w	NA1	NA2	NA2w	NA2			
Ts tLB	Thaisaer s/l SUP	Z ⁵		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr		
				NZ2	Z1	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1		
Ts tLU	Tribseeser s/l US	R ⁵		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NR1	NR2	NR2w	R1w	R1	R1	R1w	R1	R2	R1
Tt SU	Tettauer s UG	M	bs +bf	34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67
				NM1	NM2	NM2w	M1w	NM2	NM3	M1w	M1	M2g	M2g
Tu S	Tugamer bs RP	Z ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Tü S	Tiefenstücker f RRE	Z ³	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	M+2	M1	Z2
Tu SE	Tuckhuder s MGUP	Z ¹	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Tü TG	Taubertsmühler t AS	K		13	14	15	16	34	35	36	37	46	47
				ÜK0	ÜK0	ÜK1	ÜK2	NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1w
Tw S	Turower s RRE	M ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Tw SB	Tweler s GFUP	M ⁵	bs (K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Tw SE	Tweler s MGUP	M ⁵	(K)	45,..fr NM2	46,55 NM3	56,..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Tw SU	Tannenwiecker s UG	Z	f	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2	46,55 NZ3	47 Z1w	56 Z1	57 Z2g	67 Z2g	..fr Z1
Tz S	Treuenbrietzener s RRE	M ⁵	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Tz SG	Taterholzer s MG	M		23 NM0	24 NM1	25 NM1w	26 NM2w	27 NM2w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	45 NM2
Üb dLG	Übigauer l/s AA	K	≈	13 ÜK0	14 ÜK0	15 ÜK1	23 NK0	24 NK1	25 NK1w	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w
Uc S	Uchtspringer f B	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ue LU	Ueckermünder u US	R ⁵		34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1
Uk S	Uhlenkruger uf B	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ul S	Upateler bf B	M ¹		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Um S	Ummanzer s FHRP	Z ⁴	K	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Un tLB	Ungnader s/l SHP	Z ⁺¹		46 Z1	..fr Z1	47 Z1w	..fr Z1	7 Z+2	..fr Z1				
Up S	Upahler bus B	K ⁴		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Us S	Useriner g Ra	M ¹		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Ut L	Uchtenhagener kol K bzw. V	RC		1×6 ÜR2	1×7 ÜR2	56 RC1	..fr RC1	57,67 RC2g	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1		
Üt S	Ützdorfer s RRE	Z ³	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Ut SE	Uthbrander s FUGSP	A ¹	(K)	45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E +2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Üz s	Ückeritzer s UP	A ¹		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Ve dL	Veltener ol/s K bzw. V	R	≈	1 ^x 6 ÜR2	1 ^x 7 ÜR2	56 R1	..fr R1	57,67 R2g	..fr R1	7 R2	..fr R1		
Ve LB	Ventschower I SRF	K ¹		46 K1	46fr K1	47 K1w	47fr K1	7 K2	7fr K1				
Ve tLG	Velsdorfer s/l HS	M		34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	47 M1w	..fr M1			
Vg L	Vietgester ku Re	RC		7 RC2	..fr RC1	..tr RC3	..v M2v						
Vh s	Völkshagener bs HRP	Z ²		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L Z+2	../Lfr Z1	../E Z2
Vi L	Vietingshöhler l/et RF	M ³		7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v						
Vi s	Vipperower f B	M ¹	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2
Vi SB	Vierecker s GB	M ¹	bf	45,..fr NM2	46,56 MZ1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ..+2	../E ..2
Vl s	Vietlüber bg B	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Vo s	Vogelsdorfer s B	Z ¹	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Vo SE	Verlorenorter s HGSP	Z ¹		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Vo SU	Vordarßer s FUG	Z	K	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2	46,55 NZ3	47 Z1w	56 Z1	57 Z2g	67 Z2g	
Vs SB	Vogelsanger s GÜP	Z ¹	f	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2
Vs TG	Vogelstorfer t AS	R		13 NR0ü	14 ÜR0	15 ÜR1	23 NR0	24 NR1	25 NR1w	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 R1w
Vt s	Vietzener bf RRE	M ²		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2
Vz s	Venzkower f B	M ¹	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe										
				56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E	
Wa R	Wadelsdorfer sr RRE	Z ⁵	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2	
Wa S	Wahlsdorfer g B	M ³	↑	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L K2	../Lfr K1	../E M2	
Wa SB	Wanzkaer s GRa	Z ¹		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Wb S	Wilhelmsburger f RRE	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2	
Wb SB	Wabeler s GHRP	A ¹		45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2	
Wb SE	Wöbbeliner s HGRP	Z ¹		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Wc S	Wamckower bg RRE	K ⁵		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	..v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2	
Wc SG	Wallbacher s MG	K		23 NK0	24 NK1	25 NK1w	26 NK2w	27 NK2w	34 NK1	35 NK2	36 NK2w	37 K1w	45 NK2	
Wd KG	Wickendorfer mk MG	MC		23 NM0	24 NM1	25 NM1w	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 MC1w				
Wd S	Wichmannsdorfer bf B	M ¹		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2	
Wd SB	Wernsdorfer us GB	M ⁵		45,..fr NM2	46,56 M1	..fr M1	47 M1w	57,67 M2	..fr M1	7 M2	..fr M1	../L ...+2	../E ..2	
Wd SE	Weselsdorfer s UGHRP	A ²		45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L ..+2	../E ..+2	
We dTB	Wendemarker ot/s AK bzw. AV	R	≈	1×5 ÜR1	1×6 ÜR2	45 NR2	46 R1	47 R1w	56 R1	..fr R1	57 R2g	..fr R1	67 R2g	
We L	Wendenburger u F	R ⁴		7 R2	..fr R1	..tr R3	..v M2v							
We S	Werderscher bs ÜP	M ⁴		56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	..v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2	
We SB	Wesendorfer s GHRP	Z ²		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L ..+2	../E ..2	
Wf S	Weigersdorfer s RP	A ⁵		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2	

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Wg R	Wegguner sr B	K ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	.. v	../L	../Lfr	../E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Wg S	Wangeliner bs B	K ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	.. v	../L	../Lfr	../E
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2
Wh LB	Wolfshäger I SF	K ¹		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				K1	K1	K1w	K1	K2	K1				
Wh LG	Wittenhäger I AS	R		13	14	15	23	24	25	34	35	36	37
				ÜR0	ÜR0	ÜR1	NR0	NR1	NR1w	NR1	NR2	NR2w	R1w
Wh S	Werderhofer bs Ra	M ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	.. v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
Wh SE	Wulfshagener s AGRP	M ⁴	(K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
			[bs]	NM2	NM3	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2
Wh SU	Wildenhainer s UG	K		34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67
				NK1	NK2	NK2w	K1w	NK2	NK3	K1w	K1	K2g	K2g
Wh tLB	Weißhauser s/l SRP	Z ⁺²		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				Z1	Z1	Z1w	Z1	Z+2	Z1				
Wi KG	Wissower k HG	RC		13	14	15	16	34	35	36	37	46	47
				ÜR0	ÜR0	ÜR1	ÜR2	NR1	NR2	NR2w	RC1w	RC1	RC1w
Wi L	Wilhelmshorster I F	K ¹		7	..fr	..tr	.. v						
				K2	K1	K3	Z2v						
Wi LB	Wilmsdorfer l/e SF	M ³		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				M1	M1	M1w	M1	M2	M1				
Wi S	Wiethäger f FHRP	Z ³	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	.. v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Wi SB	Wilsener s GFHRP	Z ²	f (K)	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
Wi SE	Willershagener s UGUP	M ⁵		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NM2	NM3	M1	M1w	M2g	M1	M2	M1	..+2	..2
Wi tL	Wiebendorfer s/l F	K ³		7	..fr	..tr	..v						
				K2	K1	K3	Z2v						
Wi tT	Wittenbecker s/t F	K ¹		7	..fr	..tr	.. v						
				K2	K1	K3	Z2v						
Wk S	Wiecker f FHRP	Z ⁵	K	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	.. v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Wk SB	Weißacker s GRP	A ²		45,..fr NA2	46,55 NA3	56,..fr A1	47 A1w	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	../L .. +2	../E .. +2
Wl S	Willershüsener bg RRE	K ³		56 K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1	..tr K3	.. v Z2v	../L K2	../Lfr K1	../E K2
Wl SB	Werler s GFRP	Z ³	[bs] (K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ2	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L .. +2	../E ..2
WM.A	Schwingmoor, arm	A		22 OA1									
WM.AC	Schwingmoor, arm, karbonatisch	AC		22 OA1									
WM.K	Schwingmoor, kräftig	K		22 OK1									
WM.KC	Schwingmoor, kräftig, karbonatisch	KC		22 OK1									
WM.M	Schwingmoor, mäßig nährstoffhaltig	M		22 OM1									
WM.MC	Schwingmoor, mäßig nährstoffh., karbonatisch	MC		22 OM1									
WM.R	Schwingmoor, reich	R		22 OK1									
WM.RC	Schwingmoor, reich karbonatisch	RC		22 OK1									
WM.Z	Schwingmoor, ziemlich arm	Z		22 OM1									
WM.ZC	Schwingmoor, ziemlich arm, karbonatisch	ZC		22 OM1									
Wm S	Walkmühler s RP	A ³		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	.. v A2v	../L A+2	../Lfr A1	../E A+2
Wn S	Wandlitzer f RRE	Z ³	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	.. v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E Z2
Wn SB	Wendbrucher s GSP	Z		45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	../L .. +2	../E ..2
Wo S	Woltower f B	M ²	f+bf	56 M1	57,67 M2g	..fr M1	7 M2	..fr M1	..tr M3	.. v A2v	../L M+2	../Lfr M1	../E M2

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Wo TB	Wolmirstedter ot SK bzw. SV	R		1 x 5 ÜR1	1 x 6 ÜR2	46 R1	..fr R1	47 R1w	..fr R1	7 R2	..fr R1		
Wo tKG	Wollenberger kl/ik HG	RC		13 ÜR0	14 ÜR0	15 ÜR1	16 ÜRC2	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	47 RC1w
Wo tLB	Woltersdorfer s/l SF	K ³		46 K1	..fr K1	47 K1w	..fr K1	7 K2	..fr K1				
Wp SU	Wiepersdorfer s UG	Z	f + ms	34 NZ1	35 NZ2	36 NZ2w	45 NZ2	46,55 NZ3	47 Z1w	56 Z1	57 Z2g	67 Z2g	
Wr S	Wolfshainer bs RP	A ²		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2
Wr SB	Weinrosener s GMSP	Z ³	(K)	45,fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Ws dLU	Wieser kl/s UA	RC	≈	34 NR1	35 NR2	36 NR2w	37 RC1w	46 RC1	..fr RC1	47 RC1w	..fr RC1	7 RC2	..fr RC1
Ws L	Waldsiewersdorfer ol K bzw. V	K		1 x 6 ÜK2	1 x 7 ÜK2	56 K1	..fr K1	57,67 K2g	..fr K1	7 K2	..fr K1		
Ws S	Weißiger s B	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Wt S	Wittstocker s BP	Z ⁵		56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L Z+2	..Lfr Z1	..E Z2
Wt LM	Wotschowskaer im/l Fe	K		23 OK2	24 OK3	25 OK3	26 OK4w	34 OK3	35 OK4	45 OK4			
Wu dLU	Wusterwitzer ol/s UA	M	≈	34 NM1	35 NM2	36 NM2w	37 M1w	46 M1	..fr M1	47 M1w	..fr M1	7 M2	..fr M1
Wü R	Würschnitzer sr HRP	A ³		56 A1	57,67 A2g	..fr A1	7 A2	..fr A1	..tr A3	..v A2v	..L A+2	..Lfr A1	..E A+2
Wu S	Wulkower g B	Z ²	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E Z2
Wu SB	Wutschendorfer s GMHP	Z ⁴	(K)	45,..fr NZ2	46,55 NZ3	56,..fr Z1	47 Z1w	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..L ..+2	..E ..2
Wü S	Warnemünder ks Re	Z ¹	↑	56 Z1	57,67 Z2g	..fr Z1	7 Z2	..fr Z1	..tr Z3	..v A2v	..L M+2	..Lfr M1	..E Z2
Wü SE	Wüstenbilower s UGHRP	Z ²		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E

Kurzz.	Kurzbezeichnung	Nkr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe											
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2		
Wu tLB	Wulfshäger s/l MSHRP	M ⁺⁵		46	..fr	47	..fr	7	..fr						
				M1	M1	M1w	M1	M+2	M1						
Ww S	Wustrower g B	K ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2		
Ww SB	Wurzelweger s GHP	Z ⁵	f	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2		
Ww SE	Wastrower s UGUP	A ²	bs	45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	..+2	..+2		
Wx S	Wilhelmshagener f SP	Z ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2		
Wy SB	Wittenscharener ls SPB	Z ²		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2		
Wz R	Wallitzer rs B	K ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				K1	K2g	K1	K2	K1	K3	Z2v	K2	K1	K2		
Wz S	Wietzower yos K	R		56	57,67	..fr	7	..fr	..v	..L					
				R1	R2g	R1	R2	R1	M2v	R2					
Wz SE	Warlitzer s UGHP	Z ⁴		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2		
Za dLB	Zabeltitzer ol/s AK bzw. AV	K	≈	1 ^x 5	1 ^x 6	45	46	47	56	..fr	57	..fr	67		
				ÜK1	ÜK2	NK2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K2		
Za S	Zahnaer s B	M ³	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2		
Za SE	Zabelsberger s HGRP	Z ⁵		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	..L	..E		
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2		
Zb SU	Zienburger ks UG	RC	kgb	34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67		
				NR1	NR2	NR2w	RC1w	NR2	NR3	RC1w	RC1	RC2g	RC2g		
Zc R	Zürcheler rg RP	A ¹	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	Z2	Z1	A+2		
Zc S	Zürcheler s RP	A ¹	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	..L	..Lfr	..E		
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	Z2	Z1	A+2		
Zd L	Zipsdorfer l RF	K ¹		7	..fr	..tr	..v								
				K2	K1	K3	Z2v								

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
zd s	Zedenicker s SP	Z ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
ze dLG	Zehlendorfer kl/s AA	RC	≈	13	14	15	23	24	25	34	35	36	37
				ÜR0	ÜR0	ÜR1	NR0	NR1	NR1w	NR1	NR2	NR2w	RC1w
ze R	Zernaer sr Ra	A ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
ze s	Zernitzer s BP	Z ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
zh s	Zeißholzer us B	Z ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
zi L	Ziethener kl Re	RC		7	..fr	..tr	..v						
				RC2	RC1	RC3	M2v						
zi s	Zieschter g B	Z ¹	↑	56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	M+2	M1	Z2
zk s	Zarnebauer s Ü	M ⁵		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	M+2	M1	M2
zl s	Zepeliner s RRE	M ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	A2v	K2	K1	M2
zl tL	Zerwelinseer s/ F	K ³		7	..fr	..tr	..v						
				K2	K1	K3	Z2v						
zm s	Zirkendorfer bs RRE	M ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	M2v	M+2	M1	M2
zn s	Zinnowitzer s UP	A ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2
zo dLG	Zschornaer l/s MA	M	≈	23	24	25	34	35	36	37			
				NM0	NM1	NM1w	NM1	NM2	NM2w	M1w			
zo s	Zirchowener s ÜP	Z ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
zo SE	Zachower s HGUP	Z ²		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NZ2	NZ3	Z1	Z1w	Z2g	Z1	Z2	Z1	..+2	..2
zo SU	Zootzener s UG	R		34	35	36	37	45	46,55	47	56	57	67
				NR1	NR2	NR2w	R1w	NR2	NR3	R1w	R1	R2g	R2g
Zö tLB	Zölkower s/ SFHÜP	M ⁺⁴		46	..fr	47	..fr	7	..fr				
				M1	M1	M1w	M1	M+2	M1				

Kurzzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe									
Zp S	Zempiner s ÜP	Z ³		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				Z1	Z2g	Z1	Z2	Z1	Z3	A2v	Z+2	Z1	Z2
Zr S	Zickersche ks Re	M ³ C		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	
				MC1	MC2g	MC1	MC2	MC1	MC3	A2v	M+C2	MC1	
Zs dTG	Züssower t/s MA	R	≈	13	14	15	23	24	25	34	35	36	37
				ÜR0	ÜR0	ÜR1	NR0	NR1	NR1w	NR1	NR2	NR2w	R1w
Zs KG	Zossener ik MG	RC		13	14	15	23	24	25	34	35	36	37
				ÜR0	ÜR0	ÜR1	NR0	NR1	NR1w	NR1	NR2	NR2w	RC1w
Zü LU	Züllsdorfer I US	K ²		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1	K1w	K1	K2	K1
Zü S	Zühlener bs RRE	M ¹		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				M1	M2g	M1	M2	M1	M3	M2v	M+2	M1	M2
Zü SB	Zühlsdorfer s GUP	A ²		45,..fr	46,55	56,..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L	../E
				NA2	NA3	A1	A1w	A2g	A1	A2	A1	..+2	..+2
Zü tLU	Zühlitzer s/ US	R		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NR1	NR2	NR2w	R1w	R1	R1	R1w	R1	R2	R1
Zv LG	Zittvitzer kl AG	RC		13	14	15	23	24	25	34	35	36	37
				ÜR0	ÜR0	ÜR1	NR0	NR1	NR1w	NR1	NR2	NR2w	RC1w
Zw LU	Zwethauer I US	K ²		34	35	36	37	46	..fr	47	..fr	7	..fr
				NK1	NK2	NK2w	K1w	K1	K1	K1w	K1	K2	K1
Zw R	Zerweliner sr B	R ⁴		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				R1	R2g	R1	R2	R1	R3	M2v	R2	R1	R2
Zw S	Zechower os K bzw. V	K		1×6	1×7	56	57,67	..fr	7	..fr	..v	../L	
				ÜK2	ÜK2	K1	K2g	K1	K2	K1	Z2v	K2	
Zz S	Zirzevitzer s HÜP	A ²		56	57,67	..fr	7	..fr	..tr	..v	../L	../Lfr	../E
				A1	A2g	A1	A2	A1	A3	A2v	A+2	A1	A+2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kurzeich.	Kurzbezeichnung	NKr.	Hw.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe																

Darst. C 1 - 30: Zuordnung humusreicher Sandböden im küstenfeuchten Klima zur Stamm-Standortsformengruppe

Im küstenfeuchten Klima (Großklimabereiche lambda und sigma) sowie im mäßig küstenfeuchten Klima (Großklimabereich kappa) wird bei anhydromorphen Sand-Podsolen mit Filz, bei entwässerten Sand-Gleyfilz...podsolen, Sand-Moorgley...podsolen und Sand-Gleymoor...podsolen sowie bei Kombinationsbodenformen der Filz-, Anmoor- und Moorgleyformen teilweise die Feuchtestufe erhöht. Beispiele hierfür sind:

Abk.	Feinbodenform Name und Kurzbezeichnung	Normal- Nährkr.- stufe	Be- son- derh.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe in Abhängigkeit von Grund- und Stauwasserform, Mesoklimaeigenschaften und Unterlagerungen								
				56	..fr	57,67	..fr	7	..fr	..tr	.. v	../L
..S	s FFHRP	Z	K	56 Z1	..fr NZ2	57,67 Z1	..fr Z1	7 Z1	..fr Z1	..tr Z2	.. v A2v	../L Z1
..S	s FRa	A	K	56 A1	..fr NA2	57,67 A1	..fr A1	7 A1	..fr A1	..tr A2	.. v A2v	../L A1
..S	s FSP	Z	K	56 Z1	..fr NZ2	57,67 Z1	..fr Z1	7 Z1	..fr Z1	..tr Z2	.. v A2v	../L Z1
..S	s FUP	A	K	56 A1	..fr NA2	57,67 A1	..fr A1	7 A1	..fr A1	..tr A2	.. v A2v	../L A1
..S	s FHRP	Z	K	56 Z1	..fr NZ2	57,67 Z1	..fr Z1	7 Z1	..fr Z1	..tr Z2	.. v A2v	../L Z1
..S	f FiÜP	Z ⁺	K	56 Z1	..fr NZ2	57,67 Z1	..fr Z1	7 Z1	..fr Z1	..tr Z+2	.. v A2v	../L Z1
..SB	s GFRa	A	(K)	45,46 NA2	56 A1	..fr NA2	47, A1w	57,67 A1	..fr A1	7 A1	..fr A1	../L A1
..SB	s GFSP	A	(K)	45,46 NA2	56 A1	..fr NA2	47, A1w	57,67 A1	..fr A1	7 A1	..fr A1	../L A1
..SB	s GFHP	A	(K)	45,46 NA2	56 A1	..fr NA2	47, A1w	57,67 A1	..fr A1	7 A1	..fr A1	../L A1
..SB	s GFRP	A	(K)	45,46 NA2	56 A1	..fr NA2	47, A1w	57,67 A1	..fr A1	7 A1	..fr A1	../L A1
..SB	s GFHRP	Z	(K)	45,46 NZ2	56 Z1	..fr NZ2	47, Z1w	57,67 Z1	..fr Z1	7 Z1	..fr Z1	../L Z1
..SB	s GMUP	A	(K)	45 NA2	..fr NA2	57,67 A1	7 A1	..fr A1	../L A1			

Abk.	Feinbodenform Name und Kurzbezeichnung	Normal- Nährkr.- stufe	Be- son- derh.	Zuordnung zur Stamm-Standortsformengruppe in Abhängigkeit von Grund- und Stauwasserform, Mesoklimaeigenschaften und Unterlagerungen										
..SB	s GMHP	Z	bs (K)	45	..fr	57,67	7	..fr	../L					
				NZ2	NZ2	Z1	Z1	Z1	Z1					
..SB	s GMHRP	Z	(K)	45	..fr	57,67	7	..fr	../L					
				NZ2	NZ2	Z1	Z1	Z1	Z1					
..SB	s MGSP	Z	(K)	45	..fr	57,67	7	..fr	../L					
				NZ2	NZ2	Z1	Z1	Z1	Z1					
..SB	s MGHP	Z	(K)	45	..fr	57,67	7	..fr	../L					
				NZ2	NZ2	Z1	Z1	Z1	Z1					
..SE	s FUGSP	Z	(K)	45,46	56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L		
				NZ2	Z1	NZ2	Z1w	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1
..SE	s FAGHP	Z	(K)	45,46	56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L		
				NZ2	Z1	NZ2	Z1w	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1
..SE	s AGUP	Z	(K)	45,46	56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L		
				NZ2	Z1	NZ2	Z1w	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1
..SE	s MGSP	Z	(K)	45,46	56	..fr	47	57,67	..fr	7	..fr	../L		
				NZ2	Z1	NZ2	Z1w	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1	Z1

2. Kennzeichnung der Standorte nach der Fruchtbarkeit

2.1. Allgemeines zur Waldstandortsfruchtbarkeit

Unter Waldstandortsfruchtbarkeit versteht man den Wirkanteil des Standortes am Leistungsvermögen der Waldbestände. Vorrangig drückt der Begriff Standortsfruchtbarkeit die Produktivität der Waldstandorte aus, d.h. das Vermögen, die Waldbestände mit Nährstoffen, Wasser und Luft, Wärme und Strahlung zu versorgen. Aber auch der Wirkanteil des Standortes an der Widerstandsfähigkeit gegen biotische und abiotische Waldschäden (Stabilität) wird in der Standortsfruchtbarkeit erfaßt.

Die Waldstandortsfruchtbarkeit läßt sich durch zwei verschiedene Einheiten kennzeichnen:

- nach der **Masse in dt/ha** oder
- nach dem **Volumen in fm/ha**.

In beiden Fällen erfolgt die Kennzeichnung der Waldstandortsfruchtbarkeit nicht auf der Basis von Standortsformen, sondern zur Vereinfachung auf der Basis von Standortsformengruppen (vgl. hierzu Abschnitt C. 1. Forstökologische Gruppierung der Standortsformen und -mosaiken).

Entsprechend der Gliederung der Standortsformen und Standortsformengruppen wird auch bei der Waldstandortsfruchtbarkeit unterschieden zwischen

1. **Stamm-Fruchtbarkeit**, beurteilt nach den schwer beeinflussbaren Standortseigenschaften (den Stamm-Eigenschaften); sie drückt das Leistungsvermögen des Waldstandortes bei natürlichem Gleichgewicht zwischen Stamm- und Zustandseigenschaften aus. Die Stamm-Fruchtbarkeit ist Ausdruck des natürlichen Leistungsvermögens.
2. **Zustands-Fruchtbarkeit**, beurteilt nach den leicht beeinflussbaren Standortseigenschaften (den Zustands-Eigenschaften); sie drückt die gegenwärtige Leistungsbereitschaft des Waldstandortes aus.

Die Differenz zwischen beiden heißt **Fruchtbarkeitsabweichung**. Die Zustands-Fruchtbarkeit kann unterhalb der Stamm-Fruchtbarkeit liegen; sie drückt dann eine **Degradation** aus. Liegt sie oberhalb der Stamm-Fruchtbarkeit drückt sie eine **Aggradation** aus.

Außerdem gibt es je nach Fragestellung zweierlei Fruchtbarkeitsziffern:

- Fruchtbarkeitsziffer der **forstlich nutzbaren Phytomasse** = Holzmasse
- Fruchtbarkeitsziffer der **gesamten oberirdischen Phytomasse**.

Bei der nutzbaren Phytomasse kann man sich auf die **Trockenmasse Derbholz (mit Rinde)** beschränken oder aber auch das Reisholz mit einschließen. Gegenwärtig besitzen wir hinreichend zuverlässige Kenntnisse nur über die Trockenmasseerzeugung an Derbholz; daher können wir vorerst die Fruchtbarkeit nur nach dieser Größe beurteilen.

Fruchtbarkeitsziffern werden für die wichtigsten standortsgerechten Bestockungsziele angegeben. Ihre Zuverlässigkeit entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis über die Beziehungen zwischen Standort und Ertrag. Die Fruchtbarkeitsziffern sind hergeleitet aus den für die Baumartenoptimierung erarbeiteten Tabellen der Leistungserwartung (Tab. 3, 14 a und 14 b in FLÖHR, HENGST, LEMBCKE, SCHWANECKE und WÜNSCHE, 1969), die auf standortskundlich-ertragskundlichen Untersuchungen beruht und durch die Taxations-Auswertung der Forsteinrichtung sowie Alters-Höhenbestimmungen an Probestämmen der Standortserkundung untermauert wird. Hinzu kommen mehrere neuere bei KOPP & SCHWANECKE (1994) angeführte ertragskundliche Arbeiten, darunter eine inzwischen abgeschlossene Forschungsarbeit über die standortsbezogene Produktivität an oberirdischer Phytomasse für Kiefer-, Buchen- und zweischichtige Kiefern-Buchenmischbestände. Wir dürfen demnach die Fruchtbarkeitsziffer als Ausdruck für die nachhaltige Leistungserwartung ansehen und Verbesserungen als waldbaulichen Erfolg werten.

Für Standorte mit **wesentlichem Fremdstoffeinfluß** gelten die Zustands-Fruchtbarkeitsziffern nicht; denn ihre Zuwachsentwicklung ist derzeit unbekannt.

2.2. Kennzeichnung der Waldstandortsfruchtbarkeit nach der Masse in dt/ha

Am treffendsten wird die Waldstandortsfruchtbarkeit nach dem Vermögen zur **durchschnittlichen jährlichen Trockenmassebildung in dt/ha** durch die jeweils anbauwürdigen oder natürlichen Bestockungen bemessen und in Fruchtbarkeitsziffern ausgedrückt. Die unterschiedliche Dichte des Holzes der einzelnen Baumarten wird hierbei ausgeschaltet und somit eine einfachere Vergleichbarkeit der Waldstandorte untereinander ermöglicht.

2.2.1. Fruchtbarkeitsziffer der forstlich nutzbaren Phytomasse = Holzmasse

Die in den folgenden Ausführungen dargestellten massebezogenen **Fruchtbarkeitsziffern** kennzeichnen die Leistungserwartung als

maximalen mittleren Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs an nutzbarer Trockenmasse in dt/ha (= Derbholz mit Rinde).

In den Darstellungen C 2 - 31 bis 37 wird die Waldstandortsfruchtbarkeit durch **Fruchtbarkeitsziffern** (dt/ha) auf der Grundlage von Standortsformengruppen gekennzeichnet. Um die Darstellungen nicht zu überlasten, sind die großen Stamm-Feuchtestufen in getrennten Übersichten angelegt worden, und zwar in der Reihenfolge

T ... 3
 T ... 2
 T ... 1
 W ... 2, Ü ... 2, Ü ... 1
 N ... 2
 N ... 1
 O ... 4, O ... 3, O ... 2, O ... 1.

Die Anordnung ist bei allen Darstellungen gleich:

- Sie enthalten in der Vertikalen die Stamm-, in der Horizontalen die Zustands-Standortsformengruppen bzw. Humusformen. In den Schnittpunkten von Stamm- und Zustands-Standortsformengruppe sind die jeweiligen Fruchtbarkeitsziffern eingetragen. Befinden sich Stamm- und Zustands-Standortseigenschaften im natürlichen Gleichgewicht, ergeben sich die Stamm-Fruchtbarkeitsziffern. Sie sind durch ein Raster gekennzeichnet.
- Links sind in der Senkrechten die Stamm-Standortsformengruppen mit je vier Klimastufen angeordnet. Durch den vertikalen Vergleich der Fruchtbarkeitsziffern kommen die durch schwer beeinflussbare Standortseigenschaften verursachten Fruchtbarkeitsunterschiede zum Ausdruck. So beträgt z.B. bei einem natürlichen Gleichgewicht die Fruchtbarkeitsziffer bei R 2 m 53 dt/ha, bei A 2 m nur 22 dt/ha nutzbare Holzmasse, demnach nur noch 42 %.
- In der Waagerechten sind jeweils die in Betracht kommenden Humusformen bzw. Zustands-Standortsformengruppen aufgetragen. Durch sie werden die durch leicht beeinflussbare Standortseigenschaften verursachten Fruchtbarkeitsunterschiede gekennzeichnet. Die Differenz zwischen der jeweils besten und schlechtesten Zustands-Standortsformengruppe ergibt die **Spannweite** der Zustands-Fruchtbarkeit. Sie zeigt – bei Berücksichtigung der Standortsbehandlung – die Widerstandskraft des Standortes gegen degradierende Eingriffe.

Durch den Vergleich der Fruchtbarkeitsziffern innerhalb einer Zeile läßt sich der Einfluß des Standortzustandes ablesen. Z.B. beträgt die Fruchtbarkeitsziffer bei K 2 m im natürlichen Gleichgewichtszustand 48 dt/ha, bei einer sehr starken Degradation mit der Humusform m Ma (= Zustandsgruppe d m) nur noch 26 dt/ha, also fast nur noch die Hälfte. Besonders durch diesen Vergleich werden Schwerpunkte für waldbaulichen Handlungsbedarf deutlich gemacht.

Die genannten Arten der Standortsfruchtbarkeit sind aus den Standortskarten ablesbar. Kongruent mit dem Standort spiegeln sich die genannten Arten der Fruchtbarkeit auch in der Vegetation wider: die Zustands-Fruchtbarkeit in den Zustands-Vegetations-Formengruppen und die Stamm-Fruchtbarkeit in den Stamm-Vegetations -Formengruppen.

2.2.2. Fruchtbarkeitsziffer der gesamten oberirdischen Phytomasse

Die Fruchtbarkeitsziffern werden hier ebenfalls ausgedrückt in durchschnittliche jährliche Trockenmassebildung in dt/ha, jedoch bezogen auf die gesamte oberirdische Phytomasse. Hierzu zählen Holz, Laub, Nadeln, Sträucher und Bodenvegetation. Nach HOFMANN (1994) beträgt der Anteil der Produktion an Holz durchschnittlich etwa 55 %, an Laub oder Nadeln 33 % und an Bodenvegetation 12 %. Die Werte schwanken je nach Wald- und Forstökosystem in gewissen Grenzen, wobei für waldbauliche Belange die Produktion an Bodenvegetation von besonderem Interesse ist. Sie ist mit 1,3 % besonders gering im Schattenblumen-Eichen-Buchenwald und mit 23,6 % besonders hoch im Adlerfarn-Kiefernforst.

Wie eingangs erwähnt, sind die Fruchtbarkeitsziffern nicht bestandes-, sondern standortsbezogen, so auch in den folgenden Darstellungen. Die Darstellung C 2 - 38 enthält die

Stamm-Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse auf der Grundlage von Stamm-Standortsformengruppen, untergliedert nach der Feuchtstufe des Bodens, des Mesoreliefs (= relief- und bodenbedingte Abweichungen vom Großklima) und der Klimastufe sowie nach Nährkraftstufen. Für die Stamm-Standortsformengruppen O ... 1, Ü ... 1 und Ü ... 2 fehlen bislang Werte für Fruchtbarkeitsziffern. In den Darstellungen C 2 - 39 und 40 sind am Beispiel der Klimastufe mäßig trockenes Tieflandsklima (Tm) auch die **Zustands-Fruchtbarkeitsziffern** für Phytomasse aufgeführt. Die Anordnung innerhalb der Darstellungen entspricht derjenigen der Fruchtbarkeitsziffern der forstlich nutzbaren Phytomasse, der Holzmasse.

2.3. Kennzeichnung der Waldstandortsfruchtbarkeit nach dem Volumen in fm/ha

Zum Umwandeln der Fruchtbarkeitsziffern von dt/ha in fm/ha wird die Rohholzdichte (ρ in kg/m^3) der einzelnen anbauwürdigen bzw. natürlichen Bestockungen benötigt. Hierbei werden zugrunde gelegt:

Bestockung	ρ in	
	kg/m^3	dt/m^3
Douglasie	420	4,2
Eiche	550	5,5
Erle	400	4,0
Fichte	410	4,1
Kiefer	440	4,4
Pappel	350	3,5
Robinie	660	6,6
Rotbuche	550	5,5.

Die Umwandlung ergibt sich aus der Beziehung

$$\frac{\text{Fruchtbarkeitsziffer (in dt / ha)}}{\text{Dichte (in dt / fm)}} = x \text{ fm/ha}$$

z.B. für Buche bei Stamm-Standortsformengruppe K 2 und Klimastufe m sowie Zustands-Standortsformengruppe km (= m MM)

$$\text{Zuwachs bei Buche} = \frac{48 \text{ dt / ha}}{5,5 \text{ dt / fm}} = 8,7 \text{ fm/ha.}$$

Die durch Umwandlung entstehenden Zahlenwerte beinhalten den

| maximalen Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs in fm Derbholz mit Rinde je Jahr und ha.

In den Darstellungen C 2 - 41 bis 53 sind die Umwandlungen von dt/ha in fm/ha für die Baumarten Erle, Eiche, Buche, Kiefer und Fichte vorgenommen worden. Im Aufbau ent-

sprechen sie den vorherigen Darstellungen, nur mußten wegen der Vielzahl von Möglichkeiten hinsichtlich Anbau und Vorkommen der Bestockungen auf den verschiedensten Stamm- und Zustands-Standortsformengruppen Teiltabellen auf der Basis von Klimastufen angelegt werden.

Literatur

- FLÖHR, W., E. HENGST, D. KOPP, G. LEMBCKE, W. SCHWANECKE und H.-E. WÜNSCHE: Vorschlag für eine optimale Baumartenzusammensetzung auf lange Sicht im Gesamtwald der DDR. VEB Forstprojektierung Potsdam, unveröffentlicht
- HOFMANN, G.: Mitteleuropäische Wald- und Forst-Ökosystemtypen in Wort und Bild, Der Wald, Sonderheft Waldökosystem-Katalog, 1994
- KOPP, D. und W. SCHWANECKE: SEA 74 - C 3.4 - Standortsbewertung
- KOPP, D. und W. SCHWANECKE: Standortlich-naturräumliche Grundlagen ökologiegerechter Forstwirtschaft, Berlin, 1994

Darst. C 2 - 31: Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr)

T ... 3

Stamm- Standorts- formen- gruppe		Humusform						
		t Mu	t MM	t Mo	t RM	t Ro	t Ma	t Hu
		Zustands-Standortsformengruppe						
		rt	kt	mt	zt	at	dt	et
R 3	lf	40	38	35	31			
	f	36	34	31	27			
	m	32	30	28	25			
	t	30	28	26	23			
K 3	lf		35	33	29	26	23	20
	f		32	30	26	23	20	17
	m		29	27	24	21	18	15
	t		27	25	22	19	16	13
M 3	lf			33	29	25	22	19
	f			29	25	21	18	15
	m			25	22	19	16	13
	t			23	20	18	14	11
Z 3	lf				26	22	19	16
	f				23	19	16	13
	m				20	17	14	11
	t				18	15	12	9
A 3	lf					19	16	14
	f					17	14	12
	m					15	12	10
	t					13	10	8

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 32: Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr)

T ... 2

Stamm- Standorts- formen- gruppe		Humusform						
		m Mu	m MM	m Mo	m RM	m Ro	m Ma	m Hu
		Zustands-Standortsformengruppe						
		r m	k m	m m	z m	a m	d m	e m
R 2	lf	60	58	53	48			
	f	56	54	48	43			
	m	53	50	45	40			
	t	48	45	40	35			
K 2	lf	59	56	50	44	38	33	29
	f	55	52	46	40	34	29	25
	m	51	48	43	37	31	26	22
	t	46	43	38	33	28	24	20
M 2 ⁺	lf		54	50	43	36	31	27
	f		50	46	39	33	28	24
	m		46	42	36	30	25	21
	t		42	37	32	27	23	19
M 2	lf		51	46	40	34	29	25
	f		47	42	36	31	26	22
	m		43	38	33	28	23	19
	t		40	35	30	25	21	17
Z 2 ⁺	lf		46	42	38	32	28	24
	f		43	39	35	29	25	21
	m		40	36	32	26	22	18
	t		37	33	29	24	20	16
Z 2	lf		44	39	35	30	26	21
	f		41	36	32	27	23	19
	m		37	33	29	25	21	17
	t		34	30	26	22	18	14
A 2 ⁺	lf				33	30	25	21
	f				30	27	22	18
	m				27	24	20	16
	t				25	21	17	13
A 2	lf				32	28	24	20
	f				29	25	21	17
	m				26	22	18	14
	t				24	20	16	12

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 33: Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr)

T ... 1

Stamm- Stand- orts- formen- gruppe		Humusform												
		i Mu	iMM	i Mo	i RM	i Ro	i Ma	mMu	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu
		Zustands-Standortsformengruppe												
		r i	k i	m i	z i	a i	d i	r m	k m	m m	z m	a m	d m	e m
R 1	lf	67	65	62				64	62	58				
	f	64	62	58				61	58	54				
	m	61	58	54				57	54	50				
	t	56	54	51				52	50	47				
K 1	lf	67	63	58	52	46			58	53	46	40		
	f	64	60	55	49	33			55	50	43	37		
	m	60	56	51	46	40			52	47	40	34		
	t	55	51	47	42	37			49	44	37	32		
M 1	lf		58	56	47	42	37			48	42	37	30	25
	f		54	52	44	39	34			45	39	34	28	23
	m		50	46	41	36	31			42	36	31	26	21
	t		46	42	37	33	29			39	33	29	24	19
Z 1	lf			49	45	38	32				38	32	27	22
	f			45	41	35	30				35	30	25	20
	m			42	37	32	28				32	28	23	18
	t			38	34	30	26				30	26	21	16
A 1	lf				40	35	30					29	24	19
	f				37	32	27					27	22	17
	m				34	29	25					25	20	15
	t				32	27	23					23	18	13

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 34: Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr)

W .. 2
 Ü ... 2 Ü ... 1

Stamm- Standorts- formen- gruppe		Humusform												
		i Mu	i MM	i Mo	i RM	i Ro	i Ma	mMu	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu
		Zustands-Standortsformengruppe												
		r i	k i	m i	z i	a i	d i	r m	k m	m m	z m	a m	d m	e m
WR 2	lf	62	61	56	51	47		60	57	52	46			
	f	58	57	52	47	43		57	54	49	43			
	m	54	52	48	44	40		54	51	46	40			
	t	50	47	43	39	35		49	46	41	35			
WK 2	lf	63	58	53	47	43	38		55	50	43	38	33	29
	f	59	54	49	44	40	35		52	47	40	35	30	26
	m	54	50	46	41	37	32		49	44	37	32	27	23
	t	49	45	41	37	33	29		45	40	33	29	25	21
WM 2	lf		54	49	46	42	36			50	42	36	31	27
	f		51	45	42	38	33			46	38	33	28	24
	m		47	42	38	34	30			42	34	30	25	21
	t		43	38	35	31	27			39	31	27	23	19
WZ 2	lf			44	38	36	32				36	32	28	24
	f			41	35	33	29				33	29	25	21
	m			38	32	30	26				30	26	22	18
	t			36	30	28	24				28	24	20	16
ÜR 2	lf													
	f	54												
	m	50												
	t	46												
ÜK 2	lf													
	f		51											
	m		47											
	t		43											
ÜR 1	lf													
	f	45												
	m	43												
	t	41												
ÜK 1	lf													
	f		42											
	m		40											
	t		38											

Darst. C 2 - 35: Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr)

N ... 2

Stamm- Standorts- formen- gruppe		Humusform										
		f Mu	f MM	f Mo	f RM	f Ro	i Mu	i MM	i Mo	i RM	i Ro	m Ro
		Zustands-Standortsformengruppe										
		r f	k f	m f	z f	a f	ri	ki	mi	zi	ai	a m
NR 2	lf	67	65	63			66	64				
	f	65	63	60			63	61				
	m	62	60	57			60	58				
	t	59	57	54			57	55				
NK 2	lf	63	61	59				59	55	50		
	f	60	58	56				56	52	47		
	m	57	55	53				53	49	44		
	t	54	52	50				50	46	41		
NM 2	lf			54	52	47			52	47	42	36
	f			52	50	45			50	45	40	34
	m			49	47	42			47	42	37	32
	t			46	44	39			44	39	35	30
NZ 2	lf				49	45				45	40	33
	f				47	42				42	37	31
	m				43	39				39	34	29
	t				40	36				36	32	27
NA 2	lf					36					35	30
	f					34					33	28
	m					32					31	26
	t					30					29	24

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 36: Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr)

N ... 1

Stamm- Standorts- formen- gruppe		Humusform				
		n Mu	n MM	n Mo	n RM	n Ro
		Zustands-Standortsformengruppe				
		r n	k n	m n	z n	a n
NR 1	lf	47				
	f	47				
	m	45				
	t	45				
NK 1	lf		44			
	f		44			
	m		42			
	t		42			
NM 1	lf			40		
	f			40		
	m			38		
	t			38		
NZ 1	lf				34	
	f				34	
	m				32	
	t				32	
NA 1	lf					26
	f					26
	m					26
	t					26

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 37: Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse
(dt/ha und Jahr)

0 ... 4 0 ... 2 0 ... 3 0 ... 1

Stamm- Standorts- formen- gruppe	oh- ne	Humusform										Stamm- Standorts- formen- gruppe	oh- ne	
		nMu	nMM	nMo	nRM	nRo	fMu	fMM	fMo	fRM	fRo			
		Zustands-Standortsformengruppe												
		r n	k n	m n	z n	a n	r f	k f	m f	z f	a f			
OR 4	lf						61							
	f						58							
	m						53							
	t						48							
OK 4	lf							57				OK 2	lf	20
	f							54				f	20	
	m							50				m	20	
	t							46				t	20	
OM 4	lf								53			OM2	lf	18
	f								50			f	18	
	m								46			m	18	
	t								42			t	18	
OZ 4	lf									49		OZ 2	lf	16
	f									46		f	16	
	m									42		m	16	
	t									38		t	16	
OA 4	lf										37	OA 2	lf	14
	f										34	f	14	
	m										32	m	14	
	t										30	t	14	
OR 3	lf	38												
	f	38												
	m	36												
	t	36												
OK 3	lf		36									OK 1	lf	10
	f		36									f	10	
	m		34									m	10	
	t		34									t	10	
OM 3	lf			34								OM1	lf	9
	f			34								f	9	
	m			32								m	9	
	t			32								t	9	
OZ 3	lf				30									
	f				30									
	m				28									
	t				28									
OA 3	lf					22						OA 1	lf	7
	f					22						f	7	
	m					22						m	7	
	t					22						t	7	

Darst. C 2 - 38: Stamm-Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse (dt/ha und Jahr)

Feuchtestufe des Bodens u. Mesoreliefs	Klimastufe der	Nährkraftstufe							
		R	K	M+	M	Z+	Z	A+	A
(T) ... 3	lf	80	70		60		50		40
	f	70	60		50		40		30
	m	65	55		45		35		25
	t	60	50		40		30		20
(T) ... 2	lf	97	90	85	80	75	70	65	60
	f	92	85	80	75	70	65	60	55
	m	87	80	72	70	62	60	52	50
	t	82	75	68	65	58	55	47	45
(T) ... 1	lf	107	100		93		85		75
	f	103	96		88		80		70
	m	99	92		83		75		65
	t	95	88		78		70		60
W ... 2	lf	105	95		85				
	f	100	90		80				
	m	95	85		75				
	t	90	80		70				
Ü ... 2									
Ü ... 1									
N ... 2	lf	112	106		100		92		78
	f	109	103		97		89		75
	m	106	100		93		85		72
	t	103	96		90		82		70
N ... 1	lf	113	106		96		86		68
	f	113	106		96		86		68
	m	110	104		93		82		68
	t	110	104		93		82		68
O ... 4	lf	108	102		96		92		76
	f	104	98		92		88		72
	m	100	94		88		84		68
	t	96	90		84		80		64
O ... 3	lf	115	105		95		85		70
	f	115	105		95		85		70
	m	110	100		90		80		70
	t	110	100		90		80		70
O ... 2	lf		105		93		75		55
	f		105		93		75		55
	m		105		93		75		55
	t		105		93		75		55
O ... 1									

Darst. C 2 - 39: Zustands-Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse (dt/ha und Jahr) der Stamm-Standortsformengruppen OK2 ... NA2 am Beispiel der Klimastufe mäßig trockenes Tieflandsklima (Tm)

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform															
	ohne	nMu	nMM	nMo	nRM	nRo	rf	fMu	fMM	fMo	fRM	fRo	iRo	iMa	mRo	mMa
	ohne	rn	kn	mn	zn	an	rf	mf	zf	af	ai	di	am	dm		
OK2	105															
OM2	93															
OZ2	75															
OA2	55															
OR3		110														
OK3			100													
OM3				90												
OZ3					80											
OA3						70										
NR1		110														
NK1			104													
NM1				93												
NZ1					82											
NA1						68										
OR4		100														
OK4			94													
OM4				88												
OZ4					84											
OA4						68										
NR2							106	102								
NK2							102	100	95							
NM2									93	88	83					
NZ2										85	79	72	68	68	63	
NA2											72	68	65	65	58	

Darst. C 2 - 40: Zustands-Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse (dt/ha und Jahr) der Stamm-Standortsformengruppen R1 ... A3 am Beispiel der Klimastufe mäßig trockenes Tieflandsklima (Tm)

Stamm- Stand- orts- gruppe	Humusformen																			
	iMu	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMu	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu	tMu	tMM	tMo	tRM	tRo	tMa	tHu
	ri	ki	mi	zi	ai	di	rm	km	mm	zm	am	dm	em	rt	kt	mt	zt	at	dt	et
R1	99	94	88																	
K1	97	92	86	80	75															
M1		88	83	77	71	65														
Z1			81	75	68	63				63	55									
A1				72	65	58				58	50									
R2							87	82	77	71										
K2							85	80	74	68	62	54	50							
M2+								78	72	66	60	52	48							
M2								76	70	64	58	50	46							
Z2+									68	62	56	48	44							
Z2									66	60	54	46	42							
A2+										58	52	44	40							
A2										56	50	42	36							
R3														65	60	55	60			
K3															55	50	45	40	35	30
M3																45	40	35	30	25
Z3																	35	30	25	20
A3																		25	20	15

Zustands-Fruchtbarkeitsziffern im natürlichen Gleichgewichtszustand mit der Stamm-Fruchtbarkeit

Darst. C 2 - 41: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz mit Rinde je Jahr und ha)

Erle

Stamm- Standorts- formen- gruppe		Humusform					ohne ohne
		i Mu ri	i MM ki	n Mu rn	n MM kn	n Mo mn	
ÜR 1	lf						
	f	11,3					
	m	10,8					
	t	10,3					
NR 1	lf			11,8			
	f			11,8			
	m			11,3			
	t			11,3			
OR 3	lf			9,5			
	f			9,5			
	m			9			
	t			9			
OK 3	lf				9		
	f				9		
	m				8,5		
	t				8,5		
OM 3	lf					8,5	
	f					8,5	
	m					8	
	t					8	
OK 2	lf						5,0
	f						5,0
	m						5,0
	t						5,0
OM 2	lf						4,5
	f						4,5
	m						4,5
	t						4,5

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 42: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Eiche in Klimastufe If

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform											Zustands-Standortsformengruppe										
	nMu	nMM	fMu	fMM	fMo	fRM	fRo	iMu	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMu	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu		
R2 If														10,9	10,5	9,6	8,7					
K2 If														10,7	10,2	9,1	8,0	6,9	6,0	5,3		
M2 ⁺ If															9,8	9,1	7,8	6,5	5,6	4,9		
M2 If															9,3	8,4	7,3	6,2	5,3	4,5		
R1 If								12,2	11,8	11,3				11,6	11,3	10,5						
K1 If								12,2	11,5	10,5	9,5	8,4										
M1 If								10,5	10,2	8,5	7,6	6,73				8,7	7,6	6,7	5,5	4,5		
Z1 If									8,9	8,2	6,9	5,8					6,9	5,8	4,9	4,0		
WR2 If								11,3	11,1	10,2	9,3	8,5		10,9	10,4	9,5	8,4					
ÜR2 If																						
ÜK2 If																						
ÜR1 If																						
ÜK1 If																						
NR2 If			12,2	11,8	11,5			12,0	11,6													
NK2 If			11,5	11,1	10,7			10,7	10,0	9,1												
NM2 If					9,8	9,5	8,5			9,5	8,5	7,6						6,5				
NR1 If	8,5																					
NK1 If		8,0																				

■ Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 43: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Eiche in Klimastufe f

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform										Zustands-Standortsformengruppe									
	nMu	nMM	fMu	fMM	fMo	fRM	fRo	iMu	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMu	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu
R2	r	n	k	n	r	f	a	f	r	i	k	i	m	i	z	i	a	i	d	i
K2	f													10,2	9,8	8,7	7,8			
M2 ⁺	f													10,0	9,5	8,4	7,3	6,2	5,3	4,5
M2	f														9,1	8,4	7,1	6,0	5,1	4,4
R1	f														8,5	7,6	6,5	5,6	4,7	4,0
K1	f								11,6	11,3	10,5			11,1	10,5	9,8				
M1	f								11,6	10,9	10,0	8,9	6,0		10,0	9,1	7,8	6,7		
Z1	f								9,8	9,5	8,0	7,1	6,18			8,2	7,1	6,2	5,1	4,2
WR2	f								8,18	7,45	6,36	5,45				6,36	5,45	4,55	3,64	
ÜR2	f	9,8							11,3	11,1	10,2	9,3	8,5	10,9	10,4	9,5	8,4			
ÜK2	f		9,3																	
ÜR1	f	8,2																		
ÜK1	f		7,6																	
NR2	f			12,2	11,8	11,5		12,0	11,6											
NK2	f			11,5	11,1	10,7		10,7	10,0	9,1										
NM2	f					9,8	9,5	8,5			9,5	8,5	7,6					6,5		
NR1	f	8,5																		
NK1	f		8,0																	

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C2 - 44: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Eiche in Klimastufe m

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform										Zustands-Standortsformengruppe									
	nMu	nMM	fMu	fMM	fMo	fRM	fRo	iMu	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMu	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu
R2														9,6	9,1	8,2	7,3			
K2														9,3	8,7	7,8	6,7	5,6	4,7	4,0
M2 ⁺															8,4	7,6	6,5	5,5	4,5	3,8
M2															7,8	6,9	6,0	5,1	4,2	3,5
R1								11,1	10,5	9,8				10,4	9,8	9,1				
K1								10,9	10,2	9,3	8,4	7,3			9,5	8,5	7,3	6,2		
M1									9,1	8,4	7,5	6,5	5,6			7,6	6,5	5,6	4,7	3,8
Z1										7,6	6,7	5,8	5,1				5,8	5,1	4,2	3,3
WR2								9,8	9,5	8,7	8,0	7,3		9,8	9,3	8,4	7,3			
ÜR2	9,1																			
ÜK2		8,5																		
ÜR1	7,8																			
ÜK1		7,3																		
NR2			11,3	10,9	10,4			10,9	10,5											
NK2			10,4	10,0	9,6				9,6	8,9	8,0									
NM2					8,9	8,5	7,6			8,5	7,6	6,7						5,8		
NR1	8,2																			
NK1		7,6																		

■ Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 45: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Eiche in Klimastufe t

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform										Zustands-Standortsformengruppe										
	nMu	nMM	fMu	fMM	fMo	fRM	fRo	iMu	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMu	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu	
R2 t														8,7	8,2	7,3	6,4				
K2 t														8,4	7,8	6,9	6,0	5,1	4,4	3,6	
M2+ t															7,6	6,7	5,8	4,9	4,2	3,5	
M2 t															7,3	6,4	5,5	4,5	3,8	3,1	
R1 t								10,2	9,8	9,3				9,5	9,1	8,5					
K1 t								10,0	9,3	8,5	7,6	6,7			8,9	8,0	6,7	5,8			
M1 t									8,4	7,6	6,7	6,0	5,3			7,1	6,0	5,3	4,4	3,5	
Z1 t										6,9	6,2	5,5	4,7				5,5	4,7	3,8	2,9	
WR2 t								9,1	8,5	7,8	7,1	6,4		8,9	8,4	7,5	6,4				
ÜR2 t			8,4																		
ÜK2 t				7,8																	
ÜR1 t			7,5																		
ÜK1 t				6,9																	
NR2 t							10,7	10,4	9,8				10,4	10,0							
NK2 t							9,8	9,5	9,1				9,1	8,4	7,5						
NM2 t									8,4	8,0	7,1							5,5			
NR1 t			8,2																		
NK1 t				7,6																	

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Darst. C 2 - 46: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Buche in Klimastufen If + f

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform																	
	f Mu	f MM	f Mo	f RM	f Ro	i Mu	i MM	i Mo	i RM	i Ro	i Ma	m Mu	m MM	m Mo	m RM	m Ro	m Ma	m Hu
	r f	k f	m f	z f	a f	r i	k i	m i	z i	a i	d i	r m	k m	m m	z m	a m	d m	e m
R2												10,9	10,5	9,6	8,7			
f												10,2	9,8	8,7	7,8			
K2												10,7	10,2	9,1	8,0	6,9	6,0	5,3
f												10,0	9,5	8,4	7,3	6,2	5,3	4,5
M2 ⁺												9,8	9,1	7,8	6,5	5,6	4,9	
f												9,1	8,4	7,1	6,0	5,1	4,4	
M2												9,3	8,4	7,3	6,2	5,3	4,5	
f												8,5	7,6	6,5	5,6	4,7	4,0	
R1												11,6	11,3	10,5				
f												11,1	10,5	9,8				
K1																		
f																		
M1												10,0	9,1	7,8	6,7			
f																		
WR2												10,9	10,4	9,5	8,4			
f												10,4	9,8	8,9	7,8			
NR2																		
f																		
NK2												10,7	10,0	9,1				
f												1,9	1,7	1,6				
NM2																		
f												9,5	8,5	7,6	6,5			
												9,1	8,2	7,3	6,2			

Darst. C 2 - 47: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Buche in Klimastufen m + t

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform																	
	fMu	fMM	fMo	fRM	fRo	iMu	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMu	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu
	rf	kf	mf	zf	af	ri	ki	mi	zi	ai	di	rm	km	mm	zm	am	dm	em
R2	m											9,6	9,1	8,2	7,3			
	t											8,7	8,2	7,3	6,4			
K2	m											9,3	8,7	7,8	6,7	5,6	4,7	4,0
	t											8,4	7,8	6,9	6,0	5,1	4,4	3,6
M2 ⁺	m												8,4	7,6	6,5	5,5	4,5	3,8
	t												7,6	6,7	5,8	4,9	4,2	3,5
M2	m												7,8	6,9	6,0	5,1	4,2	3,5
	t												7,3	6,4	5,5	4,5	3,8	3,1
R1	m											10,4	9,8	9,1				
	t											9,5	9,1	8,5				
K1	m												9,5	8,5	7,3	6,2		
	t												8,9	8,0	6,7	5,8		
M1	m														7,6	6,5	5,6	4,7
	t														7,1	6,0	5,3	3,8
WR2	m											9,8	9,5	8,7	8,0	7,3		
	t											9,1	8,5	7,8	7,1	6,4		
NR2	m	11,3	10,9	10,4								10,9	10,5					
	t	10,7	10,4	9,8								10,4	10,0					
NK2	m	10,4	10,0	9,6								9,6	8,9	8,0				
	t	9,8	9,5	9,1								9,1	8,4	7,5				
NM2	m			8,9	8,5	7,6						8,5	7,6	6,7				5,8
	t			8,4	8,0	7,1						8,0	7,1	6,4				5,5

Darst. C 2 - 48: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Kiefer in Klimastufe If

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform										Zustands-Standortsformengruppe									
	nRM	nRo	fRM	fRo	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu	tMo	tRM	tRo	tMa	tHu
	zn	an	zf	af	ki	mi	zi	ai	di	km	mm	zm	am	dm	em	mt	zt	at	dt	et
K3	If															7,5	6,6	5,9	5,2	4,5
M3	If															7,5	6,6	5,7	5,0	4,3
Z3	If																5,9	5,0	4,3	3,6
A3	If																	4,3	3,6	3,2
M2 ⁺	If								12,3	11,4	9,8	8,2	7,0	6,1						
M2	If								11,6	10,5	9,1	7,7	6,6	5,7						
Z2 ⁺	If								10,5	9,5	8,6	7,3	6,4	5,5						
Z2	If								10,0	8,9	8,0	6,8	5,9	4,8						
A2 ⁺	If									0,0	7,5	6,8	5,7	4,8						
A2	If									0,0	7,3	6,4	5,5	4,5						
M1	If									10,9	9,5	8,4	6,8	5,7						
Z1	If									11,1	10,2	8,6	7,3	6,1	5,0					
A1	If										9,1	8,0	6,8	5,5	4,3					
NZ2	If									13,2	12,7	10,7	9,5	8,4						
NA2	If										10,2	9,1	7,5							
NZ1	If											8,0	6,8							
NA1	If																			
OZ3	If																			
OA3	If																			

Darst. C 2 - 50: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Kiefer in Klimastufe m

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform										Zustands-Standortsformengruppe									
	nRM	nRo	fRM	fRo	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu	tMo	tRM	tRo	tMa	tHu
K3															6,1	5,5	4,8	4,1	3,4	
M3															5,7	5,0	4,3	3,6	3,0	
Z3															4,5	3,9	3,2	2,5		
A3																3,4	2,7	2,3		
M2 ⁺									10,5	9,5	8,2	6,8	5,7	4,8						
M2									9,8	8,6	7,5	6,4	5,2	4,3						
Z2 ⁺									9,1	8,2	7,3	5,9	5,0	4,1						
Z2									8,4	7,5	6,6	5,7	4,8	3,9						
A2 ⁺											6,1	5,5	4,5	3,6						
A2											5,9	5,0	4,1	3,2						
M1					11,4	10,5	9,3	8,2	7,0		9,5	8,2	7,0	5,9	4,8					
Z1						9,5	8,4	7,3	6,4			7,3	6,4	5,2	4,1					
A1							7,7	6,6	5,7				5,7	4,5	3,4					
NZ2			9,8	8,9			8,9	7,7					6,6							
NA2				7,3				7,0					5,9							
NZ1	7,3																			
NA1		5,9																		
OZ3	6,4																			
OA3		6,4																		

Darst. C 2 -51: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Kiefer in Klimastufe t

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform											Zustands-Standortsformengruppe																									
	nRM	nRo	fRM	fRo	iMM	iMo	iRM	iRo	iMa	mMM	mMo	mRM	mRo	mMa	mHu	tMo	tRM	tRo	tMa	tHu																	
	z	a	n	z	f	a	n	k	i	m	i	a	i	d	k	m	m	m	z	m	a	m	d	m	e	m	m	t	z	t	a	t	d	t	e	t	
K3 t																												5,7	5,0	4,3	3,6	3,0					
M3 t																												5,2	4,5	4,1	3,2	2,5					
Z3 t																												4,1	3,4	2,7	2,0						
A3 t																													3,0	2,3	1,8						
M2+ t																																					
M2 t																																					
Z2+ t																																					
Z2 t																																					
A2+ t																																					
A2 t																																					
M1 t																																					
Z1 t																																					
A1 t																																					
NZ2 t																																					
NA2 t																																					
NZ1 t																																					
NA1 t																																					
OZ3 t																																					
OA3 t																																					

Darst. C 2 - 53: Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs
(fm Derbholz m. R. je Jahr und ha)

Fichte in Klimastufen m + t

Stamm- Standorts- formen- gruppe	Humusform																	
	nMo	nRM	f Mo	f RM	f Ro	i Mu	i MM	i Mo	i RM	i Ro	i Ma	m Mu	m MM	m Mo	m z m	m Ro	m Ma	m Hu
	m n	z n	m f	z f	a f	r i	k i	m i	z i	a i	d i	r m	k m	m m	z m	a m	d m	e m
Zustands-Standortsformengruppe																		
K2	m											12,4	11,7	10,5	9,0	7,6	6,3	5,4
	t											11,2	10,5	9,3	8,0	6,8	5,9	4,9
K1	m					14,6	13,7	12,4	11,2	9,8			12,7	11,5	9,8	8,3		
	t					13,4	12,4	11,5	10,2	9,0			12,0	10,7	9,0	7,8		
M1	m						12,2	11,2	10,0	8,8	7,6			10,2	8,8	7,6	6,3	5,1
	t						11,2	10,2	9,0	8,0	7,1			9,5	8,0	7,1	5,9	4,6
NM2	m					12,0	11,5	10,2	9,0							7,8		
	t					11,2	10,7	9,5	8,5							7,3		
NZ2	m						10,5	9,5	9,5	8,3						7,1		
	t						9,8	8,8	8,8	7,8						6,6		
NM1	m	9,3																
	t	9,3																
NZ1	m		7,8															
	t		7,8															
OM3	m	7,8																
	t	7,8																
OZ3	m		6,8															
	t		6,8															

Stamm-Fruchtbarkeit bei natürlichem Gleichgewicht

Verzeichnis der Darstellungen

C 1 -	1 Herleitung der Stamm-Standortsformengruppe aus der Stamm-Standortsform	6
	2 Stamm-Standortsformengruppen (Fassung der SEA 74)	8
3a	Stamm-Standortsformengruppen (Fassung der SEA 95-1) Stand 2002	9
	4 Herleitung der Zustands-Standortsformengruppe aus der Zustands-Standortsform	16
	5 Zustands-Standortsformengruppen bei harmonischer Nährkraftstufe	17
	6 Zweigliedrige Zustands-Nährkraftstufen mit Disharmonie zwischen Stickstoff- und Säure-Basenstufe sowie ihre Ableitung aus der Humusform	18
	7 Stufen der Zustandsabweichung bei Harmonie zwischen Stickstoff- und Säure-Basenstufe	20
	8 Stufen der Zustandsabweichung bei Disharmonie zwischen Stickstoff- und Säure-Basenstufe	22
	9 Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit dem Horizontfolgetyp Ranker	30
	10 Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen Braunerde, Braunpodsol, Fahlerde und Staugleyfahlerde	31
	11 Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen Rumpfrosterde und Rumpffahlerde	32
	12 Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit dem Horizontfolgetyp Saumpodsol	33
	13 Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen Podsole (mit flachem Bi), Rügpodsole und Staugleyrügpodsole	34
	14 Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen der restlichen Podsole (Bi-Obergrenze in über 20 cm Tiefe)	35
	15 Fünftel-Nährkraftstufen bei Bodenformen mit den Horizontfolgetypen Rügerde und Fahrrügerde	36
	16 Wertespannen für die NB-Stufen	39
	17 Kombination von Nährkraftstufe und NB-Stufe	40
	18 Zuordnung der Stamm-Bodenformen zur Stamm-Nährkraftstufe bei Abweichungen von der "Normalstufe"	42
	19 Sand-Feinbodenformen der Halbgleygruppe und die Nährkraftstufen sowie Fünftel-Teilnährkraftstufen der anhydromorphen Parallelförmigen unter Berücksichtigung der KMgCaP-Serien	47
	20 Fünftel-Nährkraftstufen bei Feinbodenformen mit KMgCaP-Serie I Stand 2002	51
	21 Fünftel-Nährkraftstufen bei Feinbodenformen mit KMgCaP-Serie II ... VI Stand 2002	52
	22 Fünftel-Nährkraftstufen bei Feinbodenformen mit KMgCaP-Serie VII ... VIII	53
23a	Grundwasserformen Stand 2002	59
24a	Stauwasserformen Stand 2002	60

	25a	Zuordnung der Kombination aus Grundwasserform und Bodenform zur Feuchtestufe der Stamm-Standortsformengruppe Stand 2002	61
	26a	Zuordnung der Kombination aus Stauwasserform und Bodenform zur Feuchtestufe der Stamm-Standortsformengruppe Stand 2002	62
	27a	Zuordnung anhydromorpher oder wenighydromorpher Bodenformen zur Feuchtestufe der Stamm-Standortsformengruppe Stand 02	62
	28	Großgruppen des Standortsmosaiks	64
	29	Zuordnung der Standortformen zur Stamm-Standortsformengruppe Stand 2002	70
	30	Zuordnung humusreicher Sandböden im küstenfeuchten Klima zur Stamm-Standortsformengruppe Stand 2002	138
C 2 -	31	Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr) T ... 3	144
	32	Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr) T ... 2	146
	33	Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr) T ... 1	147
	34	Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr) W .. 2, Ü .. 2, Ü ... 1	148
	35	Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr) N ... 2	149
	36	Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr) N ... 1	150
	37	Fruchtbarkeitsziffern für Holzmasse (dt/ha und Jahr) O ... 4, O ... 3, O ... 2, O ... 1	151
	38	Stamm-Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse (dt/ha und Jahr)	152
	39	Zustands-Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse (dt/ha und Jahr) der Stamm-Standortsformengruppen OK2 ... NA2 am Beispiel der Klimastufe mäßig trockenes Tieflandsklima (Tm)	153
	40	Zustands-Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse (dt/ha und Jahr) der Stamm-Standortsformengruppen R1 ... A3 am Beispiel der Klima-stufe mäßig trockenes Tieflandsklima (Tm)	154
	41	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz mit Rinde je Jahr und ha) Erle	155
	42	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Eiche in Klimastufe lf	156
	43	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Eiche in Klimastufe f	157
	44	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Eiche in Klimastufe m	158
	45	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Eiche in Klimastufe t	159
	46	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Buche in Klimastufen lf + f	160
	47	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Buche in Klimastufen m + t	161
	48	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Kiefer in Klimastufe lf	162
	49	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Kiefer in Klimastufe f	163
	50	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtwuchs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Kiefer in Klimastufe m	164

51	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Kiefer in Klimastufe t	165
52	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Fichte in Klimastufen lf + f	166
53	Maximaler Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs (fm Derbholz m. R. je Jahr und ha) Fichte in Klimastufen m + t	167

Register

Abweichungen von der Normalstufe der Nährkraft	6, 10, 42	Bezeichnung der Großgruppen des Standortsmosaiks	23
Aggradation	142	Bezeichnung der Verhagerung	42
Aggradationsstufen	19, 20	- disharmonischer Nährkraftstufen	18
Altersdurchschnitt-Gesamtzuwachs	143	- harmonischer Nährkraftstufen	17
- Buche	162 – 163	- Karbonat im Untergrund	56
- Eiche	158 - 161	Bi-Horizont und Nährkraftstufe	29
- Erle	157	Bodenvegetation, Trockenmassebildung	142
- Fichte	168 – 169	Braunerde, Nährkraftstufen	31
- Kiefer	164 – 167	Braunpodsol, Nährkraftstufen	31
Altzustand	66	Buche	162, 163
anhydromorphe Böden (T)	11		
- Feuchtestufe	57	Darstellung von Zustands-Nährkraftstufen in M-V	67
- Karbonatstufe	55	Degradation	142
- Sandböden	40	Degradationsstufen	19, 20
		disharmonische Nährkraftstufen	18
		- Zustandsabweichung	
Baumartenoptimierung	143		
Benennung von Feuchtestufen	11, 12	Eiche	158 - 160
- Großgruppen des Standortsmosaiks	23	eingliedrige Zustands-Nährkraftstufe	64
- Immissionsstufen	22	Einheiten der Fruchtbarkeit	142
- Klimastufen	14	entwässerte halbhydromorphe Böden und Feuchtestufe	40
- Nährkraftstufen	7, 17	Entwässerungen bei Sandböden	40, 43
- Stamm-Standortformengruppen	8, 12, 13, 15	episodische Überflutung	59
- Substratuntergruppen	6, 14, 15	Erhöhung der Nährkraftstufe bei Unterlagerung	42
- Zustands-Standortformengruppen	5, 16, 17, 18	Erle	157
- Zustandsabweichung	19, 21		
Berücksichtigung von karbonatreichen Schichten	55		
- stärkeren Entwässerungen	40		
- Karbonat im Untergrund	56		
- Unterlagerungen	43		
- Windverhagerung	42		
- zweischichtigen Böden	46		
- zweistöckigen Böden	45		
Besonderheiten der Feuchtestufenzuordnung	57		
- weitere Besonderheiten	58		

		Klimastufe	
Fahlerde, Nährkraftstufen	31	Grundwasserform	58, 59
Fahrlügerde, Nährkraftstufen	36	Grundwert der Nährkraftstufe	28
Feuchtestufe anhydromorpher Böden	62	Gruppenzuordnung der Standortsformen (Text)	25 ff
- bei mehrstöckigen Böden	58	- der Standortsformen (Tab.)	70 ff
- entwässerter halbhydromorpher Böden	58		
- Zuordnung zur	55	Hager-Humusformen	65
- Zustands-	65	Hagerformen	66
Feuchtestufen	6, 11	harmonische Nährkraftstufen	19
- Kurzzeichen der	11, 12	- Zustandsabweichung	19
- Veränderung der Bezeichnung	13	Hauptbodenform	57
Fichte	168, 169	Herleitung der Nährkraftstufe	
Filz	29	- aus der KMgCaP-Serie	27
Filz-Feinbodenformen im küstenfeuchten Klima	57	- aus der NB-Stufe	39
Fremdstoffeinfluß und Zustands-Fruchtbarkeitsziffern	143	- bei stärker entwässerten Sandböden	40
Fruchtbarkeit	142 ff	- der halbhydromorphen Böden	37
Fruchtbarkeits-Abweichung	142	Hinweise im Zuordnungskatalog	68, 69
Fruchtbarkeitsziffern	142 ff	Holz, Trockenmassebildung	142
- auf Grundlage von Standortsformengruppen	143	Holzmasse	141
- der forstlich nutzbaren Phytomasse	142	- Fruchtbarkeitsziffern für	147 – 153
- der gesamten oberirdischen Phytomasse	142	Humusformen als Ableitmerkmal	17
- Definition	143		
- für Holzmasse	147 - 153	Immissionsstufen	22
- für Phytomasse	154 - 156		
- Umwandeln in fm/ha	145		
Fuchssandschicht	29		
Fünftel- Nährkraftstufen	27		
- KMgCaP-Serie I	51	Kaliumstufe	19, 65
- KMgCaP-Serie II ... VI	52	Karbonat im Untergrund	56
- KMgCaP-Serie VII ... VIII und Sonderserien	53	Karbonatstufe anhydromorpher Böden	55
		- organischer Böden	56
		- vollhydromorpher Böden	55
Gleichgewichtszustand	5, 19, 20	- Zuordnung zur	25
Gleichlauf der Vegetationsentwicklung	66	Kennzeichnung von Klimastufen	14
Großgruppen des Standortsmosaiks	6, 8, 10, 23, 64	- von Standorten nach der Fruchtbarkeit	142
Großklimabereiche und	63		

- des Nachlaufs der Vegetationsentwicklung	66		
Kiefer	164 - 167		
Klimastufe	7, 8, 10, 14	Masse in dt/ha	142
- Zuordnung zur KMgCaP-Serie	63	mehrstöckige Böden und Feuchtestufe	58
Kohleunterlagerung, Pluszeichen bei	25 – 28	Mindestgröße der Standortsmosaik	63
Kombination aus Grundwasserform, Bodenform und Feuchtestufe	42, 44	mineralische Standorte	11
Kombination Stauwasserform, Bodenform, Feuchtestufe	61		
- Stau-, Grundwasserform	62	Nachlauf der Vegetationsentwicklung	66
- Nährkraft-, Feuchtestufen	58	Nadeln, Trockenmassebildung	144
- Nährkraftstufe, NB-Stufe	12	Nährkraft, Normalstufe der Nährkraftstufen	41
Kombinationsbodenformen	40	- Grundwert	6, 7, 17
Kurzzeichen der Feuchtestufen	40	- Fünftel-	28
- Großgruppen des Standortsmosaiks	11, 12	- Herleitung aus der KMgCaP-Serie	27
- Immissionsstufen	64	- Herleitung aus NB-Stufe	39
- Klimastufen	22	- und Bi-Horizont	29
- Nährkraftstufen	14	- von Sand-Feinbodenformen der Halbgleygruppe	47
- Stamm-Standortsformen-	7	- Zuordnung zur	57
gruppen	9, 10	- Zustands-	64, 65
- Substratuntergruppen	6, 14, 15	Naßstandorte (N)	11
- Zustands-Standortsformen-	16, 17, 18,	NB-Stufe, Berücksichtigung der	26
gruppen	64	- Herleitung der Nährkraftstufe aus	37
- Zustandsabweichung	19, 21, 22	„Normalstufe“ der Nährkraft	10, 29, 40
- von Unterlagerungen	15	- Abweichungen von	10, 40
küstenfeuchtes Klima	57		
Landwirtschaftl. genutzte Böden	65	Oberirdische Phytomasse, Definition	142
Laub, Trockenmassebildung	142	organische Standorte (O)	11
Lehmsandunterlagerung, Pluszeichen bei	43	- und Karbonatstufe	56
Lehmunterlagerung und Feuchtestufe	58		
Lett	29	Periodische Überflutung	59
Lettunterlagerung, Pluszeichen bei	43	Phosphorstufe	19, 65
		Phytomasse, Stamm-	143

kraft	41 ff	- Standortsformen zu den Stamm-Standortsformengruppen	25, 70 ff
- der Feuchtestufenbezeichnungen	13	- Zustands-Standortsformengruppen	64
verhagert	42	Zuordnungskatalog	68
Verhagerung	10	Zustands-Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse	144, 155 - 156
vollhydromorphe Böden und Karbonatstufe	55	- Abweichung, Stufen der	19, 20
vollhydromorphe Sandböden ohne Podsolierung	41	- Eigenschaften	16
Volumen in fm/ha	142, 145	- Feuchtestufe	62
Waldstandortsfruchtbarkeit	142	- Fruchtbarkeit	142
Wechselfeuchte Standorte (W)	11	- Fruchtbarkeitsziffern für Phytomasse	
Wertespanssen für NB-Stufen	39	- Nährkraftstufe	16, 17, 64
Windverhagerung	42	- Nährkraftstufen, Darstellung in M-V	67
Zuordnung		- Standortsform	16
- anhydromorpher o. halbhydromorpher Bodenformen zur Feuchtestufe	62	- Standortsformengruppe	16
- Feuchtestufe	6, 8, 11-13, 16, 17, 19, 57, 62	- Standortsformengruppe mit disharmonischen Nährkraftstufen	18
- Großgruppen des Standortsmosaiks	23, 63	- Standortsformengruppe mit eingliedriger Nährkraftstufe	64
- humusreicher Sandböden im küstenfeuchten Klima	57	- Standortsformengruppe mit harmonischen Nährkraftstufen	17
- Karbonatstufe	55	- Standortsformengruppe mit zwei- und mehrgliedriger Nährkraftstufe	65
- Klimastufe	63	Zustandsabweichung, disharmonische	21
- Kombination aus Grundwasserform und Bodenform zur Feuchtestufe	61	- harmonische	19
- Kombination aus Stauwasserform und Bodenform zur Feuchtestufe	62	- Stufen der	19
- Nährkraftstufe	25	zwei- und mehrgliedrige Nährkraftstufe	65
- Stamm-Feuchtestufe	57, 58 ff	zweischichtige Böden	46
- Standortsformen	25 ff	zweistöckige Böden	45